





Received

Bound 20 Apr. 1916.

Н. Кузнецовъ, Н. Бушъ, А. Фоминъ.

Flora caucasica critica.

МАТЕРІАЛЫ

для

ФЛОРЫ КАВКАЗА.

Критическое систематическо-географическое изслѣдованіе.

Часть IV_я. вып. 6_{ой}.

Cohors VIII. Campanulatae

Cucurbitaceae, Campanulaceae

обработалъ (elaboravit)

А. Фоминъ (A. Fomin).

Цѣна 1 р. 10 коп.

Юрьевъ.

Типографія К. Маттисена.

1903 (листь 1), 1904 (листы 2—3), 1905 (листы 4—5), 1906 (листы 6—9),
1907 (листь 10).

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

QK 322
. K 8
ch. 11.
выр. 6

Печатано по распоряженію Совѣта ИМПЕРАТОРСКАГО С. Петербурскаго Общества Естествоиспытателей, на основаніи § 2 Устава Общества.

Введение.

Въ составъ порядка *Campanulatae* входятъ 6 семействъ: *Cucurbitaceae*, *Campanulaceae*, *Goodeniaceae*, *Candolleaceae*, *Calyceraceae* и *Compositae*. Изъ нихъ Кавказъ владѣть только тремя семействами, а именно: *Cucurbitaceae*, *Campanulaceae* и *Compositae*; другія три семейства свойственны только тропическимъ странамъ. По числу своихъ представителей на первомъ мѣстѣ, конечно, стоитъ сем. *Compositae*, а за нимъ слѣдуетъ *Campanulaceae*. Первое изъ нихъ имѣетъ наиболѣе обширное распространѣніе по всему земному шару, какъ въ тропическихъ, такъ въ умѣренныхъ и холодныхъ странахъ; второе имѣетъ распространѣніе преимущественно въ умѣренныхъ странахъ сѣвернаго и южнаго полушарій, причемъ представители этого сем. являются главнымъ образомъ растеніями горными. Что касается тропическаго сем. *Cucurbitaceae*, то оно представлено на Кавказѣ весьма бѣдно и для флоры его мало характерно. Изъ этого сем. на Кавказѣ встрѣчается 3 рода, изъ которыхъ родъ *Bryonia* распространенъ повсемѣстно въ Европѣ, средиземноморскій родъ *Ecballium* свойственъ также и южно-русскимъ степямъ и Крыму, а южно-азиатско-африканскій родъ *Cucumis* съ видомъ *C. Melo L.* въ дикомъ состояніи встрѣченъ пока только въ степяхъ восточнаго Закавказья.

Особенное значеніе для характеристики высокогорной флоры Кавказа имѣетъ сем. *Campanulaceae*, которое представлено здѣсь 8 родами и 77 видами. Для двухъ родовъ *Campanula* и *Symphyan-dra* Кавказъ можетъ считаться однимъ изъ крупныхъ центровъ развитія и расселенія видовъ. Родъ *Campanula* насчитываетъ на Кавказѣ 56 видовъ, изъ нихъ 30 эндемичныхъ, а изъ всѣхъ 8 видовъ *Symphyan-dra* Кавказъ владѣетъ 5 видами, изъ которыхъ эндемичны для Кавказа всѣ 5 видовъ. Такимъ образомъ оба эти рода являются самыми богатыми по числу эндемичныхъ видовъ. Другіе роды этого семейства представлены на Кавказѣ небогато. Такъ роды *Michauxia*, *Hedracanthus*, *Jasione* и *Adenophora* имѣются здѣсь лишь въ единичныхъ видахъ; родъ *Specularia* насчитываетъ 4 вида, распространенныхъ и въ Средиземноморской области, а родъ *Podanthum* представляетъ 9 видами, изъ которыхъ для Кавказа эндемичны два.

Всѣ бѣдно представленныя роды, за исключеніемъ сомнительнаго для Кавказа *Adenophora*, являются обитателями степей или горно-степныхъ районовъ. Наиболѣе богатые видами роды *Campanula* и *Symphyanandra* оказываются обитателями горныхъ и въ особенности альпійскихъ поясовъ.

Изъ представителей рода *Campanula* особенно характерными для флоры Кавказа оказываются группы *Scapiflorae* и *Rupestres*, дающія наибольшій % эндемичныхъ формъ преимущественно для альпійскаго пояса Главнаго хребта. Столь-же интересна группа *Symphyanandraeformes*, дающая большой % эндемичныхъ формъ для горно-степныхъ пространствъ Малаго Кавказа и горъ южнаго Закавказья.

Эта группа, характеризующаяся широкой не прилегающей къ вѣнчику чашечкой, сжатымъ книзу вѣнчикомъ и тѣмъ, что при распусканіи цвѣтовъ иногда замѣчается свѣпленіе нѣкоторыхъ пыльниковъ, является связующей группой между родомъ *Campanula* и *Symphyanandra*. Представители группы *Symphyanandraeformes* южнаго Закавказья имѣютъ много общаго въ своемъ *habitus'*ъ; кромѣ того они имѣютъ сходство въ листьяхъ даже и съ *Symphyanandra armena* и отчасти *S. zangezura*, изъ чего можно заключить, что они образовались при одинаковыхъ приблизительно условіяхъ. Подобное сходство въ общемъ *habitus'*ѣ наблюдается у группы *Scapiflorae*, обитающей альпійскія высоты. Здѣсь также можно видѣть вліяніе одинаковыхъ условій ихъ жизни и происхожденія.

Бѣдно представлена на Кавказѣ группа *Spicatae*, имѣющая всего одного представителя для горно-степного пояса южнаго Закавказья — *C. stricta* var. *muricata*. Небогаты представителями группы *Cordifoliae* и *Involucratae*, формы которыхъ распространены въ лѣсномъ и отчасти въ субальпійскомъ поясахъ и въ большинствѣ случаевъ общи Кавказу и Малой Азіи.

Бѣдно представлены, но за то весьма характерны для флоры западнаго Закавказья, стоящая особнякомъ группа *Spinulosae* съ единственнымъ видомъ — *C. mirabilis*, а также и подсекція *Intermediae* тоже съ единственнымъ видомъ *C. longestyla*. Первый видъ представляетъ собою остатокъ третичной флоры, второй же, насколько можно судить по неустойчивости признаковъ, касающихся органовъ воспроизведенія, принадлежитъ, можетъ быть, къ формамъ недавняго происхожденія и, повидному, гибриднымъ путемъ.

Для степей низовыхъ и горныхъ весьма интересна группа *Sibiricae*, имѣющая 3 эндемичныхъ вида для Кавказа и одинъ — общій съ Малой Азіей и Персией.

Мало типичными для Кавказа оказываются группа *Trachelioideae*, а также и секція *Rapunculus*, заключающія въ себѣ почти исключительно европейскихъ представителей. Послѣдняя, впрочемъ, включаетъ въ себѣ двѣ эндемичныя формы — *C. pontica* и *C. Rapunculus* var. *spiciformis*.

Разсмотримъ теперь эндемичныя формы рода *Campanula* и ихъ географическое распространеніе по Кавказу. Количество эндемичныхъ формъ достигаетъ цифры 48, такъ какъ къ эндемичнымъ

видамъ слѣдуетъ добавить еще и эндемичныя разновидности, которыми въ своей работѣ я придаю значеніе расъ.

Вотъ списокъ эндемичныхъ формъ:

<i>Campanula longestyla</i> Fom.	<i>C. ardonensis</i> Rupr.
<i>C. mirabilis</i> Alb.	<i>C. ardonensis</i> var. <i>latifolia</i> m.
<i>C. sibirica</i> L. var. <i>Hohenackeri</i> (Trautv.) m.	<i>C. hypopolia</i> Trautv.
<i>C. imeretina</i> Rupr.	<i>C. petrophila</i> Rupr.
<i>C. daghestanica</i> Fom.	<i>C. petrophila</i> var. <i>longiflora</i> Rupr.
<i>C. caucasica</i> M.B.	<i>C. petrophila</i> var. <i>angustiflora</i> m.
<i>C. sarmatica</i> Ker.	<i>C. Ledebouriana</i> Trautv.
<i>C. sarmatica</i> var. <i>gracilis</i> m.	<i>C. andia</i> Rupr.
<i>C. sarmatica</i> var. <i>calcareu</i> Alb.	<i>C. andia</i> var. <i>Alexeenkoi</i> m.
<i>C. collina</i> M.B. var. <i>abchasicu</i> Alb.	<i>C. Autraniana</i> Alb.
<i>C. calcarata</i> Som m. & Lev.	<i>C. suanetica</i> Rupr.
<i>C. ciliata</i> Stev.	<i>C. Kolenatiana</i> C. A. M.
<i>C. ciliata</i> var. <i>pontica</i> Alb.	<i>C. Raddeana</i> Trautv.
<i>C. Dzaaku</i> Alb.	<i>C. Bayerniana</i> Rupr. var. <i>Traut-</i> <i>vetteri</i> m.
<i>C. tridentata</i> Schreb.	<i>C. Choziatowskyi</i> Fom.
<i>C. tridentata</i> var. <i>barbata</i> m.	<i>C. Massalskyi</i> m.
<i>C. circassica</i> m.	<i>C. rapunculoides</i> L. var. <i>cordifolia</i> (C. Koch) m.
<i>C. anomala</i> m.	<i>C. glomerata</i> L. var. <i>hispida</i> m.
<i>C. saxifraga</i> M.B.	<i>C. glomerata</i> var. <i>symphytifolia</i> Alb.
<i>C. Aucheri</i> DC. var. <i>compacta</i> m.	<i>C. glomerata</i> var. <i>caucasica</i> Trautv.
<i>C. argunensis</i> Rupr.	<i>C. Rapunculus</i> var. <i>spiciformis</i>
<i>C. bellidifolia</i> Adam.	<i>C. pontica</i> Alb. [Boiss.
<i>C. bellidifolia</i> var. <i>longisepala</i> m.	<i>C. ossetica</i> M. B. 1).
<i>C. kryophila</i> Rupr.	
<i>C. besenginica</i> Fom.	

Изъ нихъ 12 — *C. mirabilis*, *C. longestyla*, *C. imeretina*, *C. sarmatica* var. *calcarata*, *C. collina* var. *abchasicu*, *C. ciliata* var. *pontica*, *C. Dzaaku*, *C. tridentata* var. *barbata*, *C. circassica*, *C. anomala*, *C. Autraniana*, *C. suanetica*, эндемичны для западнаго Закавказья.

9 формъ являются эндемичными для центральнаго Кавказа, таковы: *C. saxifraga*, *C. bellidifolia*, *C. bellidifolia* var. *longisepala*, *C. kryophila*, *C. besenginica*, *C. ardonensis*, *C. ardonensis* var. *latifolia*, *C. hypopolia* и *C. ossetica*.

6 формъ эндемичны для восточной части Главнаго хребта — *C. daghestanica*, *C. caucasica*, *C. petrophila* var. *angustiflora*, *C. andia*, *C. andia* var. *Alexeenkoi* и *C. Kolenatiana*.

5 формъ эндемичны для горъ южнаго Закавказья — *C. Ledebouriana*, *C. Raddeana*, *C. Bayerniana* var. *Trautvetteri*, *C. Choziatowskyi* и *C. Massalskyi*.

3 формы эндемичны для западной части Предкавказья — *C. sarmatica* var. *gracilis*, *C. calcarata* и *C. glomerata* var. *hispida*.

1 форма — *C. Aucheri* var. *compacta* эндемична для горъ центрального Закавказья.

Остальныя формы общи для всего Главнаго хребта.

Нѣкоторыя изъ эндемичныхъ формъ встрѣчаются исключительно на известнякахъ, вслѣдствіе чего область ихъ распространенія крайне ограничена. Къ такимъ растеніямъ принадлежать: *C. mirabilis*, *C. Antraniana*, *C. Dzaaka*, *C. collina* var. *abchasica*, *C. ciliata* var. *pontica* и *C. sarmaticum* var. *calcareum*.

Что касается рода *Symphyanthra*, то всѣ его представители для Кавказа являются эндемичными. Исключительно для зап. Закавказья будетъ эндемична *Symphyanthra pendula* var. *transcaucasica*, для центральной и восточной частей Главнаго хребта — *S. pendula*, для лѣсного пояса и предгорій восточной части Главнаго хребта — *S. lezghia*, для южнаго Карабаха — *S. zangezura*, для юго-западной части Каресской области эндемична *S. finitima*, наконецъ для Арменіи, Карабаха и Талыша — *S. armena*.

Виды рода *Specularia*, встрѣчающіеся на Кавказѣ, принадлежать также и южной Европѣ, а равно и всей Средиземноморской области. Они являются элементомъ сорнымъ, а потому встрѣчаются на Кавказѣ какъ въ мѣстностяхъ съ сухимъ климатомъ, такъ равно и въ мѣстностяхъ съ климатомъ влажнымъ.

Родъ *Michauxia* персидско-малоазійскій имѣетъ на Кавказѣ всего только одинъ видъ общій съ Персіей.

Изъ всѣхъ видовъ рода *Podanthum*, встрѣчающихся на Кавказѣ, только одинъ эндемичный *P. campanuloides* распространенъ по всему Кавказу, другіе виды не имѣютъ такого обширнаго распространенія и сосредоточены преимущественно въ южномъ Закавказьѣ, гдѣ обитаютъ крайне небольшіе районы. Такъ *P. pulchellum* найденъ пока только въ талышнскихъ высотахъ, граничащихъ въ Персіей, всѣ прочіе виды — *P. eichoriforme*, *P. leianthum*, *P. amplexicaule* var. *Kotschyi*, *P. lanceolatum* var. *rigidum*, *P. Otites*, *P. tobelioides*, *P. tobelioides* var. *urecolatum* въ своемъ распространеніи приурочены къ мало-азійской границѣ.

Родъ *Hedracanthus* имѣетъ на Кавказѣ всего одинъ только видъ *H. Overimianus*, который обитаетъ только въ сѣверо-восточной части Дагестана.

Родъ *Jasione* представленъ на Кавказѣ только однимъ варьететомъ — *Jasione montana* var. *dentata*, который извѣстенъ пока только изъ юго-западнаго Закавказья близъ турецкой границы.

Представители сем. *Campanulaceae* обитаютъ на Кавказѣ какъ горные луга и лѣса, такъ равно низовыя и горныя степи и пустыни, а небольшое количество ихъ сопутствуетъ человѣку и такимъ образомъ является элементомъ сорнымъ.

Желая показать ихъ, какъ участниковъ той или иной формации, мы придется сгруппировать ихъ слѣдующимъ образомъ:

Сорный элементъ:

<i>Specularia Speculum</i> A. D C.	<i>C. rapunculoides</i> L. var. <i>cordifolia</i>
<i>S. hybrida</i> A. D C.	C. Koch
<i>S. pentagonia</i> A. D C.	<i>C. rapunculoides</i> L. var. <i>trachelioides</i>
<i>Campanula rapunculoides</i> L.	D. C.

Указанныя здѣсь формы встрѣчаются какъ вблизи дорогъ, въ посявахъ, такъ и на опушкахъ лѣса.

Обитатели низовыхъ степей:

<i>C. sibirica</i> L.	<i>C. glomerata</i> L.
<i>C. sibirica</i> L. for. <i>elatior</i> m.	<i>C. Rapunculus</i> L.
<i>C. sibirica</i> L. var. <i>divergens</i> Trautv.	<i>C. Rapunculus</i> L. var. <i>spiciformis</i>
<i>C. bononiensis</i> L.	Boiss.
<i>C. persicifolia</i> L.	

Обитатели низовыхъ степей выбираютъ для своего произрастанія или открытыя, немного суховатые мѣста съ рѣдкимъ травянистымъ покровомъ (*C. sibirica*, *C. bononiensis*, *C. Rapunculus*, *C. Rapunculus* var. *spiciformis*), или же селятся между мелкими кустарниками среди густого покрова изъ злаковъ и другихъ травъ (*C. sibirica* f. *elatior*, *C. sibirica* var. *divergens*, *C. glomerata* и *C. persicifolia*).

Обитатели горныхъ степей.

<i>C. crispa</i> Lam.	<i>C. daghestanica</i> Fom.
<i>C. Beauverdiana</i> Fom.	<i>Symphyandra zangezura</i> Lipsky.
<i>C. Steveni</i> M. B.	<i>S. finitima</i> m.
<i>C. Raddeana</i> Trautv.	<i>Podanthum canescens</i> Boiss. var.
<i>C. Choziatowskyi</i> Fom.	<i>salicifolium</i> (A. D C.) m.
<i>C. Bayerniana</i> Rupr. var. <i>Trautvetteri</i> m.	<i>Pod. lobelioides</i> Boiss.
<i>C. glomerata</i> L. var. <i>cervicarioides</i> DC.	<i>Jasione montana</i> L. var. <i>dentata</i>
	A. DC.
	<i>Hedraeanthus Overinianus</i> Rupr.

Нѣкоторыя изъ формъ являются общими для низовыхъ и горныхъ степей. Таковы: *Campanula bononiensis*, *C. sibirica* var. *Hohenackeri*, *C. sibirica* var. *Hohenackeri* f. *parviflora*.

Обитатели горныхъ степей селятся преимущественно по каменистымъ осыпямъ, въ трещинахъ скалъ и не образуютъ большихъ колоній (*C. crispa*, *C. Raddeana*, *C. Choziatowskyi*, *C. Bayerniana*, *C. glomerata* var. *cervicarioides*, *C. daghestanica*, *Podanthum lobelioides*, *Symphyandra zangezura*, *S. finitima*). Въ сосѣдствѣ съ ними въ такихъ же трещинахъ скалъ или осыпяхъ селятся виды *Silene*, *Saxifraga*, *Alyssum*, виды *Astragalus* и др. Только немногіе изъ представителей горныхъ степей селятся на газонахъ изъ густого, преимущественно злаковаго покрова, и образуютъ иногда большія колоніи; къ такимъ формамъ принадлежатъ: *C. Steveni*, *C. Beauverdiana* и *Podanthum canescens* var. *salicifolium*.

Обитатели пустынь.

Michauxia laevigata Vent.
Podanthum cichoriforme Boiss.
P. pulchellum Boiss.
P. leianthum Trautv.
P. lanceolatum Boiss. var. *rigidum*
 Boiss.

P. lobelioides Boiss. var. *urceolata*
 m.
Campanula stricta L. var. *muricata*
C. Massalskyi Fom. [Trautv.
C. macrochlamys Boiss. et Huet.
C. propinqua Fisch. et Mey.

Обитатели пустынь ютятся уже совершенно разрозненно и весьма рѣдко образуютъ колоніи. Последнее явленіе можно наблюдать только у *C. macrochlamys* и *C. propinqua*, у прочихъ формъ этой группы мнѣ никогда не приходилось наблюдать колоній. Представители этой группы растений живутъ въ поясѣ отъ 2000—4500' надъ ур. моря. Выше эта формація, напр. въ южномъ Закавказьѣ, незамѣтно переходитъ въ горную степь. Въ предѣлахъ каменистой пустыни представители сем. *Campanulaceae* живутъ въ сообществѣ трагакантовыхъ астрагаловъ, видовъ *Acantholimon* и нѣкоторыхъ даже солянокъ, какъ напр. *Halanthium rarifolium*, *Noea cana* и *Salsola glauca*. На такихъ именно мѣстахъ мы встрѣчаемъ *Campanula propinqua* и *Michauxia laevigata*.

Обитатели лѣсовъ могутъ быть подраздѣлены на формы, живущія непосредственно на лѣсномъ гумусовомъ субстратѣ и формы, селящіяся на скалахъ.

Къ первымъ принадлежать:

Campanula longestyla Fom.
C. latifolia L.
C. odontosepala Boiss.
C. Trachelium L.
C. rapunculoides L.
C. rapunculoides L. var. *cordifolia* m.

C. rapunculoides L. var. *trachelio-*
ides D C.
C. glomerata L. var. *coriacea* m.
C. glomerata L. var. *hispida* m.
C. lactiflora M. B.
Adenophora liliifolia Ledb.

Ко вторымъ относятся:

Campanula mirabilis Alb.
C. alliariaefolia Willd.
C. sarmatica Ker.
C. sarmatica Ker. f. *glabra*.
C. sarmatica Ker. var. *gracilis* m.
C. sarmatica Ker. var. *calcarata* Alb.
C. calcarata Som m. & Lev.
C. Autraniana Alb.
C. suanetica Rupr.

C. ossetica M. B.
C. pontica Alb.
C. imeretina Rupr.
C. Kolenatiana C. A. Mey.
Symphyanandra pendula A. D C.
S. pendula A. D C. var. *transcauca-*
sica Som m. & Lev.
S. armena A. D C.
S. lezgina Alexeenko.

C. latifolia и *C. lactiflora* хотя и встрѣчаются въ лѣсахъ, но принадлежать скорѣе субальпійскому поясу, такъ какъ только въ послѣднемъ поясѣ онѣ образуютъ обширныя колоніи.

Формы, селящіяся въ лѣсу на гумусовомъ субстратѣ, принадлежать преимущественно тривіальной флорѣ, тогда какъ селящіяся на скалахъ весьма часто принадлежать къ растеніямъ эндемичнымъ.

Обитатели субальпійскаго пояса весьма часто спускаются и въ лѣсной поясъ. Къ такимъ формамъ принадлежатъ вышеупомянутые два вида — *C. latifolia* и *C. lactiflora*, образующіе въ субальпійскомъ поясѣ Главнаго хребта и отчасти Малаго Кавказа обширныя и высокія колоніи въ сообществѣ столь-же высокихъ *Senecio platyphyllus*, *Doronicum macrophyllum*, *Telekia speciosa*, *Cirsium obvallatum*, *Valeriana alliariaefolia*, *Aconitum orientale* и проч. Весьма часто въ субальпійскіи же поясъ заходитъ сверху изъ альпійцевъ *C. collina*, а снизу изъ лѣснаго пояса забираются иногда *C. ranunculoides* var. *trachelioides*.

Обитатели альпійскаго пояса живутъ главнымъ образомъ на скалахъ, каменистыхъ откосахъ и осыпяхъ и только незначительное число ихъ селится на задерненныхъ мѣстахъ.

Къ числу первыхъ относятся:

- C. glomerata* L. var. *caucasica* Trautv. (5000—7000').
- C. glomerata* L. var. *symphytifolia* Alb. (6000—9000').
- C. andia* Rupr. (5000—7000').
- C. andia* Rupr. var. *Alexeenkoi* Fom. (3900—6400').
- C. petrophila* Rupr. (4200—11400').
- C. petrophila* Rupr. var. *angustiflora* m. (8000').
- C. petrophila* Rupr. var. *longiflora* Rupr. (6000—8000').
- C. hypopolia* Trautv. (7000—8000').
- C. ardonensis* Rupr. (3120—7000').
- C. ardonensis* Rupr. var. *latifolia* m. (7000'?)
- C. besenginica* Fom. (5000—6000').
- C. bellidifolia* Adam (2500—10000').
- C. bellidifolia* Adam. var. *longisepala* m. (4000—8000').
- C. argunensis* Rupr. (5500—11000').
- C. Aucheri* DC. (6500—9500').
- C. saxifraga* MB. (4000—10000').
- C. anomala* m. (8000').
- C. circassica* m. (8000—10000').
- C. Dzaaku* Alb. (6000').
- C. ciliata* Stev. (6000—11500').
- C. ciliata* Stev. var. *pontica* Alb. (8000').
- C. kryophila* Rupr. (6000—9000').
- C. Ledebouriana* Trautv. (8000—11000').
- C. collina* M. B. var. *abchasic* Alb. (6000').
- C. caucasica* M. B. (2000—8000').

Къ числу вторыхъ принадлежатъ:

- C. collina* M. B. (4000—8000').
- C. glomerata* L. f. *grandiflora* m. (6000—8000').
- C. tridentata* Schreb. (7000—11000').
- C. tridentata* Schreb. var. *barbata* m. (8000—10000').
- C. tridentata* Schreb. var. *gracilis* m. (8500—12000').

C. Steveni M. B. (3500—10000'.)

Podanthum campanuloides Boiss. (6000—9000'.)

P. amplexicaule Boiss. (7000—8000'.).

Что касается представителей *Campanulaceae* альпійскаго пояса, то высота, до которой они поднимаются въ западной и восточной частяхъ Главнаго хребта, весьма различна. Подобно другимъ альпійскимъ растеніямъ, виды *Campanulaceae* въ восточномъ Закавказьѣ поднимаются значительно выше, чѣмъ въ западномъ. Въ послѣднемъ альпійскія формы селятся обыкновенно отъ 6000—7500' надъ ур. моря и только на известнякахъ, повидимому, поднимаются много выше, а именно до 8000—10000'. Въ восточномъ и южномъ Закавказьѣ поднятіе альпійскихъ формъ *Campanulaceae* до 11000—12000' уже совсѣмъ не рѣдкое явленіе. Выше всѣхъ формъ поднимаются *C. tridentata* и *C. ciliata*. Такъ, въ восточномъ Закавказьѣ онѣ очень часто растутъ у снѣговъ вмѣстѣ съ *Plantago saxatilis*, *Taraxacum crepidiforme*, *Androsace albana*, *Sysymbrium Huclii*, *Lloydia serotina*, *Sibbaldia parviflora* и проч.

Нѣкоторые альпійскіе виды *Campanula*, селящіеся на скалахъ, могутъ спускаться по ущельямъ довольно низко въ лѣсной поясъ, что случается при обвалахъ или когда сѣмена ихъ заносятся водой. Какъ примѣръ такого явленія можно привести *C. petrophila*, которая въ Дарьяльскомъ ущельѣ спускается до 4200' надъ ур. моря, *C. saxifraga* живетъ на Бештау на 4000', *C. ardonensis* спускается по Ардоу до 3120', *C. bellidifolia* растетъ по Военно-Грузинской дорогѣ на высотѣ 2400' и, наконецъ, *C. caucasica* спускается до 2000'. Въ Тифлискомъ Ботанич. Саду альпійскіе виды *Campanula* культивируются на высотѣ 2200' надъ ур. моря. Лучше всего удается культура обитателей скалъ: *C. saxifraga*, *C. Aucheri*, *C. ardonensis*, *C. bellidifolia*, *C. hypopolia*, *C. argunensis*, *C. petrophila* и *C. caucasica*. Всѣ эти виды тамъ ежегодно обильно цвѣтутъ, но плодоносятъ немногіе, а именно: *C. bellidifolia*, *C. ardonensis*, *C. saxifraga* и *C. caucasica*, т. е. тѣ самые виды, которые, какъ мы видѣли, и въ природѣ спускаются ниже прочихъ.

Среди альпійскихъ видовъ *Campanula*, селящихся на задерненныхъ мѣстахъ, встрѣчается и горно-степной видъ *C. Steveni*, который совсѣмъ отсутствуетъ на альпійскихъ лугахъ западнаго Закавказья и входитъ въ составъ альпійской флоры частью на сѣверномъ Кавказѣ (Кубанская и Терская обл.), частью въ восточной части Главнаго хребта и въ горахъ южнаго Закавказья, только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ альпійскіе луга отличаются сухостью. Этимъ свойствомъ отличаются горные луга въ восточной части Главнаго хребта и въ особенности въ горахъ южнаго Закавказья. Высокогорные луга южнаго Закавказья особенно разнятся отъ такихъ же луговъ Главнаго хребта. Благодаря сухости климата южнаго Закавказья и нерѣдкому отсутствію лѣснаго пояса горные луга даютъ у себя пріютъ большому количеству формъ степныхъ и горно-степныхъ, а потому, если мы будемъ сравнивать тѣ и другіе луга въ отношеніи количества формъ изъ сем. *Campanulaceae*, то увидимъ, что область высокогорныхъ луговъ южнаго Закавказья весьма бѣдна предста-

вителями *Campanula*. На ближайшихъ къ Главному хребту горахъ Малаго Кавказа, въ поясѣ высокогорныхъ луговъ, мы найдемъ еще кое-гдѣ типичную для Главнаго хребта (Кубанская обл., Дагестанъ и вся восточная часть хребта) *C. tridentata*, но если мы будемъ двигаться все болѣе и болѣе на югъ, то напр. въ горахъ, окрестныхъ съ оз. Гокчей и южнѣе ихъ, мы не найдемъ уже этой формы — тамъ ее будетъ замѣнять другая. На задерненныхъ мѣстахъ довольно высоко отъ 10000—12000' тамъ растетъ *C. tridentata* var. *gracilis*, ниже отъ 6000—9000' на такихъ-же задерненныхъ мѣстахъ растутъ *C. Steveni*, *C. Beauverdiana*, *C. glomerata* f. *grandiflora*, *C. collina*, а на голыхъ скалахъ ютится лишь одна *C. Aucheri*. Только въ двухъ какъ бы островныхъ районахъ — съ одной стороны на югѣ Карабаха, въ горахъ сопредѣльныхъ съ Капуджихомъ, а съ другой стороны на Араратѣ и сосѣднихъ съ нимъ хребтахъ, на скалахъ, кромѣ *C. Aucheri*, въ первомъ случаѣ встрѣчается еще *C. Bayerniana*, а во второмъ — *C. Ledebouriana*. Для нижняго пояса горъ отъ 4000—6000' надъ уров. моря въ южномъ Закавказьѣ весьма характерны виды *Campanula* изъ группы *Symphandraeformis*, распространеніе которыхъ здѣсь такое-же, какъ и видовъ *Podanthum* — островное.

Теперь, если мы обратимся къ разсмотрѣнію высокогорныхъ луговъ въ центральной и восточной частяхъ Главнаго хребта, то увидимъ, что луга альпійскаго пояса центральнаго Кавказа будутъ заключать наибольшее количество формъ, преимущественно селящихся на скалахъ. Здѣсь на болѣе высокорасположенныхъ задерненныхъ мѣстахъ вездѣ растетъ *Campanula tridentata*, ниже обитаютъ *C. collina*, *C. glomerata* f. *grandiflora*, а на скалахъ мы найдемъ *C. saxifraga*, *C. bellidifolia*, *C. petrophila*, *C. ciliata*, *C. kryophila*, *C. ardonensis*. Въ предѣлахъ альпійскаго пояса центральнаго Кавказа встрѣчаются и болѣе рѣдкія растенія скаль — *C. besenginica*, *C. hyropolia* и *C. andia*.

Чѣмъ далѣе на востокъ отъ центральнаго Кавказа, тѣмъ формы альпійскаго пояса будутъ менѣе разнообразны. Болѣе высокія мѣста во всей восточной части Главнаго хребта и здѣсь будутъ занимать *C. tridentata* и *C. ciliata*, столь же обыкновенны для болѣе низкихъ мѣстъ будутъ *C. collina* и *C. glomerata* f. *grandiflora*, но интересно то, что мы начинаемъ встрѣчать здѣсь *C. Steecni* — растеніе, входящее въ составъ сухихъ альпійскихъ луговъ. Скалы альпійскаго пояса уже не дадутъ здѣсь того разнообразія формъ, какъ въ центральномъ Кавказѣ. Приблизительно на востокъ отъ Военно-Грузинской дороги до Кахетинскихъ горъ среди обитателей скаль мы увидимъ *C. petrophila* съ ея разновидностями и *C. Aucheri*, въ области же Кахетинскихъ горъ и Дагестана преобладающимъ растеніемъ скаль будетъ лишь *C. arguensis*, а *C. petrophila* будетъ растеніемъ сравнительно рѣдкимъ. Въ восточной оконечности Главнаго хребта появится лишь одна новая форма — это *C. caucasica*, растеніе принадлежащее скорѣе горной степи, чѣмъ альпійскому поясу.

Что касается альпійскихъ луговъ западнаго Закавказья, то наиболѣе высокія задерненные мѣста отъ 8000—10000' здѣсь за-

нимаетъ *C. tridentata* var. *barbata* и *C. ciliata*, а на болѣе низкихъ мѣстахъ растутъ *C. collina*, *C. glomerata* и *C. glomerata* f. *grandiflora*. Скалы и каменистыя осыпи даютъ пріютъ такимъ интереснымъ растеніямъ, какъ *C. anomala*, *C. circassica*, *C. Dzaaku*, *C. ciliata* var. *pontica*, *C. collina* var. *abchasica*, *C. sarmatica* var. *calcareo* и *C. Antraniana*.

Въ приводимой ниже таблицѣ можно видѣть распредѣленіе видовъ, разновидностей и формъ по ботанико-географическимъ провинціямъ Кавказа. Знакъ + обозначаетъ, что данный видъ или разновидность имѣется въ обозначенной провинціи; знакъ — выражаетъ, что данный видъ, разнов. или форма здѣсь не встрѣчается или тамъ еще не найденъ ¹⁾.

Распредѣленіе количества формъ обоихъ семействъ изъ порядка *Campanulatae* по ботанико-географическимъ провинціямъ Кавказа выразится слѣдующимъ образомъ:

St. A. — 8.	S. Ib. — 28.
St. C. — 1.	S. D.-K. — 26.
St. Tr. — 4.	S. S.-K. — 35.
X. D. — 23.	S. L. — 15.
X. A. — 47.	A. A. — 13.
S. T.-N. — 20.	A. W. — 24.
S. T. — 39.	A. M. — 40.
S. K. — 28.	A. O. — 25.
S. P. — 28.	

Можно замѣтить, что число формъ въ каждой изъ этихъ провинцій, помимо такихъ факторовъ какъ географическое положеніе провинцій и количество эндемичныхъ формъ, въ значительной степени зависитъ еще отъ разнообразія вмѣщающихся въ провинціи ботаническихъ формаций.

1) Наиболѣе бѣдными по числу представителей, какъ и слѣдовало ожидать, оказываются степныя провинціи: St. A., St. C. и St. Tr., что зависитъ какъ отъ однообразія формаций, такъ и оттого, что представители сем. *Campanulaceae* являются по преимуществу горными растеніями.

2) За этими тремя провинціями по возрастающему количеству формъ слѣдуютъ S. L. и S. T.-N., обиліе формъ въ которыхъ по сравненію съ вышеупомянутыми провинціями объясняется отчасти

1) St. A. — обознач.еть Приазовскія степи, St. C. — Прикаспійскія степи, S. K. — Лѣса Кубанскіе, S. T. — Лѣса Терскіе, S. D.-K. — Лѣса Дагестано-Кубинскіе, X. D. — Ксерофиты внутренняго Дагестана, A. W. — Альпійскіе дуга западнаго Кавказа, A. M. — Альпійскіе дуга центрального Кавказа, A. O. — Альпійскіе дуга восточнаго Кавказа, S. T.-N. — Лѣса Крымско-Новороссійскіе, S. P. — Лѣса Понтійскіе или Колхидскіе, S. Ib. — Лѣса южнаго склона восточной части Главнаго хребта (Грузинскіе, Иберійскіе), S. S.-K. — Лѣса Сомхето-Карабахскіе, S. L. — Лѣса Ленкоранскіе или Талышинскіе, St. Tr. — Степи Закавказскія, A. A. — Альпійскіе дуга Аджаро-Армянскіе, X. A. — Ксерофиты Нагорной Арменіи.

Приблизительныя границы этихъ провинцій нанесены на „Карту ботанико-географическихъ провинцій Кавказскаго края“, составленную проф. Н. П. Кузнецовымъ, и приложенную къ 1-му выпуску „Flora caucasica critica“, а также издаваную отдѣльно въ Трудахъ Бот. Сада Юрьев. Univ. Т. II, вып. 1-й.

Звѣздочкой (*) обозначены виды, разновидности и формы эндемичныя для Кавказскаго края.

тѣмъ, что первая включаетъ въ себя уже двѣ главныя формаціи (лѣсъ и горная степь), вторая же вмѣщаетъ три формаціи (лѣсъ, низовую степь и горную степь).

3) Изобиліе формъ въ провинціяхъ **X. A.** и **S. S.-K.** объясняется во первыхъ разнообразіемъ вмѣщающихся въ нихъ ботаническихъ формаций (солончаки, каменная пустыня, горная степь, лѣсъ, субальпійскіе и альпійскіе луга); во вторыхъ непосредственнымъ соеѣдствомъ этихъ провинцій съ Малой Азіей и Персіей, которыя обогащаютъ ихъ своими элементами.

4) Изъ провинцій альпійскихъ **A. A.**, **A. W.**, **A. M.** и **A. O.** самой богатой по числу формъ оказывается провинція **A. M.**, что объясняется тѣмъ, что эта провинція служитъ мѣстомъ размѣна формъ между альпами западнаго и восточнаго Кавказа, которые къ свойственнымъ упомянутой провинціи эндемичнымъ формамъ добавляютъ еще и свои.

5) Обиліе формъ въ провинціи **S. T.** объясняется тѣмъ, что въ составъ ея входятъ съ одной стороны горы напр. Бештау, Джиналь и проч., съ другой же стороны низовая степь и лѣсъ; кромѣ того здѣсь сказывается и вліяніе сосѣдней, богатой формами, альпійской провинціи **A. M.**, которая немало посылаетъ сюда своихъ формъ.

6) Провинціи **S. K.**, **S. P.** и **S. Ib.** горно-лѣсныя имѣютъ почти одинаковое число формъ, преобладающее большинство которыхъ принадлежитъ къ лѣснымъ и наиболѣе распространеннымъ.

7) Несмотря на то, что количество эндемичныхъ формъ въ восточной части Главнаго хребта сильно уменьшается, провинціи **X. D.** и **S. D.-K.** содержатъ значительное количество формъ, что опять таки зависитъ отъ разнообразія встрѣчающихся здѣсь ботаническихъ формаций (горная степь, лѣсъ, альпійскіе и субальпійскіе луга).

8) Къ самымъ распространеннымъ на Кавказѣ видамъ принадлежатъ слѣдующіе:

Bryonia dioica, *Br. alba*, *Ecballium eluterium*, *Campanula sibirica*, *C. collina*, *C. rapunculoides*, *C. bononiensis*, *C. latifolia*, *C. alliariaefolia*, *C. glomerata*, *C. tridentata*, *C. Steveni*, *C. lactiflora* и *Podanthum campanuloides*.

9) Наиболѣе рѣдкими для Кавказа оказываются слѣдующіе виды: *Campanula interetina*, *C. mirabilis*, *C. calcarata*, *C. kryophila*, *C. circassica*, *C. anomala*, *C. besenginica*, *C. ardonensis*, *C. hypopolia*, *C. Ledebouriana*, *C. suanetica*, *C. Antraniana*, *C. Choziatowskyi*, *C. Masalskyi*, *C. rotundifolia* var. *hirta*, *C. odontosepala*, *C. stricta* var. *muricata*, *C. pontica*, *C. persicifolia*, *Symphandra zangezura*, *S. lezgina*, *S. finitima*, *Podanthum cichoriforme*, *P. pulchellum*, *P. Olites*, *P. lobelioides*, *P. lanceolatum* var. *rigidum*.

10) Восточныхъ азіатскихъ видовъ на Кавказѣ только 3: *Campanula sibirica*, *C. Steveni* и *Adenophora lilifolia*.

11) Европейскихъ видовъ на Кавказѣ 8: *Campanula persicifolia*, *C. rapunculoides*, *C. bononiensis*, *C. Trachelium*, *C. Rapunculus*, *C. glomerata*, *Bryonia dioica* и *B. alba*.

XVIII

12) Изъ палеарктическихъ видовъ встрѣчается только одинъ — *C. rotundifolia*.

13) Средиземноморскихъ видовъ 7: *Ecballium elaterium*, *Specularia hybrida*, *Sp. falcata*, *Sp. pentagonia*, *Sp. speculum*, *Campanula fastigiata* и *C. lyrata*; населяютъ преимущественно степи восточнаго и южнаго Закавказья.

14) Преобладающее большинство представителей *Campanulaceae* принадлежатъ къ формамъ эндемичнымъ для Кавказа или его непосредственнаго продолженія, т. е. Малой Азии и Персіи.

15 Марта 1907 г

Тифлисъ, Ботаническій Садъ

N. Kusnezow, N. Busch, A. Fomin.

Flora caucasica critica.

Fasc. 8.

Cucurbitaceae, Campanulaceae

A. Fomin.

Vol. 4, pt. 6.

fig. 1

Jurjew.

1903.

Cohors VIII. Campanulatae.

Flores 5-meri, stamina lobis corollae isomera, carpella plerumque non numerosa. *Antherae* saepe *plus minus connatae*. *Ovarium inferum* 3—5-loculare vel rarius pluriloculare, semina ∞ — 1. — *Herbae*, rarius *frutices*.

Engl. in Engl. et Pr. Nat. Pflanzenfam. Nachtr. zu T. II.—IV. p. 357.

Subcohors I. Cucurbitineae.

Antherae cum 2 unilocularibus thecis, liberae vel per paria cohaerentes vel omnia 5 in synandrium centralem coalitae.

Engl. in Engl. et Pr. Nat. Pflanzenfam. Nachtr. zu T. II.—IV. p. 357.

Ord. I. Cucurbitaceae.

Flores monoici vel *dioici*. Calycis tubus ovario adnatus, limbus quinquelobus. Petala 5 libera vel saepius in corollam gamopetalam quinquepartitam coalita, calycis limbo inserta. Stamina 3 vel 5 libera, vel monadelphia, antheris filamentis adnatis vel liberis vel cohaerentibus. Ovarium 3—5-loculare inferum, placentis parietalibus angulis exterioribus loculorum affixis. *Fructus carnosus* loculis saepe evanidis. Semina exalbuminosa, embryone recto. — *Herbae scandentes* vel *prostratae*.

Cucurbitaceae Juss. Gen. 393. — Lindl. Veg. Kingd. 311. — Benth. et Hook. Gen. plant. I. 816. — Endl. Gen. 933—934; Suppl. I. 1421, II. 76, III. 90, V. 50. — Cogniaux, in D.C. Monograph. Phanerog. III. 340. — Müller et Pax, in Engl. et Pr. Nat. Pflanzenfam. IV. 5. p. 1. — Syn. *Bryoniae* Adans. Fam. 2. p. 135. — *Cucurbitaceae* et *Nandirobeae* vel *Nhandirobeae* A. St. Hil. in Mem. Mus. 9, pp. 190 et 215.

Примѣч. Представители сем. *Cucurbitaceae* пользуются на земномъ шарѣ широкимъ распространеніемъ, но главный центръ ихъ развитія находится въ тропикахъ. Отличительная ихъ особенность та, что они легко дичають въ мѣстахъ ихъ культуры и потому не могутъ быть вездѣ разсматриваемы какъ первобытно-аборигенныя растенія. Изъ 87 родовъ только 7 являются обитателями обоихъ полушарій, причемъ большая часть родовъ принадлежитъ старому свѣту. Такъ какъ представители этого семейства населяють преимущественно сухія теплыя страны, то родной ихъ могутъ

считаться Центральная Африка, Индія и Мексика. Изъ всѣхъ родовъ этого семейства на Кавк. встрѣчается всего только 2 рода, изъ которыхъ р. *Bryonia* видѣруется въ лѣсную область, другой же р. *Ecballium* свойственъ исключительно степямъ. Ледебуръ, ссылаясь на показанія Гюльденштедта, М. Виберштейна, Эйхвальда и Гогенаккера, приводитъ для Кавк. еще другіе роды, какъ напр., *Luffa*, *Lagenaria* и *Cucumis*, но такъ какъ всѣ эти растенія на Кавказѣ не аборигенныя и занесены туда культурой, то я не привожу ихъ, тѣмъ болѣе что и встрѣчаются то они вблизи огородовъ или вдоль полотна желѣзн. дорогъ. Для характеристики флоры Кавказа это сем. почти не играетъ никакой роли и всѣхъ представителей его слѣдуетъ скорѣе считать за сорныя растенія, ибо чаще всего они растутъ у дорогъ или заборовъ. Изъ приводимыхъ мною обонхъ родовъ только р. *Ecballium*, являясь характернымъ средиземноморскимъ растеніемъ, можетъ придать въ нѣкоторыхъ случаяхъ мѣстности особый отпечатокъ.

Bryonia 2 вид. (изъ 8). *Ecballium* 1 (1).

Subord. I. Cucurbiteae-Cucumerinae.

Antherae 5 biloculares, quarum 4 *per paria cohaerentes*, unde in flore stamina 3. Loculis *sigmoideo-flexuosis*. Semina plerumque horizontalia et numerosa.

Müller et Pax, E.-Pr. IV. 5. p. 22.

1. Женскіе цвѣты въ кистяхъ; плоды мелкіе въ формѣ ягоды многосѣмянныя, гладкіе и шаровидныя. Усики простые.

Bryonia L. (1).

- Жеск. цвт. одиночныя; плд. многосѣмянныя б. и. м. крупныя продолговатыя, колюче-щетинистыя; сѣмена при созрѣваніи выбрасываются. Усики въ нѣтъ *Ecballium* A. Rich. (2).

Gen. 1. *Bryonia* L.

Flores *dioici* vel *monoici racemosi*. Masc. calyx campanulatus quinquelobus. Corolla *subrotata* profunde quinquepartita, laciniis oblongis, stamina 3 rarius 5, libera tubo calycis inserta, filamentis liberis brevissimis; loculis linearibus *sigmoideo-flexuosis*. Fem. calyx et corolla maris, staminum rudimenta 3—5, interdum obscura. Ovarium *globosum* triplacentiferum, stylus gracilis, basi nudus, stigmatibus 3 simplicibus vel bilobis, ovula horizontalia. Fructus baccatus *sphaericus indehiscens*, oligospermus. Semina ovoidea vel oblonga, tumida vel compressa sublaevia non vel vix marginata. — Herbae perennes scandentes, radice crassa tuberosa, cirrhis simplicibus.

Bryonia Tourn. Inst. p. 102. — Linn. gen. p. 298, ed. 6, p. 508, Spec. edit. 1, p. 1012; edit. 2, p. 1438. — Juss. Gen. p. 394. — Willd. Spec. 4, p. 616. — Wahlenb. Fl. Suec. 2, p. 630. — Ser. in D.C. Prodr. III, p. 304. — Meisn. Gen. p. 127. — Spach, Veg. phan. 6, p. 225. — Webb. et Berth. Phyt. Canar. 2, p. 1. — Endl. Gen. p. 936. — Roem. Syn. fasc. 2, p. 11. — Naud. in Ann. sc. nat. ser. 4, 12, p. 137; 16, p. 171; 18, p. 192. — Benth. et Hook. Gen. I, p. 829. — Boiss. Fl. Or. II, p. 760. — Cogniaux, in D.C. Monograph. phanerog. III. 469. — Müller et Pax, in Engl.-Pr. IV, 5, p. 25.

Species 8 regionis Mediterraneae et Makaronesiae, quarum 2 Europae mediae et australis incolae.

1. Цвѣты двудомные, рыльца шершавыя, плоды красные.

B. dioica Jacq. (1).

B. dioica L. (2).

Примѣч. Изъ 8 видовъ этого рода на Кавк., въ Крыму и въ средней Европѣ встрѣчаются только два вида. Большая часть видовъ свойственна Средиземноморской области, одинъ в. эндемиченъ Канарскимъ островамъ и 4 в. малоазіатскіе. Сѣверная граница распространенія въ Европѣ этого р. совпадаетъ съ сѣверн. границей дуба.

1. **B. dioica** Jacq. *dioica*, foliis cordatis quinquelobis, margine undulato-denticulatis, utrinque calloso-asperis, concoloribus; floribus femineis corymbosis *plus minus breviter* pedunculatis rarius subsolitariis, *calycibus femineis* corolla brevioribus; stylo non exserto, *stigmatibus asperis*; baccis rubris. 24. v. v. et s. in h. P. A. Tm. Th. J.

Jacq. Fl. austr. II. p. 39, tab. 199. — Ser. in DC. Pr. III, p. 307. — Spach, Veg. phan. 6, p. 226. — C. A. Meyer, Verzeichn. der Pflanz. d. Cauc. p. 83. — Ledeb. II. 140. — Boiss. II. 760. — Cogniaux, in DC. Monogr. phanerog. III, p. 470. — Акинф. Флор. Центр. Кавк. I, стр. 179. — Ломак. Труд. Тифл. Бот. Сада III, p. 37? — Липск. Фл. К. 309. — Somm. et Levier, in A. H. P. XVI. p. 163.

Syn. *B. aspera sive alba*, baccis rubris Bauh. Pinax. p. 297. — *B. ruderalis* Salisb. Prodr. p. 158. — *B. scarlatina* Dmrt. Florul. Belg. p. 54. — *B. nitida* Link. Enum. 2. p. 404. — DC. pr. III, 306. — *B. lutea* Bast. in DC. l. c. — *B. sicula* Guss. Syn. 2, p. 621.

Icon. Rechb. tab. 1621.

Hab. ad sepes et in dumetis Caucasi sept.; in Transcauc. dubia. —

S. T. Въ лѣсахъ близъ Владикавказа. Мейеръ. Гора Брыковая Ставроп. губ. 2250'. 27. VI. 89. Акинф.! У р. Ардона между (не разобралъ) и Мисурцы, 2760'—3000', на камняхъ. 21.V.61. Рупр.! Терск. обл., Грозный. 5. V. 90. Липск.! Минеральн. Воды. 7. VI. 92. Липск.! Осетія близъ Алагіра въ началѣ Архонск. ущелья. 17. VI. 98. Мечъ!? Пятигорскъ. Жмакина! Желѣзноводскъ. Гѣффтъ!? Нарзанъ. Гѣффтъ!? Балкарія, между кустарниками. VI.01. Десулави! Кисловодскъ, по р. Березовкѣ. 5. VII. 86. Акинф.! Кисловодскъ по р. Ольховкѣ. 28. VI. 86 Акинф.! Желѣзноводскъ, близъ горы Развилки. 2400'. Акинф.! — **X. D.** Дагестанъ, Аварск. окр. близъ сел. Гергебилъ (Хергебъ). 3700'. 28. V. 01. Алекс.! Самурск. окр., близъ сел. Ахты, у теплыхъ водъ, въ садахъ. 3800'. 4. VIII. 98. Алекс.! (semina nigra). Близъ Гуниба. 4000'—4500'. 5. VII. 97. Алекс.! Гунибъ. VI. 94. Радде и Кёнигъ! — **S. D.-K.** Дагестанъ, Даргинск. окр. близъ Микиги. 4400', на скалахъ между кустарниками мѣстности Берханы-Када. 4.VII. 98. Алекс.! Даргинск. окр. у дороги близъ сел. Валкаръ. 5700'. 19.VII.98. Алекс.! — **S. S.-K. (?)** Карабахъ, с. Агдаганъ. 7. VI. 95. Сел. Базаръ-чай. 7. VII. 6000'. Ломакинъ. — **S. P.** Между Бечо и Пари въ лѣсахъ. 16. VIII. Соммье и Левье.

Arg. Geogr. Europa media et australis ab Anglia et Dania ad Galliam et Dalmatiam, Africa borealis.

Примѣч. *Bryonia dioica* Jacq. на Кавказѣ встрѣчается преимущественно на сѣв. скл. Главнаго хребта; простѣдять ея распространеніе въ Закавказьѣ въ виду недостаточнаго матеріала гербарнаго довольно затруднительно. Очень часто этотъ матеріалъ, въ особенности старый, плохо сохранился и плохо собранъ. Таковъ напр. матеріалъ Д-ра Гѣффта, Эйхвальда, Гогенаккера. Подобный матеріалъ хотя и приводится мной, но вездѣ со знакомъ? Такимъ же образомъ со знакомъ? ци-

тируется и литература, гдѣ сбивчивыя показанія авторовъ не даютъ возможности точно установить фактъ нахождения того или другого вида. Съ вопросительн. же знакомъ я позволю себѣ цитату изъ „Матеріаловъ для флоры Карабаха“ А. А. Ломакіна, который приводитъ для Карабаха *B. dioica* Jacq., между тѣмъ въ гербаріѣ Тифл. Бот. Сада, гдѣ хранятся всѣ растенія его изъ упомянутой мѣстности, какъ разъ этого вида на лицо не имѣется. Возможно, что авторъ приводитъ растеніе только по памяти. Весьма странно, что въ плодахъ *B. dioica* изъ въкоторыхъ мѣстностей Кавказа сѣмена имѣютъ черную окраску, тогда какъ въ большинства случаевъ сѣмена бываютъ буроватыя. Было бы интересно прослѣдить эту особенность въ окраскѣ сѣмянъ на растеніяхъ въ культурѣ.

2. *B. alba* L. *monoica*, foliis cordatis quinquelobis, longe petiolatis, callosos-asperis, margine crenulato-denticulatis; floribus femineis in racemos corymbosos, longe pedunculatos dispositis; *calycibus femineis* corollam *aequantibus*, *stigmatibus glabris*, baccis *nigris*. 2. v. s. in h. P. A. Tm. Th. J.

L. sp. ed. 1, p. 1012. — Ser. in DC. Prodr. III. p. 307. — Spach, Veg. phan. 6, p. 227. — Roem. Syn. fasc. 2, p. 38. — Naud. in Ann. sc. nat. ser. 4, v. 12. p. 139. — Gölldenst. It. II. p. 166. — Pall. Ind. Taur. — Georgi. Besch. d. Russ. Reich. III. 4. p. 307. — MB. Fl. taur. cauc. II. p. 410; III. p. 625. — Stev. in Cat. h. gorenk. 1812. — Eichw. Skizze. p. 161; casc. cauc. p. 29, 30. — C. A. Meyer. Verzeichn. der. Pflanz. d. Cauc. p. 83. — Hohenack. Enum. Elisabethpol. p. 246; Enum. Talysch. p. 62. — Ledeb. II. 140. — Boiss. II. 762. — Cogniaux, in De Candoll. Monograph. phaner. III, p. 476. — Оверинъ. Замѣт. о раст. Ахалцхск. у. стр. 255. — Ризенкамппфъ, Спич. Пятигорск. Фл. № 389, 588. ? — Акинф. Флора Центр. Кавк. I. стр. 179. — Липск. Фл. К. 309.

Syn. *B. alba baccis nigris* Bauh. Pinax, p. 297. — *B. nigra* Dmrt. Florul. Belg. p. 54. — *B. aspera* Stev. Cat. Gorenk. 1812, p. 32. secut. Cogniaux. — C. A. M. Verzeichn. der Pflanz. d. Cauc. p. 83. — *B. dioica* MB. Fl. taur. cauc. III. p. 625. — *B. alba* f. MB. Fl. taur. cauc. II. p. 410. Icon. Rechb. tab. 1620.

Hab. in sepibus et dumetis Tauriae, Caucasi et prov. Transcaucasiae. — S. T.-N. Крымъ. Палласъ. Крымъ. Корбеклы. 20. VI. 96. Гольде! Крымъ. МБ.! — S. T. Кисловодскъ, окрестн. Нарзана. К. А. Мейеръ. Влизъ Нарзана. Гогенаккеръ!? — S. P. Имеретія. Гюльденштедтъ. — S. Ib. Иберія. Вильгельмъ. — S. D.-K. Бакинск. губ., Кубинск. у., между сел. Сѣгебъ и Будугъ на холмахъ. 5700'. 14. VII. 99. Алекс.! — S. S.-K. Карагнскъ. Эйхвальдъ!? Шуша. Гогенаккеръ!? Елисаветполь. Гогенаккеръ. — X. A. Между Сухимъ Фонтаномъ и Эйларомъ, на камняхъ, у дороги. 22. VII. 02. Ом.! Ольгинск. окр. Карской обл., пограничн. постъ Эрюкъ. 13. VII. 03. Кёнигъ! Ольты. 12. VII. 03. Кёнигъ! Влизъ сел. Лишкъ, въ Карабахъ. 24. VI. 03. Гриневъ! Эриванск. губ. Дарачичагъ, у дороги. 30. VII. 03. Гриневскій! У озера Чалдыръ-гёль, влизъ сел. Джала, Карской обл. 21. VI. 03. Михайловскій! — S. L. Талышъ, Суантъ Гогенаккеръ.

Ar. Geogr. Europa praesertim borealis et orientalis a Suecia, Germania et Helvetia ad Hungariam et Rossiam. Persia boreal.

Примѣч. На Кавказѣ этотъ в. встрѣчается преимущественно въ горно-степныхъ областяхъ, кое-гдѣ въ Дагестанѣ, и въ особенности въ южн. Закавказіи, гдѣ повидимому и встрѣчается только этотъ в., такъ какъ показанія авторовъ о нахожденіи въ южн. Закавказіи *B. dioica* Jacq. не подтверждаются.

Gen. 2. Ecballium Rich.

Flores monoici. *Masculi racemosi*. Calycis tubus brevis campanulatus, limbus 5-fidus. Corolla late campanulata profunde 5-loba, segmentis ovato-oblongis acutis. Stamina 3, libera filamentis brevibus, antherae latae, una unilocularis, ceterae biloculares, loculis sigmoideo-flexuosis, connectivo lato non producto. *Flores feminei solitarii*. Calyx et corolla maris. Staminodia 3—5, brevia, ligulata. *Ovarium oblongum, hispidum*, triplacentiferum; stylus brevis, stigmatibus 3 bifurcatis cruribus subulatis recurvis; ovula numerosa horizontalia. *Fructus* oblongus, *hispidus-echinatus*, aquosus *maturus a pedunculo solutus basiue contractus, e foramine basilari semina succumque elastice contracta emittens*. Semina oblonga parva, compressa, laevia, anguste marginata. — Herba prostrata crassa, carnosa, hispido-pilosa, cirrhis nullis, radice perennante.

Ecballium A. Rich. in Dict. class. Hist. Nat. 6, p. 19. — Endl. Gen. p. 937. — Benth. et Hook. Gen. I, p. 826. — Ledeb. II, 140. — Boiss. II, p. 759. — Cogniaux, in D C. Monogr. phan. III, p. 467. — Syn. *Elaterium* Riv. in Rupp. Fl. Jen. p. 47. (non Linn.). — *Momordicae* spec. Auct.

Species 1 regionis Mediterraneae incola.

1. *E. elaterium* A. Rich. crasse carnosulum et hispido-pilosum. Radice longa albida crassa. Caulibus decumbentibus crassis. *Cirrhis nullis*. Foliis longe petiolatis subtus *canis* cordato-ovatis vel triangularibus irregulariter dentatis vel trilobis, floribus axillaribus, masculorum racemis pedunculatis, femineis subsolitariis saepe ex eadem axilla cum masculis oriundis; corolla pallide flava, *fructu nutante ovoideo praeter echinos pubescente*; seminibus oblongis laevibus. 4. v. v. et s. in h. P. A. Tm. Th. J.

A. Rich. l. c. — Georgi, Besch. d. Russisch. Reich. III, p. 1320. — D C. Prodr. III, p. 311. — MB. Fl. taur. cauc. p. 410. — C. A. Meyer. Verzeichn. der Pflanz. d. Cauc. p. 83. — Eichw. Skizze. p. 161; casp. cauc. p. 23. — Hohenack. Enum. Elisabethpol. p. 245; Enum. Talsch. p. 62. — Ledeb. II, p. 141. — Boiss. II, 760. — Cogniaux. l. cit. — Ризенкамифъ, Пятигорск. Фл. № 1216. — Липск. Отъ Каспія къ Понту, стр. 19. — Шмальгауз. Фл. Ср. Россіи I, p. 377. — Липск. Фл. К. 309. — Radde, Mus. Cauc. II, p. 91.

Syn. *Cucumis sylvestris, asininus dictus* Bauh. Pinax, p. 314; — *C. sylv., sive asininus* Bauh. Hist. 2, p. 248. — *Momordica Elaterium* L. sp. 1434. — D C. Pr. III, p. 311. — *Elaterium cordifolium* Moench. Meth. p. 563. — *Momordica aspera* Lam. Fl. Fr. 2, p. 191. — *Ecballium agreste* Richb. Fl. Germ. exc. p. 294. — *E. purgans* Schrad. in Linnaea, XII, p. 421. — *E. officinale* Nees. Pl. off. tab. 271. — *E. officinarum* L. C. Rich. ex Roem. Syn. fasc. 2, p. 52.

Hab. in ruderalis Tauriae, Cauc. et Transcauc. — **S.T.-N.** Окрестности Севастополя, Георгіевск. монаст. Херсонесъ, Инкерманская бухта. 20—25. VI. 89. Коржинскій! Крымъ. МБ.! Левейе! Крымъ, Никита. VII. 96. Оедосѣвъ! 27. VI. 00. Гольде! Крымъ. Палласъ. — **S. K.** Кубанская обл. Тамань. 18. VI. 91. Липск.! — **St. C.** На поляхъ въ нижней части Терека къ Каспійскому морю. К. А. Мейеръ. — **S. D.-K.** Дербентъ. Беккеръ! Бакинск. губ., Кубинск. у., близъ ст. Дивичи. 400'. 28. VI. 99. Алекс.! Близъ ст. Кизиль-Бурунъ. 200', на сорныхъ мѣстахъ. 23. VII.

00. Алекс.! Дагестанъ, Дербентскій окр., близъ ст. Рубазъ на бесплодныхъ поляхъ. 0'. 11. VIII. 99. Алекс.! — **S. P.** Мингрелия. Эйхвальдъ. — **S. lb.** Бакинск. губ. Шемахинск. у., глинистые холмы. 2300'. 5. VIII. 00. Алекс.! Кахетія, Карданахъ, по сорнымъ мѣстамъ. 19. VIII. 00. Гриневецкій! Тифлисъ, окрестность. 1. VIII. 44. Коленати! 20. VIII. 00. Өом.!! 13. VI. 92. Липск.! Медвѣдевъ! — **S. S.-K.** Сомхетія. Шовичъ! — **St. Tr.** Муганская степь. Радде! 12. VI. 98. Левандов.! Мугань. V. 70. Радде! — **S. L.** Талышъ. Кизиль-агачъ. Гогенаккеръ.

Примѣч. *Ecballium elaterium* A. Rich. встрѣчается какъ въ Предкавказьѣ, такъ и въ восточномъ Закавказьѣ, преимущественно на сухихъ песчаныхъ или слегка солонцеватыхъ почвахъ, гдѣ весьма часто образуетъ цѣлыя заросли. Эйхвальдъ указываетъ *E. elaterium* въ Мингрелии, а между тѣмъ онъ отсутствуетъ въ „*Prodromus Florae Colchicae*“ Альбова, а кромѣ того и въ просмотренномъ мною матеріалѣ изъ Акад. Наукъ, Импер. Петерб. Ботан. Сада, Юрьевск. Бот. Сада и Кавказск. Музея ни одного экземпляра изъ Западн. Закавказья не было.

Subcohors II. Campanulineae.

Antherae non cohaerentes. Stamina libera vel tubo ipso corollae adnata, interdum stamina 2 filamentis cum stylo connatis.

Engl. in Engl.-Pr. Nat. Pflanzenfam. Nachtr. zu T. II—IV. p. 357.

Ord. II. Campanulaceae.

Calyx superus quinquelobus rarius 3—10-lobus. Corolla monopetala calyci inserta regularis laciniis cum lobis calycis alternantibus. *Stamina ante corollam ovario inserta laciniis corollae alterna et numero earum aequalia, filamenta libera basi saepe expansa, antherae liberae vel basi connatae.* Ovarium calycis tubo concretum 3—5-loculare rarius pluriloculare loculis multiovulatis, placentis centralibus. Stylus unicus, *stigma ramosum* ramis numero loculorum. *Fructus capsularis varie dehiscens.* Semina numerosa, embryo rectus in centro albuminis carnosus. — Herbae, rarius suffrutices.

Campanulaceae A. de Candolle, Monographie des Campanulacées, Paris. 1830. — Endl. Gen. 509, 513. — Lindl. Veg. Kingd. 689, 692. — D C. Prodr. VII. 414. — Eichl. Blütdiagr. I. 293, 297. — Juss. Gen. 163. — Benth. et Hook. Gen. pl. II. 2. p. 541. — Schönland, in Engl.-Pr. Nat. Pflzfam. IV. 5. p. 40, 394.

1. Коробочка раскрывается сбоку или близъ основанія дырочками или клапанами. (Завязь нижняя) **Campanulinae** (1).
Крбчк. раскрывается сверху на дискѣ клапанами или неправильными разрывами. (Завязь нижняя или полунижняя).

Wahlenberginae (II).

Примѣч. Представители сем. *Campanulaceae* встрѣчаются во всѣхъ ботанико-географическихъ областяхъ земного шара, но преобладаютъ главнымъ образомъ въ умеренныхъ странахъ обоихъ полушарій, гдѣ являются преимущественно растениями высокогорными. На Кавказѣ это семейство представлено двумя отрядами — *Campanulinae* (1.) и *Wahlenberginae* (2). Первый отрядъ свойственъ преимущественно Средиземноморской области, гдѣ находится и главный центръ его развитія. — Три монотипныхъ рода изъ этого отряда встрѣчаются, впрочемъ, исключительно въ Средней Азии

и Сѣв. Америкѣ. Таковы *Peracarpa carnosus* Hook., свойственная Гималаю, *Ostrowskia magnifica* Rgl. — Вухарѣ и *Heterocodon rariflorum* Nutt., присущій западной части Сѣв. Америки. Кавказъ такимъ образомъ лишенъ древнихъ монотипныхъ родовъ. — Кромѣ вышеупомянутыхъ отрядовъ флора Восточной Азіи владѣетъ еще монотипнымъ родомъ *Platyodon* изъ отряда *Platycodinae*, а флора Европы и Сѣв. Азіи имѣетъ и представителей крупнаго, преимущественно тропическаго подсемейства *Lobelioideae*, которое на Кавказѣ также совершенно отсутствуетъ. Что касается второго, имѣющагося на Кавказѣ, отряда *Wahlenberginae*, то большая часть его родовъ свойственна тропическимъ странамъ, гдѣ напр. *Wahlenbergia*, имѣющая главнымъ центромъ своего развитія южное полушаріе, является замѣстителемъ рода *Campanula*, свойственнаго сѣверному полушарію, но при всемъ томъ встрѣчается и въ Зап. Европѣ и Восточной Азіи.

Изъ отряда *Campanulinae* мы встрѣчаемъ на Кавказѣ 6 родовъ, изъ которыхъ *Campanula*, *Symphyantra* и *Podanthum* являются по преимуществу растениями высокогорными; родъ *Adenophora* населяетъ, повидимому, низкія части лѣсной области, а роды *Specularia* и *Michauxia* распространены въ степяхъ и каменныхъ пустыняхъ.

Изъ отряда *Wahlenberginae* на Кавказѣ имѣются всего только два рода, изъ которыхъ *Haedraeanthus*, представленный здѣсь всего однимъ видомъ, является исключительно высокогорнымъ растеніемъ, родъ же *Jasione*, имѣющій здѣсь европейскаго представителя *J. montana* можетъ считаться, повидимому, растеніемъ горно-степнымъ. Такимъ образомъ отрядъ *Wahlenberginae* оказался на Кавказѣ бѣднымъ, чѣмъ даже въ Средней и Восточн. Азіи, гдѣ изъ этого отряда встрѣчаются 5 родовъ: *Campanulaceae*, *Codonopsis*, *Leptocodon*, *Cyananthus* и *Wahlenbergia*, которые, исключая монотипнаго *Leptocodon*, представлены тамъ нѣсколькими видами. — Сравнивая теперь родовыхъ представителей азіатскихъ и европейскихъ съ таковыми же представителями Кавказа, мы приходимъ къ тому заключенію, что по родамъ флора *Campanulaceae* Кавказа довольно далеко отстоитъ отъ флоры Азіи и ближе подходитъ къ флорѣ европейской, а въ частности къ флорѣ Средиземноморской области. Характерными средиземноморскими родами на Кавказѣ оказываются *Specularia*, *Symphyantra* и *Haedraeanthus*, изъ которыхъ два послѣдніе рода имѣютъ здѣсь крайній восточный предѣлъ своего распространенія и развились здѣсь въ эндемичныя формы, причемъ родъ *Symphyantra* представленъ на Кавказѣ даже особой секціей „*Appendiculatae*“, не имѣющей въ Средиземноморской области.

Сѣверно-азиатскій родъ *Adenophora* для Кавказа приводится только по показаніямъ Гюльденштедта и нигдѣ изъ позднѣйшихъ изслѣдователей не былъ найденъ. Такъ какъ *Adenophora lilifolia* встрѣчается въ Крыму и на югѣ Россіи, то возможно, конечно, что показаніе этой формы на сѣв. Кавказѣ со временемъ и подтвердится.

Родъ *Michauxia* — мало-азиатско-персидскій встрѣчается въ южной части Закавказья; представитель его *Michauxia laevigata* мигрировала на Кавказъ, вѣроятно, съ юго-востока изъ Персіи. Родъ *Podanthum* по преимуществу мало-азиатскій, но имѣетъ своихъ представителей и въ восточной части Средиземноморской области. Большая часть представителей этого рода на Кавказѣ сосредоточена въ южной и юго-западной частяхъ Закавказья.

Родъ *Campanula*, широко распространенный по всему сѣверному полушарію, представляетъ для флоры Кавказа особый интересъ, такъ какъ даетъ здѣсь цѣлый рядъ эндемичныхъ формъ.

Разсмотримъ теперь флору *Campanulaceae* Кавказа въ видовомъ отношеніи. Изъ 73 формъ этого семейства, встрѣчающихся въ предѣлахъ Кавказа, 37 формъ или 50% являются эндемичными для него. Если изъ этого числа 73 мы исключимъ роды *Jasione*, *Michauxia*, *Adenophora* и *Specularia*, не имѣющие эндемичныхъ представителей, то число 37 эндемичныхъ формъ придется на роды *Campanula*, *Symphyantra*, *Podanthum* и *Haedraeanthus* и распределеніе ихъ будетъ таковое: изъ 53 формъ

Campanula эндемичныхъ будетъ 29 или 50%; изъ 7 формъ *Podanthum* эндемичныхъ 2 или 28% и наконецъ всѣ кавказскія 5 формъ рода *Symphyaandra* и одна форма *Haedraeanthus* оказываются исключительно эндемичными и даютъ такимъ образомъ 100% эндемизма. Наибольшая часть эндемичныхъ формъ изъ этого сем. принадлежитъ къ растениямъ высокогорнымъ, сосредоточена на Главномъ хребтѣ, преимущественно въ его западной и центральной частяхъ, съ удаленіемъ отъ которыхъ на востокъ сразу замѣчается убыль въ количествѣ эндемичныхъ формъ. Горы Малаго Кавказа даютъ мало эндемичныхъ формъ, но представляютъ большой интересъ въ томъ отношеніи, что съ одной стороны служатъ мѣстомъ разлѣна между формами, пришедшими на Кавказъ съ востока и юга, съ другой же стороны даютъ у себя пріютъ типамъ средиземноморскому и высокогорному-европейскому. Какъ примѣръ перваго можно указать на *Campanula lyrata*, *Campanula crispa* принадлежащія къ подсекціи *Quinqueloculares*, характерной вообще для восточной части Средиземноморской области, а примѣромъ втораго типа является *Campanula thyrsoides*, свойственная альпамъ Европы.

Что касается лѣсныхъ формъ, степныхъ и горностепныхъ, то эндемичныхъ между ними мало и большинство ихъ относится къ формамъ прилимымъ, мигрировавшимъ на Кавказъ частью изъ Европы, частью изъ соедѣнныхъ пространствъ Персіи и Малой Азіи. Общихъ формъ у Кавказа съ Европой немного и къ нимъ относятся представители тривіальной флоры, какъ *Jasione montana*, *Campanula Trachelium*, *C. rapunculoides*, *C. Bononiensis*, *C. glomerata*, *C. persicifolia*, *C. rotundifolia*, *C. latifolia*, *C. Runculus*, *C. patula*. Большая часть этихъ формъ, будучи сорными или почти сорными, имѣютъ широкое географическое распространеніе и встрѣчаются также и въ Сѣв. Азіи, а такая форма, какъ *C. rotundifolia* является общей даже для всего сѣв. полушарія, такъ какъ населяетъ Европу, Сѣв. Азію и Сѣв. Америку. Въ общемъ всѣ эти формы мало характерны для флоры Кавказа, такъ какъ только немногія изъ нихъ могли развиваться здѣсь въ эндемичные варьеты, имѣющіе покуда значеніе расъ.

Азиатскаго происхожденія, повидимому, будутъ только *Campanula Steveni*, *C. sibirica*, а также и *Adenophora liliifolia*, миграція которыхъ на Кавказъ шла, вѣроятно, съ сѣвера и сѣверо-востока.

Сравнительно немного общихъ формъ у Кавказа съ Персіей и Малой Азіей. Однѣ изъ нихъ происхожденія несомнѣнно кавказскаго, другія развились въ областяхъ пограничныхъ и отечествомъ ихъ слѣдуетъ считать горныя пространства Малой Азіи и Персіи. Послѣднія формы сосредоточены въ южномъ Закавказьѣ¹⁾.

Общіе выводы, полученные мной при изученіи семейства *Campanulaceae* Кавказа могутъ быть сформулированы въ слѣдующихъ пунктахъ:

1) Большой %, эндемичныхъ формъ, составляющій особенность флоры *Campanulaceae* на Кавказѣ, заставляетъ признать этотъ край довольно крупнымъ и самостоятельнымъ центромъ возникновенія и расселенія видовъ *Campanula* и *Symphyaandra*.

2) Наибольшее количество эндемичныхъ формъ сосредоточено въ западной и центральной частяхъ Главнаго хребта, причемъ формы наиболѣе древнія сосредоточены именно въ западной и юго-западной частяхъ. Съ удаленіемъ отъ западной и центральной частей Главнаго хребта, а равно и юго-западной части Кавказа, со сѣверней съ Понтийскимъ хребтомъ, на востокъ и югъ количество эндемичныхъ формъ сразу уменьшается.

3) Малый Кавказъ даетъ незначительное количество эндемичныхъ формъ, число которыхъ можетъ со временемъ и уменьшиться, такъ какъ изъ которыхъ формы несомнѣнно найдутся въ соедѣнныхъ горахъ Малой Азіи и Персіи. Несмотря на это, горы Малаго Кавказа являются интересными въ томъ отношеніи, что тамъ мы встрѣчаемся съ формами сѣверными, населяющими преимущественно сѣв. Азію и сѣв. Европу. Таковы напр. *C. rotundifolia* и *C. persicifolia*, чрезвычайно рѣдкія для флоры Кавказа.

1) Подробныя замѣчанія объ этихъ формахъ см. въ примѣч. къ роду *Campanula* и къ видамъ его.

4) Съ альпами Европы горы Кавказа имѣютъ всего только одну общую форму. Другія формы, общія у Кавказа съ Европой, населяя ея лѣсную и степную области, имѣютъ широкое географическое распространение и для флоры Кавказа являются мало-характерными, такъ какъ нѣкоторыя изъ нихъ могутъ считаться сорными или почти сорными.

5) Съ Средиземноморской областью, помимо вышеупомянутыхъ родовыхъ представителей, какъ *Haedraeanthus* и *Symphyantra*, Кавказъ имѣетъ слѣдующіе общіе типичные виды: *C. lyrata*, *Specularia pentagonia*, *Sp. falcata* и *Campanula fastigiata*. Первые два характерны для восточной части Средиземноморской области и вторые два для всей Средиземноморской области.

<i>Campanula</i>	53 вид. (изъ 240), 29 энд.	<i>Michauxia</i>	1 в. (6).
<i>Symphyantra</i>	5 в. (7), 5 энд.	<i>Podanthum</i>	7 в. (22), 2 энд.
<i>Adenophora</i>	1 в. (10).	<i>Haedraeanthus</i>	1 в. (11), 1 энд.
<i>Specularia</i>	4 в. (10).	<i>Jasione</i>	1 в. (5).

Subord. I. 1. a. Campanuloideae-Campanuleae-Campanulinae.

Corolla campanulata, infundibuliformis, vel rotata, rarius profunde partita. Filamenta libera, antherae liberae, vel interdum basi connatae. Stylus semper pilis collectoribus obsitus. Ovarium inferum 3—5 loculare, vel rarius pluriloculare, supra planum, placentis centralibus. Fructus capsularis lateraliter dehiscens (rarius indehiscens et baccatus). Herbae vel rarius suffrutices.

Schönl and, in Engl.-Pr. IV. 5. p. 48.

1. Вѣнчикъ выше основанія раздѣляется на линейныя доли . . . 2.
Вѣнчикъ колокольчатый, воронковидный, рѣже колесовидный, раздѣляется отъ $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ на широкія лопасти 3.
2. Долей вѣнчика 8—10, чашечка въ выемкахъ между долями съ придатками *Michauxia* L'Her. (5).
Долей вѣнчика всегда 5 свободныхъ или наверху слегка соединенныхъ, чашечка въ выемкахъ безъ придатковъ.
3. Столбикъ у основанія окруженъ цилиндрическимъ кольцомъ. *Podanthum* Boiss. (6).
Столбикъ не имѣетъ такого кольца и поднимается съ плоскаго диска *Adenophora* Fisch. (3).
4. Вѣнчикъ колесовидный, коробочка призматическая. *Specularia* Heist. (4).
Вѣнчикъ колокольчатый или воронковидный. Коробочка округлая, коническая 5.
5. Пыльники сросшіеся *Symphyantra* D C. (2).
Пыльники свободные *Campanula* L. (1).

Gen. 1. Campanula L.

Calyx quinquefidus, sinubus saepe appendicibus obtectis. Corolla quinqueloba, vel quinquefida plerumque campanulata, infundibuliformis, rarius tubulosa, vel subrotata. Stamina libera filamentis basi dilatatis, antherae liberae. Stylus pilis collectoribus obsitus, stigmata 3—5. Capsula rotundata 3—5-locularis poris 3—5 lateraliter ad basin, ad medium, vel sub apice dehiscens. — Herbae perennes, monocarpicae, vel annuae, floribus plerumque coeruleis, rarius violaceis, vel albis, speciosis. Inflorescentia racemosa, spicata, capitata, rarius scapiflora.

Campanula L. Gen. n. 290. — D C. Monogr. Camp. p. 213. — D C. Prodr. VII, p. 457. — Benth. et Hook. II, 2. p. 561. — Juss. gen. p. 164. — Ledeb. II, p. 875. — Boiss., III, p. 893. — Vatke, in Linnaea. XXXVIII, p. 703. — Rupr. Bull. de l'Acad. d. sc. de St. Petersb. XI. 1867. p. 174. — Trautv. Acta H. P. VI. 41—104. — Feer. Journ. of Botany. XXVIII, p. 268—274. — Schönl. land, Engl.-Prntl. IV. 5. p. 49—51. — Syn. *Erineon* Plin. I. 23. 17. — *Rapuncleoli* Brunnf. herb. viv. 286. — *Uvulariae* spec. Trag. hist. 926. — *cervicariae* spec. Cord. Dod. pempt. 164. — *Rapi* spec. Ruell. p. 458; Fuchs. hist. p. 214. — *Campanula* Fuchs. hist. p. 43.; Rai. Meth. pl. p. 82; Tourn. elem. bot. I. p. 90. t. 37. — *Medii* seu *Violae* species Matth. comm. ed. Valyr. p. 633. — *Trachelium* Lob. hist. 176; Cus. hist. I. V. p. 171. — *Rapunculus*, *Campanula glabra*, *Trachelium* C. Bauh. pin. 92. et 94. J. Bauh. hist. 2. p. 795. — *Campanulae* spec. Linn. gen. n. 290. — *Roucela* Dumortier. Comm. bot. p. 14. — *Medium* Fisch. mscr. — *Marianthemum* Schrank. hort. Monac.

Species fere ad 240, hemisphaerae borealis et praesertim montium regionis mediterraneae incolae.

1. Рылецъ 5, коробочка пятигнѣздная открывается клананами у основанія, выемки чашечки снабжены придатками 2.
- Рыльца 3, коробочка трехгнѣздная открывается различно, выемки чашечки съ придатками или безъ придатковъ . . . 3.
2. Вѣдчикъ широко-колокольчатый длиннѣе чашечки въ 3 раза, придатки чашечки зубчиковидные, маленькіе. Листья неправильно-крупно-городчатые или надрѣзные по краю волнистые. *C. crispa* L a m. (1).
- Вѣдчикъ трубковидный, къ отгибу слегка расширенный, длиннѣе чашечки въ 2 раза, придатки чашечки длиннѣе ея трубки. Листья зубчато-городчатые *C. lyrata* L a m. (2).
3. Выемки чашечки снабжены придатками:
 - a) растенія двулѣтнія или многолѣтнія 4.
 - b) растенія однолѣтнія 52.
 - Выемки чашечки безъ придатковъ 38.
4. Цвѣточный стебель многоцвѣтковый. Цвѣты сидячіе, расположенные колосомъ, кистью, головкою, или же цвѣты снабжены болѣе или менѣе длинными цвѣтоножками. Растенія болѣе или менѣе высокія 5.
- Цвѣточный стебель, отходящій отъ прикорневыхъ розетокъ листьевъ, заканчивается однимъ цвѣткомъ, или же цвѣточн. стебель заканчивается немногими цвѣтками, причемъ растенія болѣею частью низкія, снабжены то подземными тонкими побѣгами, заканчивающимися наружу безплодной розеткой листьевъ, то пучками безплодныхъ побѣговъ 15.
5. Цвѣты сидячіе 6.
- Цвѣты снабжены цвѣтоножками 7.
6. Цвѣты одиночные, сидящіе въ пазухахъ листьевъ, расположены въ колосовидное соцвѣтіе или иногда стебель съ однимъ только цвѣткомъ *C. stricta* L. (43).
- Цвѣты собраны головкой и окружены оберткой изъ широкихъ и длинныхъ прицвѣтниковъ продолговатой формы. *C. macrochlamys* Boiss. (44).
7. Прикорневые листья продолговато-ланцетные или продолговато-лопатчатые, оттянутые въ крылатый черешекъ 8.
- Прикорн. лст. съ длинными не крылатыми черешками и съ болѣе или менѣе сердцевиднымъ основаніемъ пластинки 9.
8. Листья твердые, кожистые, посаженные только по краю маленькими прозрачными колючками. Вѣдчикъ широко-колокольчатый по краю бородачатый, доли чашечки посажены по краю такими же колючками *C. mirabilis* Alb. (4).

- Лст. не кожистые, покрытые по большей части съ обѣихъ сторонъ или только по краймъ бѣлыми, толстоватыми рѣсничатыми волосками 11.
9. Прикорневые листья треугольно-сердцевидные, снизу сѣро-войлочные. Вѣнчикъ бѣлый, придатки чашечки по длинѣ равняются ея трубкѣ *C. allfarlaefolia* W. (10).
- Прикорн. лст. иной формы 10.
10. Прикорн. лст. продолговатые, тупые съ сердцевиднымъ основаниемъ, стеблевые съ клиновиднымъ основаниемъ. Придатки чашечки очень малы или отсутствуютъ. *C. collina* M. B. (12).
- Прикорн. лст. сердцевидно-копьевидные, заостренныя, курчаво-городчатые съ черенкомъ, снабженнымъ иногда боковыми дольками. Придтк. чашечки въ 3 раза короче ея трубки. *C. sarmatica* Ker. (11).
11. Растенія зеленые, часто съ блескомъ, прикорн. лст. довольно крупныя съ продолговато-овальной пластинкой, постепенно оттянутой въ крылатый, выемчато-лопастной черешекъ, стеблевые продолговато-овальные 12.
- Растенія сизыя или зеленые, но прикорн. лст. лопатчатые, почти сразу суженные въ черешекъ, стеблевые ланцетные или линейно-ланцетные 13.
12. Вѣнчикъ крупный широко-колокольчатый¹⁾, по краю бородачатый, въ періодъ цвѣтенія всегда поникающій. Столбикъ обыкновенно сильно выставляется изъ вѣнчика *C. longestyla* m. (3).
- Вѣнчикъ небольшой воронковидный, стоящій вверхъ, столбикъ во время цвѣтенія не выставляется изъ вѣнчика. *C. imeretina* Rupr. (7).
13. Стебли стелящіеся съ небольшими цвѣтами, растенія даютъ ползучіе побѣги, оканчивающіеся розеткой листьевъ и укореняющіеся. Листья маленькіе съ прижатыми по краю бѣлыми курчавыми рѣсничками *C. caucasica* M. B. (8).
- Стебли прямые или восходящіе. Ползучихъ побѣговъ нѣтъ. 14.
14. Стебель прямой, большею частью одинъ и съ узкимъ метельчатымъ соцвѣтіемъ. Все растеніе зеленое. Чашелистики узколанцетные, сильно заостренные. Придатки тупые въ 2—3 раза короче чашелистниковъ *C. sibirica* L. (5).
- Стеблей нѣсколько, восходящихъ отъ деревянистаго корневища. Все растеніе сизое съ прижатыми, курчавыми волосками. Чашелистики треугольно-ланцетные, туповатые. Придт. обратно-яйцевидные, почти одинаковой длины съ чашелистниками и заходятъ одинъ за другой *C. daghestanica* m. (6).
15. Цвѣты небольшіе, рѣже крупныя. Стебель имѣетъ 1—3—5 цвѣтковъ 16.
- Цвѣты крупныя, заканчивающіе всегда одноцвѣтковый стебель. 27.
16. Прикорневые листья болѣе или менѣе съ сердцевиднымъ основаниемъ 17.
- Прикорнев. лст. иной формы, растенія снабжены у основанія пучками бесплодныхъ побѣговъ 25.
17. Растенія низкія съ маленькими листьями. Придатки чашечки всегда короче ея трубки 18.
- Растенія съ болѣе или менѣе высокими стеблями и болѣе крупными листьями. Придатки чашечки длиннѣе ея трубки или же очень коротки 21.
18. Листочки сверху зеленые бархатисто-пушистыя, снизу бархатисто-сѣро-войлочные, по краю волнистыя и съ удаленными зубчиками. Вѣнчикъ пушистый небольшой, доли чашечки широко-треугольныя, слегка пріостренныя *C. Massalskyi* m. (36).
- Листочки съ обѣихъ сторонъ зеленые, пушистыя или голые. 19.

1) Въ живомъ состояніи имѣетъ форму цвѣтка *C. medium*, т. е. у основанія иверху расширенный и въ серединѣ слегка сжатый. Рылецъ часто бываетъ 4 и весьма рѣдко 5.

19. Чашечка широкая почти колесовидная съ сильно оттопыренными назадъ долями. Вѣнчикъ трубчато-воронковидный, книзу сразу сѣуженный **C. Choziatowskyi** n. (35).
Чашечка не широкая, доли ея направлены вверхъ, обхватывая колокольчатой формы вѣнчикъ 20.
20. Стебли обыкновенно укорочены, густо покрыты почти сидячими округлыми мелко-городчато-зубчатыми листочками. Вѣнчикъ средней величины или небольшой, доли чашечки ланцетныя, чуть пріостренныя. **C. andia** Rupr. (29).
Стебли всегда удлиненные, изгибистые, листочки овальной формы по краю съ крупными и мелкими зубцами и отдаленными, загнутыми вверхъ рѣсничками. Вѣнчикъ небольшой, доли чашечки треугольныя сильно заостренныя. **C. Bayernlana** Rupr. (34).
21. Доли чашечки и ея придатки по краямъ усажены бѣлыми, книзу расширенными, прозрачными щетинками. Придатки чашечки много длиннѣе ея трубки 22.
Доли чашечки и ея придатки по краю лишены щетинокъ. Придатки чашечки очень коротки или длинныя 23.
22. Вѣнчикъ средней величины, столбикъ слегка выставляется изъ вѣнчика. Листья кожистые, твердые, сердцевидные или треугольно-сердцевидные съ крупными широко-треугольными зубцами **C. Raddeana** Trautv. (33).
Вѣнчикъ крупный, по краю болѣе или менѣе бородачатый. Прикорневые листья овальныя, тупые съ сердцевиднымъ основаниемъ, городчато-зубчатыя **C. Kolenatiana** C. A. M. (32).
23. Придатки чашечки шиловидныя, часто загнуты крючкомъ, длиною превосходятъ трубку чашечки **C. calcarata** Som m. & Lev. (13).
Придатки чашечки въ формѣ зубчиковъ, очень коротки. 24.
24. Доли чашечки, снабженныя по краямъ мелкими зубчиками, въ 2-3 раза короче вѣнчика и при цвѣтеніи отогнуты назадъ. Прикорневые листья овальныя или продолговатыя съ глубокимъ сердцевиднымъ вырѣзомъ у основанія. **C. suanetica** Rupr. (31).
Доли чашечки не имѣютъ зубчиковъ и въ 4-5 разъ короче вѣнчика. Прикорн. лст. меньше, чѣмъ у предыдущаго вида, продолговато-овальныя, у основанія закругленные, слегка съ сердцевиднымъ основаніемъ **C. Autraniana** Alb. (30).
25. Листья прикорневые и стеблевые узко-линейныя, снизу сѣрповидно-вогнутыя **C. hypopolia** Trautv. (-6).
Листья по большей части овальныя или продолговато-ланцетовидныя и лишены войлочнаго покрова 26.
26. Вѣнчикъ обыкновенно крупный, по краю болѣе или менѣе бородачатый. Придатки чашечки во много разъ короче ея трубки. Листья тонкія овальныя или обратно-овальныя съ длиннымъ, тонкимъ черешкомъ **C. petrophila** Rupr. (27).
Вѣнчикъ средней величины не бородачатый. Придатки чашечки длиннѣе ея трубки и вмѣстѣ съ долями кожистой чашечки снабжены отдаленными, загнутыми рѣсничками. Листья продолговато-ланцетные, сверху покрыты отогнутыми назадъ щетинками, снизу голые, по краю съ отдаленными, притупленными зубчиками **C. Ledebouriana** Trautv. (28).
27. Цвѣтоложе покрыто жесткими волосками, вѣнчикъ пушистый или голый 28.
Цвѣтоложе голое, вѣнчикъ всегда голый 31.
28. Пластинка листьевъ пушистая, линейная или линейно-ланцетная, постепенно оттянутая въ черешекъ, болѣе или менѣе городчатая 29.
Пластинка листьевъ прикорневыхъ округлая или овально-округлая съ тонкимъ черешкомъ, стеблевыхъ такой-же формы или лопатчатая 30.

29. Вѣнчикъ густо пушистый, доли чашечки въ 2—3 раза короче вѣнчика *C. Aucheri* D C. (20).
Вѣнчикъ голый, очень рѣдко чуть пушистый, доли чашечки въ 3—4 раза короче вѣнчика *C. saxifraga* M B. (19).
30. Вѣнчикъ обыкновенно крупный, вмѣстѣ съ чашечкой густо пушистый, доли чашечки въ 2—3 раза короче вѣнчика, придатки чашечки заостренные длиннѣе ея трубки. *C. argunensis* Rupr. (21).
Вѣнчикъ менѣе крупный, вмѣстѣ съ чашечкой голый, доли чашечки въ 3—5 разъ короче вѣнчика, придатки чашечки туповатые, менѣе длиннѣе ея трубки. *C. bellidifolia* A d a m. (22).
31. Форма вѣнчика коническая или трубковидно-ворончатая. 32.
Форма вѣнчика широко-колокольчатая или колокольчатая 36.
32. Вѣнчикъ крупный, доли чашечки линейныя въ $1\frac{1}{2}$ —2 раза короче вѣнчика 33.
Вѣнчикъ средней величины, доли чашечки отъ 2—6 разъ короче вѣнчика 34.
33. Прикорневые листья продолговато-лопатчатые, оттянутые въ черешекъ, на вершинѣ съ 3—5 зубчиками, по краю вмѣстѣ съ долями чашечки и ея придатками обыкновенно густо-шерстистые. *C. tridentata* Schreb. (16).
Прикорневые листья линейно-ланцетные съ сидячимъ основаніемъ, образующіе розетку, по краямъ железисто-городчатые и кромѣ того какъ и доли чашечки и ея придатки усажены оттопыренными рѣсничками *C. cillata* Stev. (14).
34. Придатки чашечки длиннѣе ея трубки, чашелистики узкіе линейные, почти шиловидные. Прикорневые листья узко-линейные или узко-линейно-ланцетные. *C. ardonensis* Rupr. (25).
Придатки чашечки чуть замѣтны или отсутствуютъ 35.
35. Доли чашечки линейныя съ обѣихъ сторонъ голыя короче вѣнчика въ 5—6 разъ, прикорневые листья кожистые блестящіе продолговато-ланцетные съ сидячимъ основаніемъ въ розеткахъ, по краю усажены толстыми загнутыми назадъ рѣсничками. *C. Dzaaku* A l b. (15).
Доли чашечки треугольно-ланцетныя, съ наружной стороны голыя, со внутренней бѣло-войлочные, въ 3 раза короче вѣнчика. Прикорневые листья ланцетные, сверху покрыты прижатыми волосками *C. besenginica* m. (24).
36. Пластика прикорневыхъ листьевъ овально-округлая съ длиннымъ, тонкимъ черешкомъ. Чашелистики узкіе линейные въ 2—3 раза короче вѣнчика *C. kryophila* Rupr. (23).
Пластика прикорн. листьевъ продолговато-ланцетная, сверху часто усѣченная съ нѣсколькими зубчиками, сразу суженная въ длинный тонкій черешекъ 37.
37. Вѣнчикъ широко-колокольчатый крупный, чашелистики треугольно-ланцетные въ 3-раза короче вѣнчика. Нижняя часть плодущихъ и безплодныхъ побѣговъ покрыта густо влагалищами старыхъ листьевъ *C. anomala* m. (18).
Вѣнчикъ колокольчатый менѣе крупный, чашелистики ланцетные, пріостренные въ 4—5 разъ короче вѣнчика. *C. circassica* m. (17).
38. Коробочка открывается клапанами или трещинами у основанія. 39.
Коробочка открывается дырочками у ея верхушки или около середины 45.
39. Цвѣты сидячіе, расположены въ конечныя головчатые соцветія или еще и въ пазухахъ сидящихъ яйцевидно-ланцетныхъ листьевъ, и окружены оберткой изъ продолговатыхъ прицвѣтниковъ. *C. glomerata* L. (45).
Цвѣты снабжены цвѣтоножками и расположены въ видѣ кисти или метелки 40.
40. Растенія снабжены кромѣ плодущихъ еще безплодными побѣгами,

- листья которых городчатые почковидно-сердцевидные, у плодущих же побегов ланцетные или линейные. Чашелистики линейно-шиловидные *C. rotundifolia* L. (37).
 Растения не имеют таких бесплодных побегов. Чашелистики линейные, ланцетные или треугольно-ланцетные 41.
41. Нижние листья овальные или продолговато-овальные с округлым или сердцевидным основанием неравно или дважды пильчатые 42.
 Нижние листья треугольно-сердцевидные, по краю дважды крупнозубчатые. Все растение покрыто редкими жесткими волосками. *C. Trachelium* L. (40).
42. Стеблевые листья все с черешками, равными по длине $\frac{1}{2}$ листовой пластинки. Чашелистики линейные или линейно-ланцетные, снабжены отдаленными зубчиками и загнутыми вверх короткими ресничками *C. odontosepala* Boiss. (39).
 Стеблевые листья сидячие или некоторые из них с короткими черешками, чашелистики лишены зубчиков 43.
43. Цветы большие направлены вверх, чашелистики прилегают к вѣничку *C. latifolia* L. (38).
 Цветы средней величины или небольшие, направлены горизонтально или поникающие, чашелистики при цветении отогнуты назад или оттопыренные 44.
44. Листья снизу больше или меньше густо сѣро-пушистые. Цветы собраны в короткую кисть или узкую метелку. Чашелистики при цветении оттопыренные *C. bononiensis* L. (42).
 Листья гладкие или снизу вдоль жилок с волосками, цветы собраны в одностороннюю кисть. Чашелистики при цветении отогнуты назад *C. rapunculoides* L. (41).
45. Растение однолетнее, легко вырываемое с корнем. Чашелистики линейно-ланцетные, превышают вѣничок почти на $\frac{1}{2}$ своей длины. Цветы маленькие, почти сидячие, расположены на коротких двураздѣльных вѣточках. *C. fastigiata* L. (46).
 Растение двулетнее или многолетнее. Чашелистики не превышают вѣничка 46.
46. Вѣничок крупный, широко-колокольчатый, соцветие широкая метелка или редкая кисть 47.
 Вѣничок средней величины, трубчато-воронковидный или широко-воронковидный, соцветие узкая густая метелка, раскидистая метелка или же стебель одноцветковый 49.
47. Чашелистики широко-треугольно-ланцетные зубчатые, вѣничок до половины раздѣлен на доли, листья овально-ланцетные пильчатые *C. lactiflora* M B. (48).
 Чашелистики овально-ланцетные или ланцетные 48.
48. Нижние листья продолговато-овальные, сразу оттянутые в длинный черешек, железисто-городчатые. Чашелистики овально-ланцетные, заостренные по краю, с загнутыми вверх зубчиками, трубка чашечки усажена бѣлыми, губчатыми сосочками. *C. pontica* A lb. (49).
 Нижние листья узко-лопатчатые, стеблевые ланцетно-линейные, мелко и отдаленно-пильчатые, чашелистики ланцетные, трубка чашечки гладкая или с жесткими волосками. *C. persicifolia* L. (50).
49. Вѣничок широко-воронковидный, чашелистики узко-ланцетные, едва превышающие длинную трубку чашечки. Стебель заканчивается одним цветком, реже 2—4, собранными на длинных цветоножках в видѣ щитка *C. Steveni* M B. (51).
 Вѣничок воронковидный или трубчато-воронковидный, чашелистики ланцетные или линейно-шиловидные 50.
50. Стебель, благодаря низбегающим листьям, с острыми, чуть крылатыми углами. Цветы в екатой метелкѣ или сближены на

концѣ стебля въ видѣ щитка или султана, чашелистики узко-ланцетные въ $1\frac{1}{2}$ раза длиннѣе трубки чашечки.

C. hemschinica C. Koch (53).

Стебель округлый или съ тупыми углами, чашелистики линейно-шиловидные или ланцетно-шиловидные 51.

51. Корень толстый, мясистый, соцветіе узкая кистевидная метелка. Цвѣты съ очень короткими цвѣтоножками, чашелистики оттопыренные, линейно-шиловидные, иногда у основанія зубчатые.

C. Rapunculus L. (47).

Корень тонкій, мочковатый, соцветіе широкая, раскидистая метелка. Цвѣты на длинныхъ цвѣтоножкахъ, чашелистики ланцетно-шиловидные, не оттопыренные *C. patula* L. (52).

52. Растеніе маленькое 6–10 смт, жестко-волосистое. Листья продолговато-ланцетные, нижніе оттянутые въ короткій черешекъ, стеблевые сидячіе. Доли чашечки ланцетные, длинно-заостренные, въ 2-раза короче маленькаго вѣнчика, придатки чашечки такой-же формы, длиннѣе ея трубки.

C. propinqua Fisch. et Mey. (9).

Примѣч. Изъ 240 видовъ рода *Campanula* на Кавказѣ имѣется 53 вида, т. е. больше 22 %. Изъ этихъ 53 видовъ для Кавказа эндемичны 29, т. е. больше 50 %, а добавляя къ этому числу 11 эндемичныхъ варьететовъ, мы получимъ для Кавказа 40 эндемичныхъ формъ. Большая часть изъ нихъ, именно 28, исключительно сосредоточены въ центральной и западной частяхъ Главнаго хребта, 7 формъ въ восточной части Главнаго хребта и 5 формъ въ юго-западной части Малаго Кавказа. Согласно такому географическому распредѣленію эндемичныхъ формъ приходится принять, что наибольшая часть ихъ возникла и развилась на Главномъ хребтѣ, причѣмъ главнымъ центромъ возникновенія ихъ, очевидно, были центральная и западная части этого хребта. Изъ всего количества формъ, свойственныхъ Главному хребту, наибольшая часть приходится на его западную и центральную части и наименьшая на долю его восточной части. Въ западной части Главнаго хребта количество эндемичныхъ формъ сравнительно невелико, но характерно то, что большая часть ихъ является наиболѣе древняго происхожденія, отличающаяся отъ всѣхъ другихъ формъ, населяющихъ Кавказъ, чрезвычайно обособленными признаками. Изъ формъ, свойственныхъ Малому Кавказу, возможно, что нѣкоторыя найдутся еще въ сосѣднихъ горахъ Малой Азіи. Пунктомъ ихъ возникновенія и расселенія могутъ считаться горы Малаго Кавказа, равно какъ и горы Малой Азіи. Большинство изъ этихъ формъ имѣетъ склонность къ варьированію и потому скорѣе могутъ быть отнесены къ видамъ сравнительно новѣйшей формаціи.

Что касается формъ, свойственныхъ въ настоящее время восточной части Главнаго хребта, то онѣ всѣ повидимому позднѣйшаго происхожденія и нѣкоторыя изъ нихъ представляютъ собою формы, приспособившіяся къ другимъ условіямъ климата и происшедшія отъ близкихъ видовъ, населяющихъ другія части Кавказа.

Приуроченность преобладающаго количества эндемичныхъ формъ во первыхъ къ Западному Закавказью и къ западной части Малаго Кавказа, въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ Понтийскимъ хребтомъ, во вторыхъ къ центральной части Главнаго хребта и юго-западной части Малаго Кавказа и въ третьихъ присутствіе незначительнаго количества эндемичныхъ формъ въ восточной части Главнаго хребта, даютъ, мнѣ кажется, право предположить, что происхожденіе этихъ кавказскихъ эндемичныхъ видовъ было тройкое. Болѣе древніе третичные виды уцѣлѣли или въ Понтийской области или на западной границѣ Малаго Кавказа и Понтийскаго хребта, гдѣ условія климата также, повидимому, способствовали къ ихъ сохраненію и переживанію ледниковой эпохи. Къ числу первыхъ я отношу *C. mirabilis*, *C. Dzaaku*, *C. suanetica*, *C. Antraniana*, къ числу вторыхъ *C. Pontica* и *C. Raddeana*. Такой-же древней формой можетъ считаться *C. Kolenatiana*, сохранившаяся въ восточной части Главнаго хребта, именно въ Кахетіи и Запатаальскомъ округѣ, гдѣ растетъ на скалахъ въ глубокихъ ущельяхъ.

Происхождение эндемичных формъ, сосредоточенныхъ въ центральной части Главнаго хребта и юго-западномъ краѣ Арменіи, можетъ быть съ большею вѣроятностью отнесено къ ледниковой эпохѣ, когда вслѣдствіе обширнаго ледниковаго покрова, многія формы принуждены были развиваться въ уединенныхъ районахъ, гдѣ, сообразно частнымъ особенностямъ климатическимъ и почвеннымъ, произошло и ихъ видовое обособление. Къ такимъ ледниковымъ видамъ относятся напр. *C. hypopolia*, *C. Ledebouriana*, *C. besenginica*, *C. kryophila*, *C. ardonensis*, *C. bellidifolia*, *C. tridentata*, *C. ciliata*, *C. Aucheri*, *C. andia*, *C. circassica* и *C. anomala*. Виды эти вполне сформировавшіеся, промежуточныхъ формъ между ними нѣтъ и большинство ихъ образовалось по содѣйствію другъ съ другомъ. Нѣкоторые изъ нихъ и теперь живутъ около самыхъ ледниковъ и, повидному, находятся еще въ періодѣ расцвѣтенія. Такъ какъ эндемичными оказываются почти исключительно высокогорные, населяющие притомъ обыкновенно скалы, то весьма возможно, что при такомъ своемъ образѣ жизни многія формы *Campanula* пользовались въ ту эпоху болѣе благопріятными для себя въ смыслѣ образованія видовъ условіями существованія, чѣмъ другія формы, требовавшія для своего произрастанія ровныхъ обширныхъ пространствъ. Подобный большой % эндемичныхъ формъ мы можемъ наблюдать и у другихъ высокогорныхъ растений, какъ напр. у видовъ родовъ *Saxifraga*, *Draba*, *Silene* и др., населяющихъ подобныя же мѣста въ альпійскихъ и субальпійскихъ регионахъ.

Помимо этихъ двухъ рассмотренныхъ нами категорій эндемичныхъ формъ, т. е. болѣе древнихъ третичныхъ и такъ называемыхъ ледниковыхъ, существуетъ третья категорія эндемичныхъ формъ, происхождение которыхъ несомнѣнно наиболѣе позднѣйшее. Формы эти, какъ говорилось выше, распространены въ восточной части Главнаго хребта, а отчасти населяютъ южную часть Закавказья. Къ числу первыхъ относятся *C. caucasica*, *C. daghestanica* m., *C. petrophila* var. *angustifolia* m., *C. andia* var. *Alexeenkoi* m., *C. argumensis*, къ числу вторыхъ *C. Bayerniana*, *C. Massalskyi* m., *C. Choizatowskyi* m., *C. Bayerniana* var. *Trautvetteri* m. Большинство ихъ обнаруживаютъ склонность къ большей или меньшей варіаціи и находятся какъ бы на пути къ распаденію на новые виды.

На Кавказѣ мы встрѣчаемъ обѣ секціи рода *Campanula* (*Medium* I и *Rapuncululus* II). Секція *Medium* представлена здѣсь особенно богато и имѣетъ представителей трехъ подсекцій. Первая подсекція *Quinqueloculares*, свойственная восточной части Средиземноморской области, имѣетъ на Кавказѣ два вида — *C. crispa*, эндемичный кавказскій видъ, и *C. lyrata*, распространенный главнымъ образомъ въ восточной части Средиземноморской области. Вторая подсекція *Intermediae* m. заключаетъ только одинъ видъ *C. longestyla* m. и является переходной отъ первой подсекціи *Quinqueloculares* къ третьей подсекціи *Triloculares*, такъ какъ цвѣты этой формы имѣютъ отъ 3—4—5 рылецъ. Форма эта для Кавказа эндемичная, распространена вдоль черноморскаго побережья и произошла, вѣроятно, отъ какой-либо формы изъ подсекціи *Quinqueloculares* гибриднымъ путемъ. Третья подсекція *Triloculares*, имѣющая своихъ представителей въ различныхъ ботанико-географическихъ областяхъ сѣв. полушарія, является на Кавказѣ господствующей, будучи здѣсь представлена цѣлыми группами (*series*). Изъ этихъ группъ *Scapiflorae*, *Rupestres* и *Symphandraeformes* являются самыми интересными, такъ какъ исключительно вмѣщаютъ въ себѣ виды эндемичные для Кавказа. Первая и вторая группы характеризуютъ собою высокогорную альпійскую растительность, третья же заключается въ себѣ виды рѣдкіе, населяющіе ущелья лѣсной области, но иногда заходящіе и въ субальпійскія высоты. Всѣ представители группы *Scapiflorae*, кромѣ *C. Aucheri* и *C. tridentata*, принадлежатъ исключительно Главному хребту, центральная часть котораго можетъ считаться центромъ возникновенія этой группы *Campanula*. Только одна *C. Aucheri*, встрѣчаясь изрѣдка въ центральной части Главнаго хребта, но будучи широко распространенной въ русской Арменіи и отчасти Персіи, происходитъ повидному изъ Малаго Кавказа или же изъ Гилянскихъ альпъ.

N. Kusnezow, N. Busch, A. Fomin.

Flora caucasica critica.

Fasc. 9.

Campanulaceae - A. Fomin.

Vol. 4, pt. 6. Sig. 2-3.

Jurjew.

1904.

Перси. Благодаря средним морфологическим признакам между близкими видами и постоянству их в области своего обширного географического распространения *C. Aucheri* приходится считать за типъ основной, отъ котораго путемъ измѣненій при приспособленіяхъ къ особенностямъ климатическихъ и другихъ условий, произошли съ одной стороны *C. saxifraga*, распространенная въ центральной и сѣверо-западной частяхъ Главнаго хребта, а съ другой стороны *C. arguensis* распространенная преимущественно въ восточной части Главнаго хребта. Къ этому же заключенію, мнѣ кажется, приводитъ и тотъ замѣчательный фактъ, что только въ Аджаро-Имеретинскомъ хребтѣ и центральной части Главнаго хребта мы встрѣчаемся какъ бы съ формами переходными между *C. Aucheri* и *C. saxifraga*, а также и между *C. Aucheri* и *C. arguensis*, между тѣмъ какъ на Маломъ Кавказѣ морфологические признаки *C. Aucheri* не обнаруживаютъ ни малѣйшихъ колебаній.

Къ другимъ выводамъ приводятъ изслѣдованія относительно *C. tridentata*. Послѣдняя, хотя и встрѣчается въ Арменіи и Малой Азій, но происходитъ несомнѣнно съ Главнаго хребта, гдѣ пунктомъ возникновенія ея приходится считать горы Понтійской области, а за основной типъ форму *C. tridentata* var. *barbata* m., которая только исключительно одна и встрѣчается въ горахъ Понтійской области. За это, мнѣ кажется, говорить во первыхъ варьированіе формъ *C. tridentata* въ направленіи къ востоку и югу и явно выраженный на нихъ отпечатокъ климата, а во вторыхъ спорадическое ея распространеніе, какъ въ русской Арменіи, такъ и Малой Азій, гдѣ *Campanula tridentata* представлена только однимъ варьетомъ var. *gracilis* m. съ характерными признаками для сухого климата. Форма эта скорѣе можетъ считаться вымирающей и какъ бы съ трудомъ борющейся съ неблагоприятными условіями сухого климата Арменіи.

Какъ говорилось выше, нѣкоторые виды изъ числа ледниковыхъ находятся еще какъ бы въ періодѣ раззеленія и изъ группы *Scapiflorae* такими могутъ считаться *C. kryophila*, *C. ardonensis*, *C. besenginica*, *C. bellidifolia*, *C. anomala* и *C. circassica* — все они представляютъ собою растенія скалъ и трещинъ и слабое поступательное ихъ движеніе зависитъ также и оттого, что только незначительное количество ихъ сбываетъ попадаетъ при благоприятныхъ условіяхъ въ трещины и прорастаетъ, все же остальные гибнутъ, будучи уносимы вѣтромъ и горными потоками. Болѣе удачными въ своемъ распространеніи оказались изъ этой же группы *C. tridentata*, *C. ciliata* и *C. Aucheri*, селящіеся на такъ называемыхъ „альпійскихъ коврахъ“ и задерненныхъ скалахъ. Первый видъ населяетъ альпійскую область всего Кавказа, второй встрѣчается только на Главномъ хребтѣ и третій населяетъ преимущественно Малый Кавказъ.

Группы *Rupestres* и *Symphuandraeformes* принадлежатъ частью Главному хребту, частью Малому Кавказу. Такъ изъ *Rupestres* *C. petrophila*, *C. hypophila*, *C. andia* свойственны исключительно Главному хребту, тогда какъ *C. Ledebouriana* исключительно Малому Кавказу и именно южной части Арменіи, гдѣ найдена пока на Араратѣ и близлежащихъ отъ него соедѣнныхъ хребтахъ Карсской области. То же можно сказать и о представителяхъ группы *Symphuandraeformes*, изъ которыхъ *C. Autraniana*, *C. swanetica*, *C. Kolenatiana* свойственны исключительно Главному хребту, тогда какъ *G. Raddeana*, *C. Choziatowskyi*, *C. Bayeriana*, *C. Massalskyi* свойственны исключительно Малому Кавказу.

Группы *Cordifoliae* m. и *Involucratae* (m.) населяютъ частью Главный хребетъ, частью Малый Кавказъ. Изъ первой группы свойственной Главному хребту исключительно является *C. sarmatica*, а для Малаго Кавказа и вообще Закавказья типична *C. alliariaefolia*, мигрировавшая на Кавказъ повидимому изъ Малой Азій.

Что касается двухъ остальныхъ видовъ изъ этой же группы, то *C. calcarata* извѣстна только изъ западной части Главнаго хребта, а *C. collina* является самой распространенной по всему Кавказу. Изъ второй группы *C. macrochlamys* свойственна Малой Азій, откуда очевидно перешла и на Кавказъ, гдѣ встрѣчается только въ западной части Ма-

лаго Кавказа, въ пограничной полосѣ съ турецкой Арменіей. Болѣе распространенной изъ этой группы является *C. glomerata*, мигрировавшая на Кавказъ, очевидно съ сѣвера и развившая здѣсь въ нѣкоторыхъ областяхъ особые варьеты. Группа *Heterophylla* (Nymann) заключаетъ только одинъ видъ *C. rotundifolia*, которая является типомъ палеарктическимъ и на Кавказѣ встрѣчена всего только въ двухъ мѣстахъ (Центральн. Кавказъ и Каресская область). Такъ какъ мѣстонахожденія ея оказываются пріуроченными къ дорогамъ (Военно-Грузинская), то весьма возможно, что она занесена была сюда случайно, тѣмъ болѣе, что позднѣйшіе ботаники ее не находили.

Весьма оригинальной оказывается на Кавказѣ группа *Spinulosae* m., заключающая всего только одинъ видъ *C. mirabilis*, весьма характерный по своимъ маленькимъ колючкамъ, окаймляющимъ кожистые листья и чашечку. Эта форма пережила, очевидно, ледниковую эпоху и является, какъ нѣкоторые другіе виды изъ прочихъ группъ, остаткомъ вымершей третичной флоры.

Группы *Trachelioideae* (Boiss.) и *Spicatae* (Boiss.) носятъ смѣшанный европейско-азиатскій характеръ. Въ первой группѣ мы находимъ только одинъ видъ эпидемичный для Талыша и Гиліана — *C. odontosepala*, остальные виды пользуются широкимъ географическимъ распространениемъ въ Европѣ и частью въ сѣв. Азіи; двѣ формы изъ нихъ, какъ напр. *C. rapunculoides* и *C. bononiensis*, представляютъ собою почти рудеральныя растенія, другія какъ *C. latifolia* и *C. Trachelium* свойственны исключительно лѣсной области и появились на Кавказѣ съ юга Россіи. Вторая группа *Spicatae* имѣетъ на Кавказѣ только два вида, изъ которыхъ *C. stricta* населяетъ Малую Азію, откуда появилась на Кавказъ, другой видъ *C. thyrsoides* свойственна Альпамъ Европы. Этотъ послѣдній фактъ особенно интересенъ въ томъ отношеніи, что Кавказъ обладаетъ, повидимому, единственнымъ видомъ изъ р. *Campanula*, которая является общимъ съ Альпами Европы и встрѣчается на Балканскомъ полуостровѣ, представляя собою примѣръ разъединеннаго мѣстообитанія.

Наконецъ, весьма интересную группу представляютъ *Sibiricae* m. — типъ сѣверно-азиатскій и появившійся на Кавказъ съ сѣвера, гдѣ образовалъ рядъ формъ хотя и близкихъ, но достаточно характерныхъ и постоянныхъ въ своихъ признакахъ. Всѣ эти формы могутъ быть выдѣлены въ особые 4 вида и 2 разновидности. Типъ степного, почти сорного растенія, попадая въ различныя условія обитанія, естественно развиваетъ нѣкоторыя индивидуальныя варьяціи, выражающіяся въ величинѣ цвѣтovy и другихъ признакахъ, о которыхъ будетъ сказано при спеціальномъ описаніи, но тѣмъ не менѣе цѣлый рядъ морфологическихъ признаковъ у этихъ 4 формъ остается всегда и при всѣхъ условіяхъ обитанія постояннымъ, что при наличности особыхъ географическихъ районовъ, населенныхъ этими формами, даетъ возможность выдѣлить ихъ въ особые виды. Къ этой группѣ я причисляю: *C. sibirica*, *C. daghestanica* m., *C. caucasica* и *C. ineretina*. Первый видъ въ типичной формѣ встрѣчается рѣдко и только на сѣверномъ Кавказѣ. По всему Кавказу его замѣняетъ другая форма *C. sibirica* var. *Hohenackeri* m., которая распространена отъ низменности до субальпійскихъ высотъ. Второй видъ встрѣчается въ центральной части Дагестана, гдѣ произрастаетъ отъ 1200'—6000' надъ ур. моря. Третій видъ распространенъ въ восточной части Главнаго хребта, встрѣчаясь тамъ отъ 2000'—7000' надъ ур. моря. Четвертый видъ, *C. ineretina* встрѣчается только въ сѣверо-восточномъ углу Западнаго Закавказья, въ Кутанской губерніи. Близкая къ этой же группѣ *C. propinqua* представляетъ типичное персидское растеніе каменистыхъ пустынь, весьма характерное для солонцевато-каменистыхъ пустынь русской Арменіи.

Вторая секція *Rapunculus* Boiss. имѣетъ на Кавказѣ 8 представителей, изъ которыхъ *C. fastigiata* типъ средиземноморскій, встрѣчающийся въ Испаніи, Сѣв. Африкѣ и Малой Азіи, откуда мигрировалъ и на Кавказъ. *C. patula*, судя по показанію Гюльденштедта, встрѣ-

чается только на сѣв. Кавказѣ; въ Закавказьѣ встрѣчается видъ близкій къ ней *C. hemschinica*, который произрастаетъ отъ 4500'—6000' надъ ур. моря. *C. persicifolia* и *C. raphunculus*, встрѣчаясь на югѣ Россіи и Малой Азіи, проникли на Кавказъ съ сѣвера и юго-запада. *C. pontica* представляетъ собою эндемичное растеніе для Кавказа; *C. lactiflora* повидимому также чисто кавказскаго происхожденія, откуда распространилась на юго-западъ въ Малую Азію, а съ другой на востокъ въ Гиланскую провинцію Персіи. Что касается происхожденія *C. Steveni*, то она представляетъ собою типъ азіатскій, мигрировавшій на Кавказъ повидимому въ ледниковую эпоху.

Sect. I. Medium Alph. D C.

Capsula valvis vel poris basiliaribus debiscens.

A. D. C. Monogr. Camp. p. 214. — Boiss. Fl. Or. III. p. 893. — E.-Pr. IV. 5. p. 50. — Syn. Medium Tourn. sec. Boiss. l. cit.

Subsect. I. Quinqueloculares Boiss.

Stigmata quinque, capsula quinquelocularis. Calycis sinus in omnibus appendiculati.—Species ut videtur omnes submonocarpicae sed nulla annua. Boiss. III. p. 893. — E.-Pr. IV. 5. p. 50.

1. *C. crispa* Lam. glabra vel glabriuscula e collo crasso caulibus elongatis erectis, ramosis, foliis inferioribus longe petiolatis laevibus subcordatis obtusis, caulinis ovatis acutiusculis basi subcordatis petiolis lamina subbrevioribus, superioribus subsessilibus omnibus margine serrato-incisis crispis petiolis lobulis vel dentibus instructis, floribus axillaribus solitariis brevissime pedicellatis, calycis plus minus scabri laciniis triangularibus acutis remote denticulatis margine saepe revolutis, appendicibus minimis dentiformibus tubo calycino triplo brevioribus, corolla pubescente late-campanulata pallide coerulea ad medium fissa lobis ovatis apice mucronulatis, capsula globosa. ☉. v. v. et s. in h. P. Tm. Th.

Lam. Dict. I, p. 581. — D C. Monogr. Camp. p. 216. — D C. Prodr. VII, p. 458. — Boiss. III. p. 895. — Trautv. in A. H. P. IV. 1. p. 164; VI. p. 56. — Липск. Фл. К. 377. — Radde, Mus. Cauc. II. p. 121.

Syn. *C. Orientalis foliorum crenis amplioribus et crispis flore patulo subcoeruleo* Tourn. Voy. 2. p. 378, cum iconc. — *Quinquelocularia crispa* C. Koch, in Linnaea. XXII. p. 631.

Hab. in fissuris rupium Somehetiae et in confinio Armeniae rossicae. 3000'—6000'. — **S. S.-K.** Въ трещинахъ скалъ близъ Боржома. Смирновъ! Тамъ-же. Акнифиевъ! — **X. A.** Подножіе Алагеза. 23. VII. Хоцятовскій! Тамъ-же. Манташъ-дара. 23. VII. Хоцятов.! Ольтинск. окр., Кареск. обл. на полдорогѣ между с.с. Косоръ и Агундиръ. 17. VII. 03. Кёнигъ! Въ 6 верстахъ отъ сел. Хосъ-кей. 20. VII. 03. Кёнигъ! Саракамышъ у Саганлуга. 4. VIII. 86. Массальскій! Окрестн. гор. Карса. Турнефоръ. Въ Ардаганскомъ окр. К. Кохъ.

Ar. Geogr. Asia minor in Armenia turcica!

Примѣч. Видъ этотъ встрѣчается, повидимому, на Кавказѣ въ юго-западной части Арменіи, селясь преимущественно на вулканическихъ породахъ.

2. *C. lyrata* Lam. breviter hirsuta scabra, caulibus erectis elongatis virgatis rigidis longe et laxe racemoso-spicatis simplicibus rarius ramosis,

foliis crenato-dentatis inferioribus ovato-oblongis obtusis petiolo lobulis lateralibus obsito suffultis, superioribus sessilibus oblongo-lanceolatis acutis, floribus subsessilibus solitariis, calycis strigosi lobis lanceolatis acutiusculis tubo duplo longioribus, appendicibus tubo sublongioribus tandem accretis, corolla coerulea setulosa tubulosa in limbum erectum sensim ampliata calyce subduplo longiore lobis acutiusculis, capsula ovata. ☺. E Caucaso non v.

Lam. Dict. I, p. 588. — D C. Monogr. Camp. p. 219. — D C. Prodr. VII. p. 458. — Boiss. III. p. 899. — Trautv. in A. H. P. VI. p. 57.

— Липск. Фл. К. 377.

Syn. *C. foliis profunde incisis fructu duro* Tourn. cor. 3 (excl. syn.), sec. A. D. C. Monogr. I. cit. — *C. stricta* Sm. Prodr. I. p. 140, sec. Boiss. I. cit. — Ledeb. II. p. 877. (sub *C. stricta* L.) non Labill. sec. Trautv. I. cit.

Exsicc. Sintenis. Iter orientale. 1892. № 4192!

Hab. in Armenia. — X. A. Русская Армения у турецкой границы.

Нордманъ.

Ar. Geogr. Asia minor.!

Примѣч. Траутфеттеръ на стр. 57. Acta H. Petrop. VI. вып. указываетъ на экземпляръ Нордмана близъ Ризе въ гербаріѣ Леденбура, между тѣмъ въ присланныхъ мнѣ двухъ пачкахъ этого гербарія *C. lyrata* Lam. не имѣется.

Subsect. II. Intermediae m.

Stigmata 3—5, capsula tri-quinquelocularis. Calycis sinubus appendiculatis. — Species una perennis.

*3. *C. longestyla* m. parce hirta omnis cum foliis saepe nitens, caulibus elongatis erectis et ascendentibus pyramidato-ramosis, foliis inferioribus ovato-lanceolatis in petiolum longum alatum lobatum attenuatis, caulinis oblongis sessilibus, superioribus oblongo-lanceolatis, floribus *violaceis magnis mutantibus*, pedunculis flore duplo vel triplo brevioribus, calycis *patentis* laciniis lanceolatis acutis corolla viva late *urceolato-campanulata* (basi inflata supra medium plus minus contracta) extus *glabra* ore plus minus *barbata* 4—5-plo brevioribus, appendicibus *valde reflexis ad pedunculum floris conniventibus* ovato-triangularibus obtusis margine revolutis et cum laciniis calycinis ciliatis, *stylo valde exserto*, stigmatibus 3 inter-dum 4—5, filamentorum dilatatione chartacea, receptaculo glaberrimo. 2. v. v. et s. in h. P. Tm. Th. J.

Ромин. Труды Тифлискаго Ботан. Сада, вып. VI. кн. 3. стр. 37. — Грипневек. Результаты двухъ ботан. пут. на Кавказѣ въ 1900 и 1901 г.г. стр. 125.

Syn. *C. sibirica* var. *major* partim, in herbariis. — *C. sibirica* β. *major* Albow, in Prodr. Fl. Colchicae, p. 154, partim.

Hab. in saxosis calcareis ad Pontum Transcaucasiae occident. et in rupibus regionis subalpinae Chewsuriæ et Tuschetiæ ubique in Pschawia. 2000'—6000'. — S. P. Переходъ между Ново-Михайловскимъ и Ольгинскимъ. Байернъ! Близъ Туансе. Байернъ! (f. foliis margine crispis). Цербельда у подножія горы Апіанги, равнина. 2000'. 24. VIII. 68. Шперкъ и Рейнгардтъ! Сухумъ, обрывы Маджарскаго ущелья. 28. IV. 88. Татарновъ! Головинское. 19. VI. 93. Радде и Кёнигъ! Тамъ-же по р. Шахе выше Сочи. 19. VI. 93. Радде и Кёнигъ! Гудаутъ. 1. VI. 93. Радде и Кёнигъ! Новый Афонъ. 30. V. 93. Радде и Кёнигъ! Тамъ-же. 15. V. 92.

Липск.! Скалы у Нового Аёона. 14. IX. 99. Вороновъ! Сухумъ. VI. Альбовъ! Между Сухумомъ и Новымъ Аёономъ. 28. VI. 95. Бушъ! Между Сухумомъ и Ажары 30. VI. и 3. VII. 95. Бушъ! Цебельда по холмамъ близъ сел. Юрьевского. 17. VII. 01. Вороновъ! Тамъ-же, по склонамъ. 24. VI. 01. Вороновъ! Военно-Сухумская дор. близъ Ольгинскаго. VI. 96. Десулави! Абхазія. Псыртха. VI. 93. Альбовъ! Черкесія, Кучукъ-дере. 3 — 7. VIII. 00. Гриневецкій! Тамъ-же, по сухимъ склонамъ у опушки лѣса. 10. VI. 01. Гринев.! Кавказъ. Абихъ! Ланташи, Кутаисской губ. 3000'. 23. VI. 90. Акниф.! — **S. lb.** Пшавія, ущелье Пшавской Арагвы между Тваливи и Магаро. 26. VI. 03. Бушъ! Между стан. Сабадурн и Сакарауло. 24. VI. 03. Бушъ! (*f. parviflora* сухихъ мѣстъ). Между Кварой и Артанамн по р. Юрѣ. 25. VII. 03. Бушъ! (*f. parviflora putata*). Хевсурія, между сс. Магаро и Барнеахо, скалы. 27. VI. 03. Бушъ! (*f. parviflora* сухихъ мѣстъ). Луга между сс. Бацалиго и Хахматы. 6. VII. 03. Бушъ! Субальп. луга между уроч. Миргва и с. Бацалиго. 6. VII. 03. Бушъ! (*f. parviflora*). Переваль близъ Кабуло, субальп. лугъ. 30. VI. 03. Бушъ! Между с. Борнеахо и уроч. Ори-цхали. 28. VI. 03. Бушъ! (*f. parviflora*). Тушетія, Джвари-Возели, субальп. поясъ. 13. VII. 76. Радде! Между с. Диклю и г. Диклосъ-мта, субальп. поясъ. 20. VII. 03. Бушъ! (specim. incompl. sine foliis infer.). Между сс. Бечела и Омало. 22. VII. 03. Бушъ! Субальп. луга между Дартло и Чигго. 19. VII. 03. Бушъ! (spec. incompl. sine foliis infer.).

Примѣч. Весьма красное растеніе, по формѣ своихъ обыкновенно крупныхъ кувшинчато-колокольчатыхъ цвѣтовъ напоминаетъ цвѣты *C. Medium* L. Столбикъ во время цвѣтенія сильно выставляется наружу, рыльцевъ обыкновенно 3, но часто случается, что ихъ бываетъ 4 или 5. Такъ напр. на нѣкоторыхъ экземплярахъ Альбова изъ Псырти въ гербаріѣ Тифлисск. Ботан. Сада нѣкоторые цвѣты имѣютъ 4 рыльца, также и у экземпл. Н. А. Буша изъ Ажары и у экземпляровъ Б. Б. Гриневецкаго изъ Кучукъ-дере. На экземплярахъ, растущихъ въ кавказскомъ отдѣлѣ Тифл. Ботан. Сада и выведенныхъ изъ сѣмянъ Б. Б. Гриневецкаго изъ Кучукъ-дере на нѣкоторыхъ цвѣтахъ имѣется по 4 и по 5 рылецъ. Чашелистики на границѣ перехода въ придатки часто снабжены по сторонамъ маленькими листовыми железками. Придатки чашечки овально-треугольные, у живыхъ цвѣтовъ сильно пригнуты къ цвѣтоножкѣ и между собою плотно смыкаются. Цвѣты всегда поникающіе. Въ гербаріяхъ это растеніе смѣшивалось отчасти съ *C. sibirica* L. var. *major* Boiss., отъ которой хорошо отличается формой большого бородачатого вѣнчика, выступающимъ столбикомъ и наконецъ многолѣтнимъ корнемъ. Такъ какъ эта форма встрѣчалась въ гербаріяхъ только изъ Понтійской обл. съ Черноморскаго побережья, то я былъ склоненъ считать и экземпл. Г. II. Радде изъ Тушетіи (Джвари-Возели) тоже по происхожденію изъ Понтійской обл. и предполагалъ, что здѣсь произошла путаница въ этикеткахъ. Новая находка этого вида Н. А. Бушемъ въ Тушетіи вполне однако оправдала показаніе Г. II. Радде.

Subsect. III. Triloculares Boiss.

Stigmata tria, capsula trilocularis. — Species perennes, monocarpicae vel annuae.

Boiss. III. p. 893. — E.-Pr. IV. 5. p. 50.

Series I. Spinulosae m.

Folia, laciniae et appendices calycis margine pellucido-spinulosae.

*4. *C. mirabilis* Alb. glabra, *radice brevi crassa dauciformi* caule a collo pyramidatim ramosissimo, foliis radicalibus oblongo-spathulatis in petiolum alatum attenuatis, caulinis sessilibus ovato-oblongis *basi cordatis*, superioribus *cordatis*, omnibus *crassis coriaceis* margine dentato-crenatis et *crebre pellucido-spinulosis*, floribus magnis pedicellatis, pedicellis bracteolatis, calycis turbinati glabri laciniis late-lanceolatis obtusiusculis corolla *late campanulata* pallide lilacina ad tertiam partem fissam glabra *ore barbata* 3-plo brevioribus, appendicibus triangulari-lanceolatis acutis tubum calycinum aequantibus *omnibus cum laciniis calycinis margine pellucido-spinulosis*, stylo incluso, filamentorum dilatatione margine papilloso-puberula, receptaculo glabro, capsula late ovata, seminibus oblongo-ellipticis anguste alatis. *℥. v. s. in h. Tm. Th.*

Alb. in Bull. de l'Herb. Boiss. t. III. (1895), p. 228—230; — in Prodr. Flor. Colch. p. 158. — Липск. Фл. К. стр. 377.

Icon. Alb. Prodr. Fl. Colch. tab. I!

Hab. in Abchasia. — **A. W.** На известковых скалахъ хребта Арбика-Акхегежъ, 6300', въ мѣстности Ачепндыжъ, противъ горы Хагъ. 2. IX. 94. АЛЪБОВЪ!

Series II. Sibiricae m.

Folia inferiora spathulata, laciniae et appendices calycis margine rigide ciliatae, capsula nutans.

5. *C. sibirica* L. biennis breviter scabrida, caulibus *erectis* foliosis *anguste paniculatis* multifloris, foliis inferioribus *spathulatis*, caulinis *lanceolatis* vel *linearilanceolatis*, superioribus angustis acutis basi subsemiauriculatis, floribus mediocribus breviter pedunculatis *erecto-patulis*, calycis laciniis lanceolatis vel anguste-lanceolatis, appendicibus oblongis acutis vel obtusis tubo aequilongis vel brevioribus omnibus cum laciniis calycinis margine *rigide ciliatis*, corolla coerulea glabra vel ad nervos pilosa *tubulosa* vel *anguste infundibuliformi* calyce 2—3-plo longiore. *⊕. v. v. et s. in b. A. P. J. Tm.*

L. Sp. 236. — A. D. C. Monogr. Camp. p. 244. — Pall. It. I, p. 184; II, p. 458, 560; III, p. 314. — Georgi. It. I, p. 201; Besch. d. Russ. R. III, 4. p. 776. — M. B. Fl. taur-cauc. I, p. 155; III, p. 148. — C. A. Meyer. Verzeichn. der Pflanz. des Cauc. p. 84. — Eichw. Skizze p. 144; casp. cauc. p. 26. (sec. Ledeb.). — C. Koch. Linnaea XVII, p. 279. (partim). — Ledeb. II, p. 879. — Rupr. Bull. de l'Acad. de sc. d. St. Petersb. XI, p. 217. (partim). — Boiss. III, p. 901. — Normann. Flor. Stavrop. p. 26. — Herd. A. H. P. I, 2, p. 289. (partim). — Trautv. A. H. P. VI, p. 61. (partim). — Ризенкам. Пятигор. фл. стр. 287. — Шмальгауз. II, стр. 178. — Липск. Фл. К. стр. 377. — Талиевъ Фл. Крыма, стр. 213, 223, 228, 252. — Somm. Lev. A. H. P. XVI, p. 314. (partim).

Syn. *C. racemosa* S. G. Gmel. Reise I, p. 9, 153. tab. 34. (sec. Ledeb. loc. cit.). — *C. capsulis trilocularibus tectis* Gmel. III, p. 154. tab. 29. — *C. Gundelii* C. Koch. Linn. XXIII, p. 634. quoad flores (sec. Boiss. l. cit.). — *C. undulata* Mönch. (sec. A. D. C. l. cit.). — *C. medium* Pall. Phys. topogr. Gemälde v. Taur. p. 99. (sec. Stev. Bull. Mosc. 1856. IV, p. 416.).

Icon. Jacq. Fl. Austr. tab. 200. — Rehb. tab. 232. — Desf. Cor. tab. 29.

Hab. in pratis regionis silvaticae Caucasi septentrionalis. — **St. A.** Близъ Ставрополя. Беккеръ! Ставрополь. Норманъ! Тамъ-же. 6.VI.62.

Оверинъ! Тихорѣцкая. 21. V. 92. Липск.! Тамъ-же, на поляхъ. 16. VII. 00. Алексѣенко! — **S. T.-N.** Крымъ. 29. VI. 37. Траутфеттеръ! Симферополь, Дубки. 18. VI. 96. Андреевъ! Близъ Дубковъ на склонахъ. Талиевъ. Крымъ между г. Тете-оба и г. Биюкъ-янышаръ. Талиевъ. Окрестности Симферополя. Талиевъ. Окрестн. Севастополя. Талиевъ. Балаклава, Георгіевскій монаст. VII. 96. С. Ѳедосѣевъ! Крымъ. М. Биб.! Левейе! — **S. K.** Кубанск. обл. между Учкуланомъ и Индышъ. 14. IX. (cum fruct). Соммье и Левье. Куб. обл., балка одного изъ крайнихъ западныхъ истоковъ Малой Лабы, осыпи. 22. VI. 99. Бушъ! Кубан. обл., ущелье р. Уллу-Хурзука, горностеп. участки. 26. VIII. 99. Бушъ! (f. putata). Кубан. обл., поляна Кунъ, близъ казеннаго дома для лѣсн. стражи. 15. VI. 99. Бушъ! Кубан. обл. между Севастопольской и Абадзехской, опушки дубов. лѣсовъ. 20. V. 99. Бушъ! Кубанск. обл. между Усть-Джегутинской и Хумарой. 21. VI. 96. Бушъ! Кубан. обл. около Георгіевск. монаст. близъ Хумары, дубов. поясъ. 22. VI. 97. Бушъ! Невинномысская. 1867. Беккеръ! — **S. T.** Пятигорскъ. Гѣффтъ! Бештау. Беккеръ! Тамъ-же. 1. VII. 43. Коленати! Ессентуки. 20. VI. 98. Левитскій! Кисловодскъ. 27. VI. 96. Литвиновъ! Выше Владикавказа въ имѣніи П. Н. Зейдлицъ! VII. 01. Н. Зейдлицъ! Южный склонъ Машука. 22. VI. 66. Байернъ! Бештау близъ Пятигорска. 1. VII. 43. Коленати! (с. fruct.). Бештау. Петерсонъ! Дача Попова близъ Владикавказа. 15. VI. 94. Б. Федченко! Между ст. Балта и Ларсъ. 25. VI. 94. Б. Федченко! Терск. обл. Грозный. 5. V. 90. Липск.! Хасавъ-юртъ. 10. V. 90. Липск.! Кисловодскъ близъ Нарзана. Гѣффтъ! Между Владикавказомъ и Ларсомъ. 4. VI. Бушъ! Терск. обл. Хасавъ-юртъ. 16. V. 91. Липск.! Чечня, Чермой-ламъ. VI. 92. Медвѣ-девъ! Чечня, близъ Буртуная. 9. VI. 94. Радде и Кёнигъ! — **A. M.** Терск. обл. ур. Баксанъ близъ Терскола. 7000'. 17. VII. 96. Алекс.! — **X. D.** Дагестанъ. Арахюль. 9. VII. 85. Радде! Южн. Дагестанъ на горѣ Калагъ. 4058'. VII. 60. Ходзько! Дагестанъ. Кризъ. 1873. Беккеръ! Близъ Куруша и Ахты. 1874. Беккеръ! — **S. D.-K.** Дагестанъ. Темиръ-Ханъ-Шура. 21. V. 90. Липск.! — Кавказъ. Симашко! Кавказъ. Вильгельмъ! Кавказъ. Ганзенъ!

Ar. Geogr. Songoria, Sibiria Altaica, Rossia media et australis, Dalmatia, regio Danubialis, Germania austro-orientalis, Pedemontium et Italia.

f. elatior m. caulibus elatioribus, floribus majusculis anguste paniculatis. ☉. v. s. in h. A. P. J. S. K. Tm.

Hab. in pratis humidis et silvaticis Caucasi septentr. — **St. A.** Кубанск. обл. Кавказская. 6. V. 89. и 22. V. 92. Липск.! Армавиръ. 12. V. 89. Липск.! Ставропольск. губ., Рыбное озеро. 24. V. 92. Липск.! — **S. T.-N.** Крымъ, выше Пендикъ на опушкѣ горнаго лѣса. 14. VI. 96. Гольде! Крымъ. VI. 1837. Траутфеттеръ! — **S. K.** Кубанск. обл. Крымская. 8. VI. 91. Липск.! Баталпашинскъ. 1. VII. 90. Липск.! Ур. Кефаръ. Абадзехъ. 2. VI. 43. Коленати! Кубанск. обл., по опушкамъ кустарныхъ зарослей между Старокореунской и Рязанской. 12. V. 99. Бушъ! Между Прусской и Ширванской, поляны и опушки дубовыхъ лѣсовъ. 21. V. 99. Бушъ! Между Имеретинской и Гурійской, поясъ дубовыхъ лѣсовъ. 27. V. 99. Бушъ! Между Рязанской и Черниговской, по опушкамъ дубоваго

лѣса и лѣснымъ полянамъ. 12. V. 99. Бушъ! Между Дагестанской и Прусской, поясъ дубовыхъ лѣсовъ. 21. V. 99. Бушъ! Около Невинномысской. 15. VI. 96. Бушъ! Между Баталпашинымъ и Усть-Джегутинской. 20. VI. 96. Бушъ! Майкопъ. 4. VI. 91. Липск.! Баталпашиискъ. 1. VII. 90. Липск.! — **S. T.** Бештау. Гогенаккеръ! Чиръ-юртъ. 30. V. 94. Радде и Кёнигъ! Терск. обл. Минеральные Воды. 7. VI. 92. Липск.! Чиръ-юртъ. 12. V. 91. Липск.! Терск. обл. Грозный. 20. V. 91. Липск.! Кубанск. обл. Невинномысская. 13. VI. 90. Липск.! Пятигорскъ. 27. V. 91. Липск.! Терск. обл. Желѣзноводскъ. 22. V. 89. Липск.! Кубан. обл. Невинномысская. 14. V. 89. Липск.! Чечня, Евдокимовское, формация колюч. кустарниковъ. 11. VI. 89. Кзнец.! Пятигорскъ, у подножия Машука VI. 98. Шумовъ! (*f. umbrosa caule glabro*). Георгіевскъ. Мейеръ! Бештау. Гогенаккеръ! Тамъ-же. 19. VII. 67. Оверинъ! (*c. fruct.*) г. Развилки. 14. VII. 67. 3040'. Оверинъ! Ессентуки. 3. VII. 67. Оверинъ! Осетія, Цроу. 2. VII. 00. Марковичъ! (*f. umbrosa, caulibus glabris*). Тамъ-же. 2. VII. 95. и 31. VI. 97. Марковичъ! Чечня, горные луга Бузувикурта. 10. VI. 97. Марковичъ! Владикавказъ. VII. 01. Н. Зейдлицъ! Тамъ-же, на берегу Терека. VI. 01. Н. Зейдлицъ! Между Владикавказомъ и Ларсомъ. 9. IX. 43. Коленати! Ессентуки. 9. VII. 94. Б. Федченко! — **A. M.** Терск. обл. между Урусбиево и Терсколь. 6000'. 24. VII. 96. Алекс.! — **S. D.-K.** Дагестанъ, Даргинск. окр. близъ сел. Леваша. 3700'. 2. VII. 98. Алекс.! Даргинск. окр. въ соснов. лѣсу Гумрадузъ, между Акуша и Муги (Мега). 4800'. 14. VII. 98. Алекс.! Даргинск. окр. близъ сел. Дижбукъ. 4760'. 12. VII. 98. Алекс.! Даргинск. окр. на вершинѣ хребта у дороги между Мейшиша и Дижбукъ. 5360'. 11. VII. 98. Алексѣенко! — **S. Ib.** Карталинія? Лаговскій!

Ar. Geogr. Rossia europ. austro-occid.!

Примъч. *C. sibirica* L. типичная встрѣчается только на сѣверн. Кавказѣ, гдѣ, какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстностяхъ Россіи, напр. въ западныхъ и юго-западныхъ губерніяхъ, она часто развивается роскошнѣе и представляетъ собою *f. elatior* m., т. е. получаетъ болѣе высокій ростъ, болѣе крупныя цвѣты, сохраняя однако всѣ другіе типичныя признаки какъ-то — ланцетные или линейно-ланцетные стеблевые листья и узкую густую метелку цвѣтовъ. Таковы напр. экземпляры Пурига изъ Кълеицкой губ., фонъ-Граффа изъ Екатеринославской губ. и С. Федосѣева изъ Ровно Волынской губ.; таковы же большая часть экземпляровъ изъ Терской и Кубанской областей Кавказа. Самые типичныя экземпляры *C. sibirica* L. я наблюдалъ изъ нашихъ сѣверо-восточныхъ и среднихъ губерній и здѣсь они уже ничѣмъ не отличаются отъ экземпляровъ сибирскихъ. Очевидно во всемъ этомъ сказывается вліяніе климата, которое отразилось и на опушеніи стеблей и листьевъ. Моя *f. elatior* имѣетъ болѣе слабое опушеніе сравнительно съ формой изъ восточныхъ нашихъ губерній Пензенской, Самарской или формой типичной изъ Дагестана. Единственные постоянные признаки — это ланцетные или линейно-ланцетные стеблевые листья и узкая метелка трубковидныхъ цвѣтовъ. Что касается чашечки, то здѣсь особенно сильно варьируютъ придатки ея, которые бываютъ то ланцетными острыми, то наоборотъ тупыми; длина ихъ обыкновенно равняется трубкѣ чашечки, но случается также, что придатки достигаютъ только половины ея длины.

var. divergens Trautv. ramis floriferis divergentibus, foliis caulibus latioribus oblongo-lanceolatis, superioribus late lanceolatis amplexicaulibus, floribus sat magnis tubuloso-campanulatis patentibus. ☉. v. s. in h. A. P. J.

Trautv. in A. H. P. VI. отд. ott. 21; IV, 1. p. 164.

Syn. *C. divergens* Willd. Enum. I, p. 212. — A. D. C. Monogr. Camp. p. 243. — Röm. et Schult. Syst. veg. V. p. 245. — *C. spathulata* W. K. Plant. rar. Hung. III. p. 286. tab. 258. — Neillr. Diagn. der Pflanz. Ung. u. Slavon. p. 82. — *C. nutans* Vahl. ined. Horn. hort. hafn. p. 201 (sec. A. D. C. l. cit. p. 213.). — *C. cernua* Hort. (sec. A. D. C. l. cit. p. 243.). — *C. sibirica* var. *luxurians* Lindem. Prodr. fl. Cherson. p. 134. (sec. Trautv. l. cit. p. 22. отд. ott.). — *C. sibirica* L. β. *major* Boiss. III. p. 901. (partim.). — *C. sibirica* Альбовъ in Prodr. Fl. Colch. p. 154. — *C. sibirica* var. *major* Somm. et Lev. in A. H. P. XVI. p. 314. (partim.). — *C. sibirica* var. *taurica* Trautv. A. H. P. IV. p. 164.

Exsicc. № 1233. Dr. Wierzbicki. Bannat, an Felsen bei Orawicza und Csiklowa! v. s. in herb. J. sub *C. divergens* Willd.

Hab. in regione silvatica Tauriae et Caucasi magni. — **St. A.** Ставропольск. губ. сел. Султановское. VI. 89. Акинф.! — **S. K.** Кубанск. обл., между Сентами и Тебердинскимъ ауломъ, поясъ дубово-березовыхъ лѣсовъ. 24. VI. 96. Бушъ! Лугъ въ сосновомъ лѣсу около Тебердинскаго аула, подъемъ на хребетъ Брушъ. 26. VI. 96. Бушъ! Между Хампетинской и Царской, дубовые кусты. 20. V. 99. Бушъ! Между Пятигорской и ст. Ключевой, дубовый поясъ. 26. V. 99. Бушъ! Черноморск. губ. между станціями Ткаченовской и Туапсе, поясъ дубовыхъ лѣсовъ. 23. V. 99. Бушъ! Между Дефановской и Шапсугскимъ переваломъ, дубовые лѣса. 26. V. 99. Бушъ! Кубанск. обл., между Садыжнинской и ст. Навагинской, дубовые лѣса. 22. V. 99. Бушъ! Между Навагинской и поселк. Елисаветпольскимъ, дубовые лѣса. 22. V. 99. Бушъ! Между Ставропольской и Шабановской, въ дубовыхъ лѣсахъ, по горамъ. 1888. Кзнец.! Шабановская, переваль. 1888. Кзнец.! Горячій Ключъ. 22. V. 88. Кзнец.! — **S. T.** Кисловодскъ. 7. VI. 94. Б. Федченко! Тамъ-же. 1898. Акинф.! Бештау. Гогенакеръ! Прочно-Акопская. Байернъ! Ардонъ. 4000'. 11. VII. 91. Акинф.! Чечня, между Шатоемъ и Аргунскимъ укрѣпленіемъ. 9. VI. 89. Кзнец.! Терек. обл. близъ Алагира по скаламъ. 23. VI. 00. Левитскій! Бештау, на высотѣ 2500'. 23. V. 87. Акинф.! Предгорья Сѣверн. Кавказа. 1861. Рупрехтъ! — **X. D.** Дагестанъ, близъ с. Ахты. 1874. Беккеръ! — **S. T.-N.** Крымъ, Чуфутъ-кале. Чугаевичъ! Севастополь, бульваръ. Чугаевичъ! Крымъ, между с. Судакъ и колон. Цурхталъ. 26. VI. 37. Траутфет.! Между Новороссійскомъ и Геленджикомъ. Медвѣдевъ! Новороссійскъ 25. VI. 93. Радде и Кёнигъ! (sub *C. sibirica* L. Alb. Prodr. Fl. Colch.). Крымъ, спускъ съ Яйлы къ р. Авинда. 12. VII. 96. С. Федосѣевъ! Крымъ, по дорогѣ къ водопаду Учанъ-су. 6. VI. Кондратьевъ! — **A. W.** Кубанск. обл., поляны въ хвойномъ лѣсу по р. Уруштуну. 24. VI. 99. Бушъ! Между г. Джугозоякъ и переваломъ въ верховья Кыши (Чегса), субальпійск. зона. 7. VIII. 99. Бушъ! Черноморск. губ., между переваломъ Гойтхъ и ст. Ткаченовской, дубовые лѣса и поляны. 23. V. 99. Бушъ! — **A. O.** Хевсурія, Чимгинское ущелье, субальп. поясъ во ржи и по тропѣ. 5. VII. 03. Бушъ! — **S. P.** Между с. Лентехи и Чолуръ, скалы. 30. VII. fr. Соммье и Левье.

Ar. Geogr. Transylvania, Hungaria, Bannat.

Примѣч. *C. sibirica* L. var. *divergens* Trautv. совсѣмъ нельзя смѣшать ни съ f. *elatio* m. ни съ var. *Hohenackeri* (Trautv.) m.; отъ той

и другой формы она хорошо отличается своимъ характернымъ соедѣніемъ и верхними листьями, которые имѣютъ продолговатую форму и обхватываютъ стебель. Вѣточки, несущія цвѣты, образуютъ широкую метелку и выходятъ изъ пазухи верхушечныхъ листьевъ. Цвѣты всегда направлены въосъ или иногда горизонтально. Вѣнчикъ узко-колокольчатый, чашелистики треугольно-ланцетные, придатки продолговатой формы равняются трубкѣ чашечки.

*** f. corymbosa** m. floribus sat magnis corymbosis, calycis laciniis linearibus, appendicibus brevissimis denticulatis. v. s. in h. P.

Hab. in regione silvatica Daghestaniae — **X. D.** Дагестанъ, кустарники по южнымъ скатамъ горы Хако. 1. VI. 89. Кзнец.!

Примѣч. Отъ типичной var. *divergens* Trautv. отличается зонтикообразнымъ или скорѣе щитковиднымъ соедѣніемъ, болѣе узкими чашелистиками и короткими придатками; верхушечные листья такіе же какъ и у типичной var. *divergens* Trautv., т. е. продолговатые и стеблеобхватывающіе. Экземпляры, къ сожалѣнію, неполные и не имѣютъ низовыхъ листьевъ.

*** var. Hohenackeri** (Trautv.) m. multicaulis, caulibus ascendentibus multifloris, foliis canlinis oblongo-lanceolatis, floribus medioeribus, radice sat crasso. ☺. v. v. et s. in h. A. P. J. Tm. Th

Trautv. in A. H. P. VI, p. 62. (partim); II, p. 564; IV, 2. p. 388; X, p. 120. — Somm. Lev. A. H. P. XVI. p. 314.

Syn. *C. Hohenackeri* Fisch. et Mey. Suppl. ad. Ind. IX. sem. Hort. Petrop. p. 9. — C. A. Mey. in Beitr. zur Pflanz. Kunde d. Russ. R. VI. p. 24, 62. — Rupr. in Bull. de l'Acad. de St. Petersburg. XI. p. 217. — *C. sibirica* var. *typica* Trautv. (partim). — *C. sibirica* β. *major* Boiss. III, p. 201. (partim). — *C. sibirica* var. *imeretina* Trautv. (partim) in A. H. P. IV. 2. p. 388.

Hab. in rupestribus regionis subalpinae et alpinae Caucasi. — **S. T.-N.** Крымъ. Левейе! Новороссійскъ. 15. VI. 90. Липск.! (f. appendicibus longis, hispida). — **S. K.** Кубанск. обл. Карачай, въ лѣсахъ. 27. V. 84. Сипягинъ! — **S. T.** Военно-Груз. дор. Ларсѣ. 9. VIII. 43. Коленати! Тамъ-же. 3240'. 4. X. 61. Рупр.! 25. VI. 94. Б. Федченко! Между Владикавказомъ и Балтой. 25. VI. 94. Б. Федч.! Между Ларсомъ и Казбеккомъ. 20. IX. fl. fr. Соммѣ и Левѣе. На скалахъ около г. Казбекъ. 4200'—4500'. 21. IX. Соммѣ и Левѣе. Ардонъ. 5000'. 28. VII. 91. Акнф.! Осетія, Архондонъ. 17. VI. 98. Марковичъ! Г. Джиналъ близъ Кисловодска. 4500'. 17. VIII. 89. Акнф.! Чечня, аулъ Хой, каменист. склонъ въ альпійск. обл. 9. V. 89. Кзнец.! Лѣсные луга между Аргунью и Ченты-акхъ. 12. VI. 89. Кзнец.! (appendicibus parvis). Буртунай, сѣверное подножіе Ханакой-тау 5000'. 10. VI. 94. Радде и Кёнигъ! — **A. W.** Абхазія, г. Копѣйме, известняки. 2. IX. 94. Альбовъ! (l. cit. sub *C. sibirica* L. var. *major* Boiss. c. fruct.). — **A. M.** Гудауръ. VIII. 75. Радде! На скалахъ близъ ст. Коби Военно-Грузинск. дор. Гогенаккеръ! Казбекъ. Смирновъ! Окрестности г. Адай-хоха. 6. VII. 01. Куницкій! По р. Кистинкъ 31. VI. 01. Куницк.! — **A. O.** Дагестанъ, Богосск. горы между Тинды и Акнада. 5750—6000'. 7. VII. 61. Рупр.! Дагестанъ, Салты. 7500'. 15. VIII. 97. Пурингъ! Самурск. окр. близъ сел. Гедымъ на скалахъ. 7100'. 16. VIII. 00. Алекс.! — **X. D.** Шалбузъ-дагъ. Беккеръ! Между сел. Ахты и Курушъ. Беккеръ! Арахюль. 9. VII. 85

Радде! Гунибъ. 21. VI. 94. Радде и Кёнигъ! Сумада. 5. VIII. 85. Радде! Аварск. окр. на южныхъ склонахъ г. Гимры. 5200'. 22. V. 01. Алекс.! Аварск. окр. близъ с. Хергебъ (Гергебиль) на вершинѣ хребта Зуберха. 5400'. 28. V. 01. Алекс.! Аварск. окр. у лѣв. берега Койсу ниже сел. Гимры. 1500'. 25. V. 01. Алекс.! Тамъ-же, на вершинѣ Зунукхъ. 6300'. 28. V. 01. Алекс.! Аварск. окр. на южн. склон. г. Гимры. 3600'. 22. V. 01. Алекс.! Тамъ-же. 4000'. 22. V. 01. Алекс.! Аварск. окр. въ ущельѣ Мухита на скалахъ. 2100'. 26. V. 01. Алекс.! Между Гимры и Ашильты. 22. V. 89. Кзнецъ! По южн. склону Салатау по дорогѣ въ Черкаты. 24. V. 89. Кзнецъ! По осыпямъ близъ Сумады. 31. V. 89. Кзнецъ! Салатау, у дороги выше сел. Чиркей. 2000—3000'. 28. VI. 97. Алекс.! Гунибск. окр. у дороги между сел. Гунибъ и Чохъ. 3100'—5300'. 6. VII. 97. Алекс.! Хасавъ-юртовскій окр., Салатау, выше сел. Гонзагой. 6000'. 28. VI. 97. Алекс.! Южный склонъ Ханакой-тау. 8100'. 15. VII. 61. Оверинъ! Дагестанъ, близъ с. Данухъ. 26. VII. 61. Оверинъ! — **S. D.-K.** Дагестанъ, истоки р. Самура ниже сел. Башъ-Мухахъ. 6300'—6600'. 14. VII. 60. Рупр.! Даргинск. окр. въ ущельѣ близъ Ванаши-Маххи у сел. Дешлагаръ. 2200'. 30. V. 01. Алекс.! Даргинск. окр. близъ вершины Шамхаль-дагъ, мѣстность Лабхала-Муса, пастбища. 5000'. 5. VII. 98. Алекс.! — **S. Ib.** Военно-Грузинск. дор. Пасануръ. 27. VI. 90. Кзнецъ! Анануръ. 30. VI. 94. Б. Федченко! Кахетія, Гомборы. 4980'. 27. VIII. 61. Рупрехтъ! Тифл. губ., Сигнахск. у., скалы у замка Тамары въ окрестности уроч. Царскіе Колодцы. 14. V. 99. Өом.!! Тифл. губ., Сигнахск. у., подъемъ на гору Хочаль, надъ сел. Лагодехи. 18. VI. 98. Өом.!! — **A. A.** Близъ оз. Табидхури въ Ахалцыхск. у. Тифл. губ. около 7000'. VI. 75. Радде! Тамъ-же. VIII. 77. Бротерусъ! — **X. A.** Близъ Ахалкалаки. Лаговск.! Берегъ оз. Гокчи. VII. 75. Радде! На скалахъ у оз. Гокчи между Еленовкой и Семеновской. 5. VII. 00. Өом.!! Тамъ-же. 12. VI. 86. Оверинъ! У озера Хозанинъ въ субальп. обл., близъ сел. Канарбель Карсск. обл., скалы. 17. VI. 03. Михайловскій! Карсск. обл. у сел. Урь по берегу Куры. 15. VI. 03. Михайловскій! (переходная къ *f. parviflora* m.). Переваль Б. Ахъ-Баба, Карсск. обл. на скалахъ въ субальп. поясъ. 22. VI. 03. Михайловскій! — **S. S.-K.** Карабахъ, близъ с. Лишкъ у истоковъ р. Мингры-чай. 11. VI. 71. Радде! Между Манглисомъ и сел. Приютъ на лѣсн. опушкѣ. 9. VI. 01. Өом.!! Бѣлый Ключъ, Тифлисск. губ. 5. VI. 01. Роопъ! Окрестности Делижана. 1889. Медвѣдевъ! Лѣсъ ниже сел. Семеновки въ субальп. поясъ. VIII. 88. Камсарака нъ! Лѣсъ около с. Головина. VIII. 88. Камсар.! Ст. Караклисъ, Карсской жел. дор. 18. VI. 01. Өом.!! Шуша. Гогенаккеръ! Зурнабадъ. 17. V. 44. Коленати! — Кавказъ, Адамсъ! Кавказъ, Вильгельмсъ!

* **f. nana** m. parva, caulibus debilibus, foliis caulinis elliptico-lanceolatis, floribus parvis sparsis. ☺. v. s. in h. A.

Hab. in pratis alpinis Cauc. centr. — **A. M.** На горныхъ лугахъ у ручья Кассаутъ въ Центральномъ Кавказѣ!

Примѣч. Этотъ экземпляръ находится въ гербаріѣ Академіи Наукъ и неизвѣстно кѣмъ собранъ.

* **f. parviflora** m. caulibus erectis et ascendentibus, floribus parvis. ☺. v. et s. h. A. P. J. Tm. Th.

Syn. *C. sibirica* var. *parviflora* Trautv. in A. H. P. VI. p. 62.
 — *C. parviflora* Lam in A. D. C. I. cit. p. 245 — *C. sibirica* Ломак. въ Матер. для Фл. Карабаха, стр. 57.
 — *C. sibirica* var. *major* Sommier et Levier in A. H. P. XVI. p. 314. (partim). — *C. sibirica* var. *Hohenackeriana* Гринев. Резулт. двухъ ботан. путешеств. на Кавк. въ 1900—1901 г.г. стр. 52. — *C. sibirica* Becker. Reise p. 249. 251. — *C. sibirica* var. *caucasica* Trautv. in A. H. P. V. 2. p. 454.

Hab. in siccis et lapidosis regionis inferioris et silvaticae Caucasi. —

S. Т. Близъ ст. Ларсѣ. 9.VII.43. Коленаги! Бештау, г. Развилки. 14. VII. 67. Оверинъ! Дагестанъ, Шаро-Аргунь. 17. VII. 94. Радде и Кёнигъ! Евдокимовское. 11.VII.94. Радде и Кёнигъ! — **X. D.** Дагестанъ, Аварск. окр., близъ сел. Гимры на сѣверныхъ каменистыхъ склонахъ. 1500'. 23. V. 01. Алексѣнко! Самурскій окр. близъ сел. Гедымъ на скалахъ. 7100'. 16. VIII. 00. Алекс.! Данухъ. 26. VII. 61. Оверинъ! Дагестанъ. Шалбузь-дагъ. 1876. Беккеръ! Дагестанъ. Кризь. 1873. Беккеръ! Алахунь-дагъ. 1880. Беккеръ! Курушъ. Беккеръ! — **S. D.-K.** Бакинск. губ., Кубинск. у., у р. Самура близъ сел. Хазры. 2310'—2000'. 5. VII. 99. Алекс.! (spec. incompl.). Дагестанъ, Кайтаго-Табасаранскій окр. близъ сел. Дешлагаръ. 1600'. 30. V. 01. Алекс.! Ущелье близъ Ванашы-Макхи къ юго-западу отъ Дешлагара. 2000'. 30. V. 01. Алекс.! Темиръ-Ханъ-Шуринск. окр. на сѣверн. склонѣ хребта Мадыгинъ-тау выше Эрпели, луга. 4200. 29. VI. 98. Алекс.! Темиръ-Ханъ-Шуринск. окр. близъ ст. Атин-буйонъ. 1000'. 12. V. 01. Алекс.! Маджалисъ. Беккеръ! Дагестанъ, близъ Касумъ-кентъ. Беккеръ! Мурутъ. Беккеръ! Бакинск. губ., Кубинск. у., у р. Кусаръ-чай выше с. Джагларъ. 3900'. 2. VII.99. Алекс.! — **S. P.** Абасъ-Туманъ. VII.85. Радде! Тамъ-же. Смирновъ! 20. VI. Оверинъ! — **S. Ib.** Тифлисъ. VI. 67. Радде! Тифлисск. губ., Сигнахск. у., сухіе глинистые склоны въ ущельѣ Назарлебишъ-хеви въ Ширакской степи. 12. V. 99. Оом.!! Тамъ-же. 23.IV.99. Оом.!! Ширакская степь, дорога въ Эльдаръ, заросли можжевельниковъ. 13.V.99. Оом.!! Сигнахскій у. Тифлисск. губ. у мѣст. Лагодехи. 16.VI.98. Оом.!! Тифлисск. губ. Мухетъ. 5. VI. 89. Липск.! На скалахъ въ ущельѣ близъ Сигнаха Тифл. губ. 28. VI. 00. Гринев.! Кахетія. Карданахъ. 1. VII. 00. Гринев.! Сигнахъ. 1891. Медвѣдевъ! Анурети, Тифл. у. Медв.! Кахетія, на скалахъ въ лѣсу близъ Лагодехъ. 6. VII. 00. Гринев.! Бакинск. губ., Шемахинск. у. близъ сел. Мюджи на известков. скалахъ. 4100'. 30.VII.00. Алекс.! Тифлисъ, г. Св. Давида. 5. VI. 63. Оверинъ! Тамъ-же. 9. VII. (№ 868. cum fruct.) Соммье и Левье! (sub *C. sibirica* L. var. *major* Boiss.). Карталинія. Лаговск.! Военно-Груз. дор. Цалканы. 30.VI.94. Б. Федченко! (cum fruct.). Тифлисъ. VI.67. Радде! — **X. A.** Еленовка. 22. VI. 86. Оверинъ! Около Ахалцыха. Ивановъ! Мамутли. Байернъ! Между Ардаганомъ и Чаульскимъ переваломъ на скалахъ. 14. VI. 03. Михайловскій! Еленовка. 8.VII.94. Б. Федченко! — **S. S.-K.** Боржомъ. VI. 67. Радде! Тамъ-же. 4. VI. 65. Радде! 5.VI.96. Радде! 19. VI. 88. Акинф.! Ацхуръ, скалы. Мищенко! Окрестн. Боржома. Ахалцыхск. дор. 7.VII.98. Медвѣдевъ! Забухъ. 23.V.90. Радде! Коджоры. 1878. Смирновъ! На холмахъ у р. Ганджи. 17. V. 44. Коленаги! Скалы у Лысогорска. 2.VI. 95. Ломак.! Шуша, скалы. 4500'. 2.

VI. 95. Ломак! Карабахъ, с. Герюсы. 12. VII. 95. Ломак! — Кавказъ. Мусинъ-Пушкинъ!

Примъч. *C. sibirica* L. var. *Hohenackeri* m. типичная представляет собою растеніе субальпійскаго и альпійскаго регіоновъ какъ Главнаго хребта, такъ и Малаго Кавказа; въ послѣднемъ впрочемъ она встрѣчается сравнительно рѣже, замѣняясь въ болѣе сухихъ мѣстностяхъ формой *parviflora* m. Эта послѣдняя встрѣчается часто въ Дагестанѣ на большихъ высотахъ въ горно-стенныхъ пространствахъ, а также въ стѣнныхъ и горно-стѣнныхъ мѣстностяхъ восточнаго и южнаго Закавказья. Различіе между типичной формой и *f. parviflora* m. сводится къ уменьшенію у послѣдней величины цвѣтовъ, къ удлинненію стеблей и большей ихъ вѣтвистости. Путешествуя въ разныхъ мѣстахъ Кавказа мнѣ часто приходилось наблюдать эти переходы на одномъ и томъ-же хребтѣ съ поднятіемъ вверхъ и даже на одномъ и томъ же уровнѣ, но только на разныхъ склонахъ.

**C. daghestanica* m. *glauca* caulibus e rhizomate lignoso ascendentibus simplicibus vel ramosis *flexuosis crispule* et *adpresse pilosis*, foliis radicalibus spathulatis, caulinis oblongo-lanceolatis in petiolum attenuatis, superioribus diminutis sessilibus, *omnibus crebre crispule* et *adpresse pilosis* margine *obtusely crenatis* et *crispulis*, floribus mediocribus pedicellatis pedicellis bracteolatis tenuibus eis triplo vel quaduplo brevioribus bracteolis anguste lanceolatis, calycis *glaucae glabri* laciniis *triangulari-lanceolatis* obtusiusculis corolla coerulea *tubulosa* glabra vel ad nervos parce pilosa 3—4-plo brevioribus, appendicibus *obovatis concavis* laciniis calycinis *subaequalibus* margine cum laciniis calycinis *rigide pectinato-ciliatis*, ciliis apice uncinatis vel hamatis, stylo incluso, receptaculo glabro. 24. v. s. in h. A. P. Tm.

Hab. in rupestribus Daghestaniae. 1500'—5500'. — **S. T.** Чечня, аулъ Чиркей, по скаламъ. 17.V.89. Кзнец! — **X. D.** Аварскій окр. близъ с. Гимры на сѣверо-западн. каменныхъ склонахъ. 1600'. 23. V. 01. Алекс.! Тамъ-же на сѣверн. каменныхъ склонахъ. 1500'. Алекс.! (*f. parviflora*). Дагестанъ близъ Гуниба. 4000—4500'. 5.VII.97. Алексѣенко! — **S. D.-K.** Сѣверн. Дагестанъ у. р. Сулакъ. 9.VI.61. Рунрехтъ! Дагестанъ, Темиръ-Ханъ-Шурикск. окр., близъ сел. Ишкарты, на южныхъ известковыхъ, каменныхъ склонахъ. 2900'. 21.V. 01. Алекс.! Даргинскій окр. на известнякахъ близъ сел. Левашин. 3800'. 2. VII. 98. Алекс.! Тамъ-же. 1894. Радде! На скалахъ юго-западн. склона горы Маара къ юго-западу отъ с. Акуша. 6400'. 15.VII.98. (*f. parviflora*). На глинистыхъ обрывахъ выше сел. Усенша. 5200'. 12. VII. 98. Алекс.! Близъ сел. Левашин на западномъ склонѣ хребта Урко-Карахъ, на известнякахъ. 4400'. 3.VII.98. Алекс.! Близъ с. Цудакара на известковыхъ скалахъ. 3700'. 17. VII. 98. Алекс.!

Примъч. Оригинальное растеніе, сизое; нижніе листья лопатчатые тупые или заостренные, стеблевые ланцетные, оттянутые въ тонкій черешекъ, верхніе сидячіе ланцетные, обыкновенно всѣ городчатые и слегка курчавые. Отъ всѣхъ формъ изъ группы *Sibiricae* m. хорошо отличается своей характерной сизой чашечкой, у которой треугольные туповатые чашелистики и овальные или обратно-овальные сильно вогнутые придатки усажены по краю жесткими гребенчато-оттопыренными и загнутыми крючкомъ рѣсничками. На сухихъ экземплярахъ чашелистики представляются килеватыми. Трубочатый вѣлчикъ очень варьируетъ по величинѣ, что зависить, очевидно, отъ высоты мѣстности и другихъ мѣстныхъ условій роста.

***7. C. imeretina** Rupr. caulibus et radice lignosa inter *caudiculos foliigeros* (*fasciculos*) ascendentibus *dichotome-ramosis* plus minus hirsu-

tis, ramis gracilibus, foliis fasciculorum steriliu sat magnis ovatis in petiolu aequilongu attenuatis, caulinis inferioribus eis similibus, plerumque minoribus, superioribus sessilibus *ellipticis* vel *elliptico-oblongis*, omnibus supra *adpresse crispule-pilosis* intra tantu ad nei vos pilis obsitis margine obsolete crenatis et patule pilosis, floribus parvis pedicellatis, *pedicellis erectis tenuibus*, calycis laciniis *late-lanceolatis acutis* corolla coerulea *tubuloso-campanulata glabra* 2 $\frac{1}{2}$ —3-plo brevioribus, appendicibus triangularibus acutiusculis vel ovatis tubu subexcedentibus, omnibus cum laciniis calycinis margine *ciliis latiusculis longis* saepe *intricatis obsitis*, stylo subexserto, receptaculo glabro. v. v. et s. in h. P. A. Tm. Th.

Rupr. Bull. de l'Acad. d. Sc. de St. Petersburg. XI. 1867. p. 217 (отд. отд. 193.). — Boiss. III. p. 908. — Липск. Фл. К стр. 378. — Оом. Труды Тифл. Ботан. Сада, вып. VI. кн. 2. стр. 9 и 51.

Syn. *C. sibirica* var. *imeretina* Trantv. in A. H. P. VI. p. (partim). — *C. brassicaefolia* Som. et Levier in Nuov. Giorn. Bot. Ital. 1895, p. 94. et in A. H. P. XVI. p. 320. — *C. caucasica* C. Koch, in Linnea XVII. p. 279.

Icon. Act. H. P. XVI. tab. XXX.!

Hab. in fissuris rupium regionis inferioris Imeretiae. — **S. P.** На скалах у р. Цител-цхали близъ Кутаиса. 14. XI. Рупрехтъ. Тамъ-же. 15. XI. Радде! (determ. Рупрехтъ in herb. Medwedewi), 13—18—19. VI. 95. Бушъ! 20. XI. 01. Оом.!! XI. 01. Тимофеевъ! 23. IV. 01. Оом.!! Рача. 1838. Кохъ! Кутаисъ, выше праваго берега р. Рюна. 2. VII. fl. fruct. Соммье и Левье! Сванетія, Латаль. 4. VII. 90. Акинф.!

Примѣч. Отъ всѣхъ видовъ группы *Sibiricae* ш. отличается короткими безплодными побѣгами, которые закапчиваеъ розеткой довольно крупныхъ листьевъ, сохраняющихся въ теченіе всей зимы. Весною слѣдующаго года эти короткіе побѣги развиваются дальше и даютъ уже стебли съ цвѣтами. При теплой осенней погодѣ въ Кутаисѣ этотъ видъ пачинаетъ цвѣсти въ октябрѣ; въ это же время можно найти экземпляры и съ плодами. У экземпляровъ, растущихъ въ тѣнистыхъ мѣстахъ, вѣточки бываютъ чрезвычайно тонкія. Экземпляры, обтѣдченные вначалѣ скотомъ, развиваютъ потомъ множество тонкихъ вѣточекъ съ чрезвычайно большимъ числомъ цвѣтовъ и бутонувъ. У экземпляровъ, цвѣтущихъ осенью, лопасти чашечки и ея придатки по краю бываютъ гуще покрыты рѣсничками, чѣмъ у экземпляровъ весеннихъ или лѣтнихъ. Эти рѣсницы довольно длинныя и перепутываются между собою. Рыльце въ концѣ цвѣтеція болѣе или менѣе выставляется изъ вѣлчика. (См. также Ооминъ, l. cit.).

*8. *C. caucasica* M B. glauca omnis cum foliis adpresse pubescens rarissime glabrescens. *caudiculis* e radice fusiformi *tenuibus nudis fragilibus* ramosis, *prostratis subradicantibus*, caulibus ascendentibus brevibus laxe 3—5-floris foliis inferioribus et surculorum steriliu *obovatis* vel *rotundatis* in petiolu sublongiorem attenuatis, caulinis diminutis breviter petiolatis, omnibus margine subcrenulatis, *dense crispule albo-ciliatis* et saepe revolutis, *pedicellis* flore longioribus bracteola minima obsitis, floribus parvis, calycis *rigide ciliati* laciniis triangulari-lanceolatis corolla glabra vel ad nervos parce rigide pilosa tubuloso-obconica quadruplo brevioribus, appendicibus laciniis subduplo brevioribus, capsula nutante. 2. v. v. et s. in h. A. P. Th.

M B. Casp. p. 140, App. № 14; Fl. taur.-cauc. I, p. 156. — A. D. C. Monogr. Campan. p. 245. — D C. Prodr. VII. p. 465. — C. A. Mey. Verzeichn. d. Pflanz. d. Cauc. p. 84. — Rupr. Bull. de l'Acad. de Se. de St. Petersburg. XI. p. 193. отд. отд. — Boiss. III, p. 907. —

Липск. Фл. К. стр. 378. — Оминъ. Труд. Тифл. Бот. Сада. VI. кн. 2. стр. 51.

Syn. *C. sibirica* Ledeb. II, p. 879. (partim). — *C. sibirica* var. *caucasica* Trautv. in A. H. P. VI, p. 61.

Hab. in abruptis lapidosis Caucasi magni orientalis. 2000—8800'. —

А. О. Будугъ. Стевенъ! Хиналугъ. Стевенъ! Куртъ-Булагъ. Стевенъ! Гора Туфандагъ. Мейеръ! Дагестанъ. Кризъ. Беккеръ! Шемахинск. у. на скалахъ выше сел. Мюджи. 4300'. 30. VII. 00. Алекс.! На каменныхъ пастбищахъ у. г. Дибаръ. 4600'. 25. VII. 00. Алекс.! На склонахъ г. Ниягъ близъ д. Царнова. 5200'. 31. VII. 00. Алекс.! Дагестанъ. Самурек, окр. близъ сел. Курушъ въ ущельѣ Кекеръ-дере, на каменныхъ мѣстахъ. 8800'. 21. VIII. 00. Алекс.! Кубинскій у. Бакинской губ. на каменныхъ осыпяхъ ущелья выше сел. Джеми. 7500'. 13. VII. 00. Алекс.! Близъ сел. Купахъ-кенъ на южн. склонахъ. 4100'—4500'. 13. VII. 00. Алекс.! На известковыхъ скалахъ южн. склона выше сел. Лерфи. 4900'—5400'. 14. VII. 00. Алекс.! По сухимъ мѣстамъ выше сел. Гюмюръ. 5000'. 11. VII. 00. Алекс.! — **S. D.-K.** Кубинск. у. Бакинской губ. на сухихъ мѣстахъ между кустарникомъ у р. Ата-чай. близъ сел. Халтанская Казма. 24. VII. 00. Алекс.!

Примѣч. Этотъ видъ чрезвычайно характеренъ по своимъ безплоднымъ стелющимся побѣгамъ, которые затѣмъ часто укореняются. Листья обыкновенно сверху съ прижатыми волосками по краю слегка городчатые и окаймлены курчавыми, толстыми, бѣлыми волосками, образующими по краю листа какъ-бы бѣлую нить. Экземпляры, растущіе на очень сухихъ мѣстахъ, имѣютъ корень очень длинный и утолщенный у шейки. Видъ этотъ встрѣчается повидимому только въ восточной части Главнаго Хребта, гдѣ произрастаетъ отъ 2000'—8800' надъ ур. моря. Въ гербаріи Импер. С. Петерб. Ботан. Сада (herb. Ledeb.) имѣется экземпляръ этого вида съ этикеткой „Beschtau — ex herb. Fisch.“. Этотъ экземпляръ определенъ Рупрехтомъ и тутъ же его рукой на этикеткѣ написано: „dubito R.“. Такимъ образомъ видно, что Рупрехтъ сомнѣвался относительно нахождения этого вида на Бештау. Среди большого матеріала по *Campnula*, имѣянаго въ моихъ рукахъ, ни одного экземпляра *C. caucasica* М. В. съ Бештау или соседнихъ съ нимъ мѣстностей я не имѣлъ. Поэтому приходится считать, что на упомянутой этикеткѣ мѣстонахождение „Beschtau“ обозначено не вѣрно. Въ Тифлисскомъ Ботаническомъ Саду это растеніе прекрасно растетъ; оно выведено изъ сѣмянъ гербарія О. Н. Алексѣенко. Безплодные побѣги ползутъ по камнямъ и кое-гдѣ въ щеляхъ скалы укоренились.

9. *C. propinqua* Fisch. et Mey. patule *strigoso-hispida*, caulibus pumilis *dichotome ramosis*, foliis inferioribus spathulatis subcrenatis, caulibus sessilibus *oblongis* vel *oblongo-lanceolatis obtusis* margine integris vel subrepandis, floribus parvis in dichotomiis terminalibusque breviter pedicellatis, calycis *strigosi* laciniis *anguste lanceolatis acutis erecto-patulis*, appendicibus triangularibus acutiusculis vel obtusis tubum excedentibus, corolla *pallide-violacea* infundibuliformi extus ad nervos hirta calyce duplo vel $2\frac{1}{2}$ -plo longiore, capsula nutante. ☉. v. v. et s. in h. P. Tm. Th.

Fisch. et Mey. Ind. II. semin. Hort. Petrop. p. 32. 1835. — D. C. Prodr. VII, p. 462. — Boiss. III. p. 930. — Trautv. Enum. pl. Radd. in A. H. P. II, 2. p. 563; A. H. P. VI, p. 61. — Ломак. Труды Тифл. Ботан. Сада вып. III, стр. 57. — Липск. Фл. К. стр. 379. — Radde, Mus. Cauc. II, 122. — Оминъ. Труд. Тиф. Бот. Сада VI, 2. стр. 51.

Syn. *C. Pestalozzae* Boiss. Diagn. Ser. I, 11, p. 62. — *C. hispidissima* Hochst. Lorent. Reis. p. 331.

Exsicc. Sintenis. Iter orientale. 1894. № 6014!

Hab. in desertis salsuginosis Armeniae rossicae. — X. A. Алинджи-чай. 9. VI. 71. Радде! Близъ сел. Белавъ. 17. VI. 71. Радде! Джульфа. Христофъ! Тамъ-же. 24. V. 00. Оом.!! Ордубадъ. 8. VI. 90. Радде! Нахичеванск. у. Эриванск. губ. близъ с.с. Карабаба и Шахбузъ на каменныхъ мѣстахъ. 25. V. 00. Оом.!! Ольтинскій окр. Кареск. обл. Косоръ. 8—9. VII. 03. Кёнигъ! (с. fruct.). — S. S.-K. Худоферинскій постъ пограничный съ Персией. 13. V. 90. Радде!

Ar. Geogr. Asia minor, Persia.

Примѣч. Очень красивое растеніе, цвѣтетъ съ конца мая по іюль и распространено по солонцеватымъ глинистымъ и каменнымъ участкамъ въ южномъ Закавказьѣ. Ростомъ отъ 2 до 4 вершк., нижніе листья какъ у другихъ видовъ группы *Sibiricae* т. лопатчатые съ черешкомъ равнымъ пластинкѣ листа. Вѣнчикъ маленькій свѣтло-фіолетовый окрашенъ только до половины, т. е. до чашелистиковъ, вся же нижняя часть вѣнчика между чашелистиками остается бѣлой, отчего получается изнутри бѣлый глазокъ. Чашелистики всегда узко-ланцетные острые, между тѣмъ какъ треугольные придатки чашечки сильно варьируютъ и бываютъ то сильно заостренными, то совсѣмъ тупыми. Вѣнчикъ раздѣленъ глубже чѣмъ на $\frac{1}{3}$ и его доли имѣютъ продолговато-овальную форму.

Series III. Cordifoliae m.

Folia inferiora cordata, ovato-cordata vel triangulari-cordata.

10. G. alliariefolia Willd. pubescens, caulibus e radice crassa erectis et ascendentibus simplicibus vel basi ramosis, foliis radicalibus triangulari-cordatis vel cordatis obtusis vel acutiusculis longe petiolatis, caulinis similibus breviter petiolatis, superioribus diminutis subsessilibus, omnibus supra pubescentibus viridibus infra albo-tomentosis vel subtomentosis margine irregulariter crenato-dentatis, floribus magnis brevissime pedunculatis in racemum longum unilateralem dispositis, calycis tomentosi laciniis late lanceolatis vel ovatis acutis,³ appendicibus lanceolatis tubo aequantibus, corolla alba pubescente infundibuliformi-campanulata, ore barbata laciniis calycinis 4—5-plo longiore, stylo incluso. 24. v. v. et s. in h. A. P. J. S. K. M. Tm. Th.

Willd. Sp. I, p. 910. — A. D. C. Monogr. Campan. p. 241. — D. C. Prodr. VII. p. 464. — C. A. Mey. Verzeich. d. Pflanz. des Caucas. p. 84. — Нohenack. Enumer. Elisabethpol. p. 221. — Trautv. in A. H. P. IV. 2. p. 388; VI. p. 67; VII. p. 478; X. p. 121. — Boiss. III. p. 902. — Шмальгауз. II. p. 178. — Alb. Prodr. Fl. Colch. p. 185. — Липск. Фл. К. стр. 377. — Somm. et Lev. in A. H. P. XVI. p. 316. — Radde, Mus. Cauc. II. p. 121. — Оом, Тр. Тифл. Бот. Сада, вып. VI. кн. 2. стр. 51. — Гринев. Резулт. двухъ путешеств. на Кавк. въ 1900 и 1901 гг. стр. 52 и 125.

Syn. C. lamii folia Adam. in Web. et Mohr. Beitr. I. p. 48. (1805). — M. B. Fl. taur.-cauc. I. p. 154, 423. (1808); III. p. 144. — Eichw. casp. cauc. p. 26, 31. — C. Koch. in Linnaea. XVII. p. 279. — Ledeb. II. 878. — Овер. Замѣт. о растит. Ахалцыхск. у. стр. 265. — *Campanula foliis Lamii* etc. Вухб. Cent. V. p. 10. tab. 18. — *C. macrophylla* Sims. in Bot. Mag. tab. 912. (sec. A. D. C. l. cit.). — Rupr. Bull. de l'Acad. de sc. de St. Petersburg. XI. p. 194. отд. отд. — *C. alliariefolia* Willd. varr. *cordata* et *macrophylla* Trautv. l. cit.

Exsicc. Sintenis, Iter orient. 1894. № 7082!

Hab. In rupibus et lapidosis regionis inferioris et silvaticae, 1500'—6000'. — **S. K.** Кубанская обл. Баталпаинск. 1. VII. 90. Липск. (foliis infra subtoment.). Карачай. 3. VI. 84. Сипягинъ! Учкуланъ, камен. склоны. VII. 00. Десулави! Кубан. обл., долина р. Махара (р. Учъ-Куланъ на 5 верст. картъ) выше аула Учкуланъ, поляс соснов. лѣсовъ. 29. VII. 97. Бушъ! Кубан. обл., пихтово-елов. лѣса по М. Лабъ между уроч. Затишье и Умпырь. 21. VI. 99. Бушъ! (foliis infra subtoment.). Кубанск. обл. Хамынки. VII. 89. Кзнец.! (fol. infra subtoment.). Ново-Афон. мон. близъ ст. Даховской. VII. 89. Кзнец.! — **S.-T.** Военно-Груз. дор. близъ сел. Казбекъ. 5400'. 9. VII. 44. Коленати! Гудъ-гора. 6. VIII. 44. Коленати! На каменист. мѣстахъ у р. Терека. 2400'. К. А. Мейеръ. Близъ Владикавказа по скаламъ Военно-Груз. дор. 16. VI. 00. Левитск.! Военно-Груз. дор., близъ Садоны, скалы. 26. VI. 00. Левитск.! Ст. Балта. Военно-Груз. дор. VI. 90. Десулави! Пятигорскъ, Машукъ. 3. VII. 96. Литвиновъ! (fol. infra subtoment. magnis). Тамъ-же. Лѣсъ. 2. VII. 01. Шпряевъ! (fol. infra subtoment.). Осетія, на скалахъ р. Ардона. 3000'. 22. VI. 97. В. Цингеръ! Ардонъ. Лойка. Осетія. 1. VIII. 95. Марков.! Р. Црау. 2. VII. 95. Марков.! Терек. обл. у р. Баксана, на известков. скалахъ. 3000'. 15. VII. 96. Алекс.! Хасавъ-юртекій окр., Салатау, выше сел. Чиркей на известнякахъ. 3000'—4000'. 28. VI. 97. Алекс.! Тамъ-же. Выше сел. Гонзагой на известк. холмахъ. 5000'. 28. VI. 97. Алекс.! Салатави. Рупрехтъ. Военно-Груз. дор. Ларсъ. 22. VI. 94. Пурингъ! (fol. infra subtomentosis magnis). Терек. обл., по р. Баксану. 4000'. 25. VII. 96. Акинф.! (fol. infra subtoment. magnis). Баксанъ, Корхужанъ. 16. VII. 96. Акинф.! Терек. обл. Карасу у Нальчика. 4600'. 24. VII. 92. Акинф.! Леди. Безенги. 5000'. 26. VII. 92. Акинф.! Между Владикавказомъ и Балтой. 25. VI. 94. Федченко! Подкумокъ близъ Кисловодска. 2. VII. 92. Акинф.! Евдокимовское. 11. VII. Радде и Кёнигъ! Между Ларсомъ и Казбекомъ. 1843. Коленати! Владикавказъ. 1843. Коленати! Машукъ, южн. склонъ. 20. VII. 66. Байернъ! Чечня, каменист. мѣста около Кашкатау. 27. VII. 89. Кузнецовъ! Между Устар-гордоємъ и Гудермесомъ. 29. IV. 89. Кзнец.! Форельное озеро. (Эзень-амъ). 26. VII. 94. Радде и Кёнигъ! — **S. D.-K.** Акинф.! Темиръ-Ханъ-Шур. окр., близъ ст. Кизиль-яръ. 4500'. 3. VII. 97. Алекс.! — **X. D.** Дагестанъ, Гимры. Байернъ! Хунзахъ. 29. VII. 85. Радде! Дагестанъ. Турчидагъ. Лаговск.! — **S. P.** Рача. Кутаиск. губ. Байернъ! Имеретія, Алпана, на скалахъ. 25. VII. II. Соммье и Левье! Ур. Ріона. VI. Бротерусъ. Сваненія, Кала. 7. VIII. 90. Соммье и Левье. На холмахъ близъ Туансе. 29. VII. 00. Гринев.! (fol. subtoment.). Военно-Сухумск. дор., Клингъ на прогалинахъ. VII. 96. Десулави! Абхазія, Бзыбскій хреб., ущелье Гечигвара. 2. X. 93. Альбовъ! (fol. infra subtoment.). Мингрелія, г. Асхи, альп. регионъ. 22. VIII. 93. Альб.! (fol. infra subtoment.). Мингрелія, г. Джвари, альп. регионъ. 25. VIII. 93. Альб.! Сухумъ. VIII. 88. Альб.! Мингрелія г. Квира, альп. регионъ. 28. VII. 94. Альб.! Абхазія г. Астюшъ. Альбовъ. Мѣстность Ачепыджъ. Альбовъ. Мингрелія, между Ростотакты и г. Наталебъ, субальп. регионъ. 1893. Альбовъ. Лазистанъ—Аджарія, у моря, по скаламъ. 1885. Масальск.! (foliis magnis subtoment.). Аджарія, по скаламъ около Лишана. 26. VII. Масальск.! Абхазія, Гагры. 16. VIII. 97. Третьяковъ! Ланташи, Кутаиск. губ. 21. VII. 90. Акинф.!

Абхазія, скалы въ ущельѣ р. Кодора, дубовые лѣса. 13. IX. 99. Бушъ! (fol. infra subtoment.). Черноморск. губ., между Туапсе и Небугской. 25. V. 99. Бушъ! (fol. magnis infra subtoment.). Кутаиск. губ., около Кутаиса, ущелье Красной рѣчки. (Цители-цхали). 18. VI. 95. Бушъ! Абхазія, Цебельда, нижняя полоса лѣса у подножія подъема на Лахтинск. хребетъ. 9. VIII. 96. Бушъ! (fol. subtoment.). Цебельда около горы Апіанча, на скатѣ холмовъ. 2000'. 1868. Шперкъ и Рейнгардтъ! Имеретія. К. Кохъ. Гурія. Нордманъ! Абхазія, р. Аше. VII. 93. Радде и Кёнигъ! Абастуманъ. VII. 85. Смирновъ! Тамъ-же. VIII. 75. Радде! Переваль между Ново-Михайловскимъ и Ольгинскимъ. Байернъ! Близъ Артина. 1882. Петерсонъ! Имеретія. Чивизели, близъ р. Ріона. VI. 77. Бротерусъ! Черноморск. губ. г. Ахцѣ. 2. VIII. 95. Липск.! (fol. infra subtoment.). Сухумъ. Татариновъ! (fol. magnis infra subtoment.). Абхазія, на холмахъ, близъ сел. Юрьевского. 26. VI. 02. Вороновъ! — **A. M.** Осетія. К. Кохъ. Адамъ. Балкарія, Ахъ-су-баши, скалы по склонамъ горъ. VII. 01. Десулави! (pedunculis longis, appendicibus calycis ad dimidium tubum accedentibus). Балкарія. Цукашъ-су. 6000'. 15. VII. 91. Акинф.! На субальп. лугахъ горы Гудъ, близъ Кайшаура. 6. VIII. 44. Коленати! Балкарія, по скаламъ и каменистымъ осыпямъ въ верховьяхъ Ахъ-су. 30. VII. 89. Кзнец.! Осетія южн. склонъ горы Карца. 4. VI. 90. Кзнец.! Буковый лѣсъ на восточн. склонѣ и сѣверо-восточн. скл. у устья р. Чурты, поляны. 10. VIII. 90. Кзнец.! Дигорія, ур. Комъ. 2. VIII. 95. Марков.! Осетія, Ленскартъ. VII. 92. Марков.! Г. Бузованъ-картъ. 10. VI. 97. Марков.! Переваль Коби, Военно-Груз. дор. 15. VIII. 49. Лаговск.! Осетія, окрестн. г. Адай-хохъ. 6. VII. 01. Кунник.! — **S. Ib.** Иберія. Буксбаумъ. Адамъ. Вильгельмсъ! Кахетія. Эйхвальдъ. Сомхетія. Эйхвальдъ. Елисаветполь. Гогенаккеръ. Горы близъ г. Сигнаха. Тифл. губ. 2500'. 21. VII. 00. Гринев.! (fol. infra subtoment.). Телавск. у., сел. Икалто, на холмахъ. 8. VII. 98. Ом.! Бѣлый Ключъ. Тифлиск. губ. VII. 01. Роопъ! Коджоры, Тифлиск. губ. Смирновъ! Тифлисъ. 14. VIII. 53. Поморцевъ! Сурамъ. VIII. 94. Пурингъ! Мцхетъ. 4. VII. 94. Б. Федчен.! Коджоры. VII. 71. Шукъ! У р. Юры близъ кол. Маріенфельдъ. VI. Гогенаккеръ! Гудомакарское ущелье, осыпи южн. склона. 6. VII. 90. Кузнецовъ! Военно-Груз. дор., близъ Пассанаура, по скаламъ. 27. VI. 90. Кузнецовъ! Рѣка Ксанъ у монастыря, дубов. лѣсъ. 13. VII. 90. Кузнецовъ! Карталинія, Горн. VI. 81. Бротерусъ! Между Тюнеты и Сакарауло, скалы. 31. VII. 03. Бушъ! Тифлисъ. 1867. Медвѣдевъ! Тамъ-же, гора Св. Давида. 9. VII. фог. Соммье и Левье. Монастырь св. Антонія въ горахъ, 25 верстъ отъ Тифлиса. 7. VIII. 00. Роопъ! Иберія. Муссинъ-Пушкинъ! — **X. A.** Араратъ. Ходзько. На горѣ Алагевъ. Лаговск.! Кареская обл., Ольтинск. окр., сел. Керъоглы. 13. VII. 03. Кёнигъ! Ольтинск. окр., пограничный постъ Тамрутъ. 13. VII. 03. Кёнигъ! Окрестности оз. Гокчи, около сел. Орданичъ, камен. почва. 15. VII. Теръ-Казаровъ! — **S. S.-K.** Боржомъ, Черная рѣчка лѣвый берегъ, на скалахъ. 16. VI. 01. Мищенко! Караклисъ. 3. VII. 00. Кузнецовъ! Ом.! Боржомъ. 21. VII. 88. Акинф.! Тамъ-же. 2. VII. 88. и 23. VII. 87. Акинф.! 22. VII. 94. Б. Федчен.! (fol. magnis infra subtoment.). 1876. Медвѣдевъ! 25. VI. 00. Роопъ! Субальп. регионъ г. Кеспесъ-дагъ въ Карабахѣ. 27. VI. 44. Коленати! Г. Саріаль. 1844. Ко-

ленати! Тифлисъ. VII. 43. Коленати! Мамутли. Байернъ! (fol. magnis infra subtoment.). Коджоры. Байернъ!

Ar. Geogr. Asia minor!

Примѣч. Величина, форма и опушеніе листьевъ у *C. alliariaefolia* Willd., какъ я наблюдаю, варьируютъ въ извѣстныхъ предѣлахъ въ зависимости отъ мѣстныхъ условій роста; форма съ крупными треугольно-сердцевидными листьями и съ болѣе слабымъ опушеніемъ на нижней сторонѣ листьевъ встрѣчается въ затѣненныхъ и влажныхъ мѣстахъ, между тѣмъ какъ форма съ болѣе укороченными, сильно опушенными снизу листьями свойственна сухимъ и солнечнымъ мѣстамъ. Ввиду этого установленныя Траутфеттеромъ var. *cordata* и *macrophylla* я присоединилъ къ синонимикѣ этого вида.

*11. *C. sarmatica* Ker. caulibus crassis elongatis erectis simplicibus vel stricte ramosis pubescentibus, foliis radicalibus a basi *cordata oblongis* vel *ovato-oblongis* obtusiusculis petiolo *alato* saepe *lobulis obsito* suffultis, caulinis *ovato-oblongis* basi subcordatis vel cuneatis breviter petiolatis, superioribus sessilibus valde diminutis lanceolatis, omnibus utrinque subtus densius tomentellis margine *crispato-crenatis* vel *dentatis*, floribus sat magnis in racemum laxum subsecundum dispositis inferioribus plus minus longe pedunculatis, superioribus breviter pedunculatis vel subsessilibus, calycis laciniis triangulari-lanceolatis acutis corolla *campanulata* glabra vel ad nervos parce hirta *ore barbata pallide-coerulea* duplo vel triplo brevioribus, appendicibus saepe *parvis dentiformibus* vel a basi *dentiformi subulatis* tubo calycino hemisphaerico dense *albo-hirsuto-piloso triplo vel quadruplo brevioribus*, capsula nutante, stylo incluso, seminibus pallide fuscis ovatis compressis marginatis. 2. v. v. et s. in h. A. P. M. J. S. K. Fenn. Tm. Th.

Ker. in Bot. Reg. tab. 237. — A. D. C. Monogr. Camp. p. 240. — D. C. Prodr. VII. p. 464. — C. A. Mey. Verzeichn. d. Pflanz. des Cauc. p. 84. — Ledeb. II. p. 878. — Rupr. Bull. d. l'Acad. d. sc. de St. Petersb. XI. p. 195. отд. отр. — Boiss. III. p. 902. — Trautv. in A. H. P. V. 2. p. 454; VI. p. 66; X. p. 121. — Шмалъг. II. стр. 179. — Липск. Фл. К. стр. 377. — Somm. et Lev. in A. H. P. XVI. p. 516. — Radde. Mus. Cauc. II. p. 121. — Оом. Труд. Тифл. Бот. Сада, вып. VI. кн. 2. стр. 51.

Syn. *C. betonicaefolia* Biehl. plant. nov. herb. Spreng. p. 14. — MB. Fl. taur.-cauc. I. p. 153; III. p. 144. — Ризенк. Пятигор. Фл. стр. 41. № 943. — *C. gummifera* Willd. et *C. commutata* Roem. et Sch. Syst. veg. V. p. 143. — *C. albiflora* C. Koch, in Linnaea. XXIII. p. 634. (sec. Boiss. l. cit. p. 903.). — *C. sarmatica* Ker. var. *subtomentosa* Trautv. in A. H. P. VI. p. 67; X. p. 121. — *C. Brotherorum* Feer. Camp. nov. dec. prima. Journal of Botany. XXVIII. 1890. p. 273.

Icon. Ker. Bot. Reg. tab. 237.

Exsicc. A. H. et V. F. Brotherus. Pl. cauc. № 592!, in herb. Mus. Fenn. et Acad. Petrop.

Hab. in rupestribus et lapidosis Caucasi magni. 2000—8000'. — S. K. Кубанская обл. Баташаинскъ. 1. VII. 90. Липск.! Кардтжуртъ. 8. VII. 90. Липск.! (appendicibus a basi dentiformi subulatis tubum calycinum ad dimidium aequantibus). Теберды. 11. VII. 90. Липск.! (appendicibus tubum calycinum ad dimidium attingentibus). Лугъ въ листв. лѣсу близъ Тебердинскаго аула. 9. VIII. 97. Бушъ! Около Тебердинскаго аула, подножіе хребта Брушъ. 17. VIII. 97. Бушъ! На холмахъ на западъ отъ сел. Учкунъ.

ланъ. 1400 m. 3.IX.90. fr. Сомм. Лев. — **S. T.** Бештау. Гогенаккеръ! Кисловодскъ близъ Нарзана. Гогенаккеръ! Кисловодскъ. 29. VIII. 66. Байернъ! Между Ларсомъ и Казбекомъ. 1844. Коленати! Терек. обл. окрестн. Кисловодска, по скаламъ. 15. VII. 01. Шираевскій! Кисловодскъ. 7. VI. 96. Литвиновъ! Въ 7 верст. отъ Кисловодска. 4000'. 20. VII. 82. Акинф.! Г. Пикетъ близъ Кисловодска. 1884. Акинф.! Тамъ-же, по холмамъ. 4. VII. 86. Акинф.! Бештау. 19. VI. 67. Оверинъ! Тамъ-же. 4. VII. 43. Коленати! Горно-степной лугъ на Бештау. 28. VI. 89. Кузнецовъ! Кисловодскъ, Нарзанъ. Гёффтъ! Кисловодскъ. 18. VII. 90. Липск.! Тамъ-же. 20. VII. 92. Липск.! Кисловодскъ у Нарзана. М. Биб. Стевень. Кисловодскъ, по скаламъ въ долигъ рѣчки Березовой. 5. VII. 89. Кузнецовъ! Тамъ-же. 2800'. 8. VII. 89. Акинф.! (*appendicibus calycinis brevissimis*). Подкумокъ близъ Кисловодска. 26. VI. 92. Акинф.! (*appendic. calycinis brevissimis*). Гора Джиналъ. 4000'. 17. VII. 89. Акинф.! (*appendicibus calycinis fere ad dimidium tubum attingentibus*). Бургустанскія горы. 4000'. 8. VII. 92. Акинф.! Ледникъ Цей. 6420'. 5.IX.61. Рупр.! (*folia*). Тамъ-же. 8000'. 31.VII.94. Акинф.! (*ramosa floribus longe pedunculatis*). По Ардону, Зромакъ. 5000'. 28. VI. 91. Акинф.! Ардонъ. 6000'. 28. VI. 91. Акинф.! Владикавказъ. 28. VI. 87. Акинф.! Осетія. Военно-Осет. дор. близъ сел. Бизъ, на скалахъ. 26. VI. 00. Левитск.! Осетія, Сурхъ. 1—2. VIII. 95. Марков.! Алагирск. ущелье по скаламъ. 10. VI. 96. Марков.! Осетія близъ сел. Макчеськ у дороги. 4. VII. 97. Марков.! (*caulibus et foliis parce pilosis*). Осетія между Мисурцы и Алагиромъ у р. Ардонъ. VIII. 81. Бротерусъ! Военно-Груз. дор. Ларсъ. 14. VI. Оверинъ! (*robusta ramosa floribus longe pedunculatis*). Осетія, луга въ Ходекомъ ущельѣ. 25. VII. 95. Полторацкій! Военно-Груз. дор. Дарьяльск. ущелье. 4200'. 22. VIII. 61. Рупр.! (*folia*). Между ст. Балта и Рейданъ, на скалахъ. 15. V. 61. Рупр.! (*alabastr.*). Осетія у р. Ардона близъ с. Алагиръ. 2200'. 21. V. 61. Рупр.! (*alabastr.*). Военно-Груз. дор. Гвилетская караулка. 26. VI. 94. Б. Федч.! Форельное озеро, 6000'. 16. VII. 94. Радде! Сѣверное подножіе Ханакой-тау, близъ сел. Буртунай. 5000'. 10. VII. 94. Радде и Кёнигъ! — **X. D.** Курушъ. 1880. Беккеръ! Дагестанъ, Ардотъ. Байернъ! Микра. 29. VI. 85. Радде! Гунибъ. 23. VII. 85. Радде! Тамъ-же. 5000'—6500'. 5. VII. 97. Алекс.! Дагестанъ, Аварск. окр. близъ сел. Гимры, на холмахъ хребта Шуги-мееръ. 3500'. 24. V. 01. Алекс.! Истокъ рѣки Сулакъ. 960'. Рупрехтъ. Гимры, Николаевскій спускъ. 1800'. 9. VI. Рупр.! Данухъ. 26. VII. 61. Рупр.! Іоль-тау выше Гимры. 6000'. 17. VI. Рупр.! Курушъ. 8000'. Фаустъ! Крнсъ. 1873. Беккеръ! Гунибъ. 22. VI. 94. Радде и Кёнигъ! Между Гимры и Ашильты. 22. V. 89. Кузнецовъ! По скаламъ близъ Эчедитль. 31. V. 89. Кузнецовъ! (*appendicibus calycinis fere ad dimidium tubum attingentibus*). — **S. D.-K.** Дагестанъ. Даргинск. окр. близъ сел. Леваша на южномъ склонѣ хребта Урко-Каракъ. 4400', на известнякахъ. 3. VII. 98. Алекс.! — **S. P.** Сванетія. Между Едини и Кадласенъ у р. Диди-Ляхва. 20. VII. 81. Бротерусъ! (№ 592. Feer. l. cit. sub *C. Brotherorum.*). — **A. M.** Пріютъ близъ Мамиссона. 8000', по Ардону. 27. VII. 03. Акинф.! Коби. Гогенаккеръ! Казбекъ. 1893. Медвѣдевъ! Военно-Осет. дор. у Мамиссона, по склонамъ около 7000'. VII. 97. Десулави! Дигорія, Комъ. 3. VIII. 95. Марков.! Между Мисурцы и Алагиромъ въ Осетін. VIII. 81. ff. Бротерусъ!

(№ 591. его коллекції). Балкарія, 4500'. 14. VII. 91. Акинф.! Тамъ-же, перевалъ Штулу. VII.00. Десулавн! — **A. O.** Ишавія, Лашари-Джварн. Байернъ! Хевсурия. Гуро. 3. VII. 76. Радде! Хевсурия, субальп. луга въ Шатильскомъ ущельѣ. 8. VII. 03. Бушъ! Хевсурия, Чимгинское ущелье, субальп. поясъ. 5. VII. 03. Бушъ! Дагестанъ, Самурск. окр. близъ сел. Гедымъ, на каменистыхъ осыпяхъ. 7000'. 16. VIII. 00. Алекс.! Елисаветпольск. губ., Нухинск. у., истоки р. Дашагиль-чай, на каменистыхъ мѣстахъ выше границы лѣса. 7400'. 14. VIII. 00. Алекс.! Дагестанъ, между Тинды и Акнада, 5160', Богосскія горы. 7. VII. 61. Рупр.! — **S. lb.** Иберія, Вильгельмсъ! Бакинской губер. Шемахинскій у. близъ сел. Мюджи, на южныхъ склонахъ, известняки. 4000'. 30. VII. 00. Алекс.! Бакинск. губ. Шемахинск. у., на скалахъ горы Ниятъ выше сел. Царнова, 5600'. 31. VII. 00. Алекс.!

***f. glabra** D C. calyce hirsuto caulibus et foliis glabris. 24. v. s. in h. P.

Syn. *C. sarmatica* β. *glabra* A. D. C. l. cit. — D C. Prodr. VII. p. 464. — Ledeb. II. p. 878. — *C. sarmatica* var. *glabra* Trautv. in A. H. P. VI. p. 67.

Hab. in rupibus Caucasi centr. et septentr. prov. Kuban. — **S. K.** Кубанск. обл., Куржунъ, по Оштену. 29. VI. 88. Кузнецовъ! — **S. T.** Предгорья Сѣверн. Кавказа на известковыхъ скалахъ у р. Кичъ-Малка. 1. VII. 29. К. А. Мейеръ! Ледникъ Безенги. 5500'. 26. VII. 92. Акинф.! Осетія (Мадаев. пол.). 14. VI. 95. Марков.! Алагирское ущелье за Нахасомъ. 9. VI. 95. Марков.! — **A. M.** Балкарія, Хуламъ-вцекъ, скалистый хребетъ. 9000'—10000'. 27. VII. 93. Акинф.!

***var. gracilis** m. caulibus tenuioribus gracilibus elongatis ramosis vel simplicibus, pedicellis longis, foliis radicalibus plus minus parvis oblongis basi cordatis. 24. v. s. in h. J. P. A.

Hab. in rupibus regionis silvaticae Caucasi centralis et septentr. ad W. versus. — **S. K.** Кубанская обл. Учкуланъ, каменист. мѣста по склонамъ. 5000'. VII.00. Десулавн! Кубанск. обл. Карачай. 21. V. 84. Сипягинъ! Теберда. 1500 m. 31. VIII. fr. Сомм. Лев. — **S. T.** Терск. обл. 8. VI. 94. Б. Федченко! Терск. обл. у р. Баксана, на скалахъ известковыхъ. 3000'. 15. VII. 96. Алекс.! — **A. M.** Бермамутъ. 8300'. 21. VII. 89. Акинф.!

***f. ramosissima** (Somm. et Lev.) m. caulibus gracilibus a basi ramosissimis, pedicellis longis. 24. v. s. in h. P. Tm.

Hab. in rupibus prov. Kuban. — **S. K.** Между Индышъ и крѣпостью Хумара. 14. IX. 90. fl. fr. Соммъ и Левъ!

***var. calcarea** Alb. racemis spiciformibus densissimis, axillis saepe 2—3-floris, floribus *albis sessilibus vel breviter pedunculatis*. 24. v. s. in h. P. Th.

Hab. in Transcaucasia occid. regionis alpinae et subalpinae. — **A. W.** Гора Копеймъ, 2. IX. 94. Альбовъ! Гора Чюдзырхвъ и г. Адзитуко. Альбовъ.

Примѣч. Траутфеттеръ въ Acta Hort. Petr. VI. p. 67. различаетъ двѣ разновидности *C. sarmatica* Ker.: var. *subtomentosa* и var.

glabra. Первую онъ характеризуетъ такъ: „herba tota magis minusve tomentoso-pubescente; perianthii tubo hirsutiusculo“; вторая разновидность имъ приводится просто со словъ А. Д. С. Monogr. Camp. p. 240. Признаки, взятые Траутфеттеромъ для своей var. *subtomentosa* являются собственно признаками типичной *C. sarmatica* Кер., у которой листья снизу никогда не бываютъ такъ густо опушены, какъ напр. у *C. alliariaefolia* Willd. Въ гербаріѣ Траутфеттера у экземпляровъ съ обозначеніемъ „var. subtomentosa“ вездѣ можно было бы сказать — tubo calycino albo-hirsuto, а не „hirsutiusculo“. Alph. D. C. въ своей монографіи говорить, что *β. glabra* имѣетъ часто и чашечку голую, между тѣмъ у всѣхъ просмотренныхъ мною экземпляровъ съ голыми стеблями и листьями чашечка всегда болѣе или менѣе густо опушена жесткими волосками. То-же самое подтверждаетъ и Рупрехтъ, см. l. cit. p. 195. отд. отр.

Описанная Феегомъ въ „Journal of Botany“ *C. Brotherorum*, экземпляры которой я видѣлъ въ гербаріѣ Musei Fennici изъ Гельсингфорса и гербаріѣ Академіи Наукъ (№ 592. коллекціи Бротеруса), есть типичная *C. sarmatica* Кер. и нѣтъ рѣшительно ни одного признака, благодаря которому эта форма могла бы считаться уклоняющеюся отъ типа. Въ отношеніи вѣтвления и длины цвѣтоножекъ *C. sarmatica* Кер. чрезвычайно варьируетъ. Это варьированье наблюдается не только на экземплярахъ съ одного и того-же мѣстонахожденія, но часто на одномъ и томъ-же экземпляръ. Изучивъ все, имѣвшееся у меня подъ рукою, экземпляры этого вида, я пришелъ къ убѣжденію, что у *C. sarmatica* Кер. можно установить только два варьетета: var. *gracilis* M. и var. *calcareae* Alb. Первая встрѣчается въ западной части Центрального Кавказа, вторая же разновидность была найдена Альбовымъ только въ Абхази. Къ var. *gracilis* M. я причисляю и var. *ramosissima* Som m. et Lev., вѣтвленіе которой есть только частный случай. Сюда-же, повидимому, слѣдуетъ отнести и f. *tennicaulis* Som m. et Lev. Var. *gracilis* M. представляетъ какъ бы переходную форму между *C. sarmatica* Кер. и *C. collina* M.B., и существенными отличіями этого варьетета отъ *C. collina* служатъ: сѣмена съ ободкомъ, полушаровидная трубка чашечки, присутствіе болѣе длинныхъ ея придатковъ и, наконецъ, весьма часто наблюдаемыя, какъ и у типичной формы, камедистыя выдѣленія на трубкѣ чашечки.

12. *C. collina* M.B. pubescens vel glabrata, caulibus e rhizomate repente ascendentibus foliosis vel nudis in racemum secundum pauciflorum abeuntibus interdum unifloris, foliis radicalibus basi cordata ovato-oblongis vel oblongo-lanceolatis petiolatis, caulinis inferioribus oblongo-lanceolatis basi-cuneatis breviter petiolatis, superioribus lanceolatis sessilibus, omnibus crenulatis vel crenulato-dentatis, floribus sat magnis pedunculatis, pedunculis solitariis strictis apice cernuis inferioribus calyce longioribus, calycis laciniis erectis lanceolatis corolla intense coerulea campanulata glabra ore barbata 3—4-*plo brevioribus*, tubo calycino breviter obconico glabro vel albo-piloso, sinibus subnudis angulatis vel brevissime appendiculatis, capsula nutante, seminibus fuscis parvis oblongis non marginatis. 4. v. v. et s. in h. A. P. J. S. M. Tm. Th.

M.B. Fl. taur.-cauc. I, p. 152; III, p. 143; Cent. plant. rar. rossic. I. t. 42. — A. D. C. Monogr. Camp. p. 272. — D. C. Prodr. VII, p. 470. — C. A. Meyer. Verzeichn. d. Pflanz. des Cauc. p. 85. — Ledeb. II, p. 884. — Eichw. Casp. cauc. p. 26. — C. Koch. Linnaea. XVII, p. 280. — Vathe. Notulae in Camp. herb. etc. Linnaea. t. 38. p. 708. — Rupr. Bull. de l'Acad. d. St. Petersb. XI, p. 195. отд. отр. — Bot. Mag. 927. (sec. Boiss.). — Boiss. III, p. 903. — Tchihatch. Asie Mineure, II, p. 398. — Trautv. in A. H. P. IV, 1. p. 165; IV, 2. p. 389; V, p. 454; VI, p. 65. — Шмальгауз. II. стр. 177. — Радде. Путеш. въ Мингрельск. альп.

стр. 216. — Вескер. Reise, p. 132. — Albow. Prodr. Fl. Colch. p. 155. — Акинф. Альп. Раст. Центр. Кавк. стр. 24. — Липск. Фл. К. стр. 377. — Somm. et Lev. in A. H. P. XVI, p. 317. — Radd. Mus. Cauc. II, p. 121. — Том. Труд. Тифл. Бот. Сада, вып. VI, кн. 2, стр. 51. — Гринев. Результ. двухъ ботан. путеш. на Кавк. стр. 126.

Syn. *C. orientalis angustifolia pumila floribus coeruleis uno versu dispositis* Tourn. (sec. A. D. C. loc. cit.). — *C. collina* M.B. varr. *ericalyx* et *leicalyx* Trautv. in A. H. P. VI, p. 65; VII, p. 478; X, p. 121.

Icon. M.B. Cent. pl. rar. rossic. I, tab. 42.

Hab. in pratis regionis subalpinae et alpinae Caucasi. 4000'—8000'.

— **S. К.** Кубанск. обл. Поляны въ хвойномъ поясъ по р. Уруштену. 24. VI. 99. Бушь! (f. tubo calyc. hirsuto). Р. Умпырь, субальп. зона. 1888. Кзнец! (tubo calyc. glabro). Верхне-Николаевская, въ балкѣ. 1. VI. 94. Сипягинъ! (tubo calyc. hirsuto). Соснов. лѣсъ по р. Улдукаму ниже впаденія Узункола. 31. VII. 97. Бушь! (tubo calyc. hirsuto). Въ верховьяхъ лѣв. истока Узункола. 1. VIII. 97. Бушь! (tubo calyc. hirsuto). Сосновый лѣсъ по р. Б. Маркѣ. 22. VIII. 97. Бушь! (tubo calyc. glabro). Долина р. Маруха, поясъ сосновыхъ лѣсовъ. 23. VIII. 97. Бушь! (tubo calyc. hirsuto). Ущелье р. Аксаута отъ устья Б. Марки вверхъ до мѣста слиянія обоихъ истоковъ, соснов. поясъ. 23. VII. 96. Бушь! (tubo calyc. glabro). Теберды. 11. VII. 90. Липск.! (tubo calyc. parce hirsuto). Карджикортъ. 5. VII. 90. Липск.! (specim. tubo calyc. parce hirsuto et hirsuto). Учкуланъ, соснов. лѣсъ. 11. VII. 89. Кзнец! (tubo calyc. hirsuto). Близъ Учкулана. VI. 00. Десулави! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). На просѣкѣ въ сосновомъ лѣсу по р. Хурзуку. 12. VII. 89. Кзнец! (tubo calyc. glabro). Ущелье Уллу-Хурзука, соснов. участки. 28. VIII. 99. Бушь! (tubo calyc. hirsuto). — **S. Т.** Терская обл. К. Кохъ. Гора Гусчаджа близъ Кисловодска. 5600'. 29. VI. 92. Акинф.! (tubo calyc. glabro). Гора Джиналь близъ Кисловодска. 4300'. 18. VII. 89. Акинф.! (specim. tubo calycino glabro et hirsuto). По р. Ольховкѣ близъ Кисловодска. 28. VI. 86. Акинф.! (tubo calyc. hirsuto, caulibus elongatis). Кисловодскъ окрестности Нарзана. М. Биб.! (tubo calyc. hirsuto). Тамъ-же. Гёффтъ! (tubo calyc. hirsuto). VII. 82. Акинф.! (tubo calyc. hirsuto, caulibus elongatis elatis). Кисловодскъ, заросли *Azalea*. 29. VI. 96. Литвиновъ! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Окрестности Кисловодска. 13. VII. 01. Шираевскій! (tubo calyc. hirsuto). На холмѣ Алырь-су близъ Урусбиева у р. Баксанъ. 6000'. 22. VII. 96. Алексѣенко! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). У р. Баксана близъ Тереккола, около 7000'. 17. VII. 96. Алекс.! (tubo calyc. glabro). Цейскій ледникъ. 1893. Флеровъ! (tubo calyc. hirsuto). Военно-Груз. дорога. Ларсѣ. 21. VI. 94. Пурингъ! (tubo calyc. hirsuto). Военно-Груз. дор., Казбекъ—Коби. 14. VII. 77. Вдовьевъ! (tubo calyc. hirsuto). Хасав-юртскій окр., Сала-тау, выше сел. Гонзагой. 6000'. 28. VI. 97. Алекс.! (tubo calyc. hirsuto). Чечня, Буртунай. 6000'. 10. VI. 94. Радде и Кёнигъ! (tubo calyc. hirsuto). — **A. W.** Кубанск. обл., верховья р. Курджипса. 24. VII. 99. Бушь! (tubo calyc. hirsuto). Луга по Оштену. 1888. Кзнец! (tubo calyc. hirsuto). Гора Фиштъ на скалахъ. 1800—1900 m. Альбовъ. Г. Адзитуко. 2200 m. 1893. Альбовъ. Кубанск. обл., верховья р. Лабы, субальп. луга. 1888. Кзнец! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Субальп. луга въ верховьяхъ р. Мары. 7. VII. 89. Кзнец!

(*tubo calyc. glabro*). Гора Ахцархва. 1888. Кзнец.! (*specim. tubo calyc. glabro et hirsuto*). Верховья р. Мзымты. VI. и VII. Альбовъ! (*tubo calyc. hirsuto*). Черкесія, на альп. лугахъ у оз. Карадывачъ у истоковъ р. Мзымты. 1. VII. 01. Гриневец.! (*tubo calyc. hirsuto*). Абхазія, альп. ковры на Бѣлорѣченскомъ перев. (Шитлибъ). 25. VII. 94. Бушъ! (*tubo calyc. hirsuto*). Кубанск. обл. альп. ковры на хребтѣ Коехоцкыкъ (между Ачешбокомъ и М. Лабой). 19. VI. 99. Бушъ! (*tubo calyc. glabro*). Альп. луга на Ачешбокъ. 17. VI. 99. Бушъ! (*tubo calyc. hirsuto*). Между г. Джугозоякомъ и переваломъ въ верховья Кыши (Черса), альп. ковры. 7. VIII. 99. Бушъ! (*specim. tubo calyc. glabro et hirsuto*). Бамбакскій хреб. 9. VIII. 99. Бушъ! (*tubo calyc. glabro*). Альпійскіе ковры въ верховьяхъ р. Бугунча между г. Маркопиджемъ и хребт. Магншо. 3. VII. 99. Бушъ! (*specim. tubo calyc. glabro et hirsuto*). Альпійск. ковры на г. Маркопиджѣ съ южной его стороны и дальше на хребтѣ, идущемъ на югъ отъ него. 3. VII. 99. Бушъ! (*specim. tubo calyc. glabro et hirsuto*). Черкесія, г. Псеашха. 28. VII. 93. Радде и Кёнигъ! (*tubo calyc. glabro*). Хребетъ Кыцырха, альп. луга. 16. VIII. 94. Альб.! (*specim. tubo calyc. glabro et hirsuto*). Абхазія г. Санчара альп. луга. VIII. 1892. Альбовъ! (*tubo calyc. glabro*). Мѣстность Ачепыджъ, известняки. 2140 м. (№254. b.). 21. IX. 94. Альбовъ! (*tubo calyc. hirsuto*). Бзыбскій хреб. скалы. 6500'. VI. 92. Альбовъ! (*tubo calyc. hirsuto*). Г. Чедымъ, альп. луга. VII. 92. Альбовъ! (*tubo calyc. hirsuto*). Тамъ-же. 7000'. 29. VII. 88. Ивановъ! (*tubo calyc. hirsuto*). Хребетъ Аданге. 1. VIII. 01. Вороновъ! (*tubo calyc. hirsuto*). Г. Чипшира, скалы. 24. VI. 02. Вороновъ! (*spec. tubo calyc. glabro et hirsuto*). Хребетъ Эрцогъ близъ исток. Чхалты. 5. VII. 02. Вороновъ! (*spec. tubo calyc. glabro et hirsuto*). Хреб. Охачкуэ, на скалахъ въ альп. обл. 1894. (№ 255). Альбовъ. Альп. ковры на хребтѣ Ахасырта. 27. VIII. 97. Бушъ! (*tubo calyc. hirsuto*). Кубанск. обл., западн. склонъ Акаут-Марухекаго хребта, альп. ковры. 22. VIII. 97. Бушъ! (*tubo calyc. glabro*). Альпійск. ковры на спускѣ съ перевала Энцикъ. 15. VIII. 97. Бушъ! (*tubo calyc. glabro*). Альп. ковры въ верховьяхъ Джугутурлу-чата, праваго притока Доута. 13. VIII. 97. Бушъ! (*specim. tubo calyc. glabro et hirsuto*). Альп. ковры и осыпи въ верховьяхъ Хотю-тау.-8. VIII. 97. Бушъ! (*specim. uniflora tubo hirsuto*). Альп. ковры въ верховьяхъ Уллу-Мурутчу, притока Теберды. 15. VII. 97. Бушъ! (*specim. tubo calyc. glabro et hirsuto*). Альп. ковры въ верховьяхъ Кичкине-кола, перваго лѣваго притока Уллукама. 6. VIII. 97. Бушъ! (*specim. tubo calyc. glabro et hirsuto*). Альп. ковры въ верховьяхъ лѣваго истока Черюкола. 5. VIII. 97. Бушъ! (*specim. uniflora tubo calyc. glabro*). Альп. ковры въ верховьяхъ праваго истока Узункола, притока Уллукама. 2. VIII. 97. Бушъ! (*f. umbrosa caulibus tenuibus unifloris tubo calyc. hirsuto*). Альп. ковры въ верховьяхъ праваго истока Джалпаккола, притока Гондарая. 23. VII. 97. Бушъ! (*specim. tubo calyc. glabro et hirsuto*). Верховья Гондарая, альп. ковры. 9. IX. 99. Бушъ! (*tubo calyc. hirsuto*). Клухорскій перевалъ, субальп. дугъ. 18. VII. 97. Бушъ! (*tubo calyc. hirsuto*). Тамъ-же. 12. VIII. 91. Медв.! (*tubo calyc. hirsuto*). Южн. склонъ. 2300 м. и 2400—2600 м. 27. и 28. VIII. 90. Соммье и Левье. Абхазія. Нахарскій пер. 2500—2900 м. 29. VIII. 90. Соммье и Левье. Тамъ-же, южн. склонъ, альп. ковры. 11. IX. 99. Бушъ! (*tubo calyc. hirsuto*). Гра-

нища Абхазіи и Сванетіи, г. Джодиссюкъ, 2500 м. 25.VIII.90. fl. Соммье и Левье. Тамъ-же. 22. VIII. 93. Медв ! (tubo calyc. hirsuto). — **А. М. Р.** Чурхуръ, недалеко отъ Эльбруса, 15. VII. 92. Липек ! (tubo calyc. hirsuto). Тебердинскій хребетъ. 2800—2900 м. 2. IX. fl. Соммье и Левье. Между Теберды и Эльбрусомъ. 7000'. 21.VII. 96. Акинф ! (tubo calyc. hirsuto) Мингрелія г. Квира. Альбовъ. Г. Чхорохцу. (№ 255. b.). 29.VII.94. Альбовъ ! (sub *C. Fondervisii* Alb., specim. tubo calyc. hirsuto). Сванетія, Бечосскій переваль. 8000'. 10. VII. 90. Акинф ! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Южный склонъ Сванетскаго хребта. 7000'. 28. VII. 90. Акинф ! (tubo calyc. hirsuto). На горѣ Тетенаръ выше сел. Чолуръ у р. Цхенисъ-цхалн. 1.VIII.90. Сомм. Левье ! (cum fl. et fruct. tubo calyc. hirsuto). Латнарскій перев., южн. и сѣв. склоны. 2000—2800 м. 3—5. VIII. 90. fl. et fruct. Соммье и Левье ! (tubo calyc. hirsuto). Хреб. Утбири. 1700—1800 м. 19. VIII. 90. Соммье и Левье. Ушкульскій ледникъ. 30. VII. 90. Акинф ! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Балкарія, перев. Гезевчикъ. 9000'. 31.VII. 93. Акинф ! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Верховья Ахсу, субальп. луга. 31. VII. 89. Кзнец ! (tubo calyc. hirsuto). Переваль Студу между Балкаріей и Дигоріей. 1.VIII. 90. Кзнец ! (tubo calyc. hirsuto). Дигорія, верховья Уруха. 6000'. 11.VII. 91. Акинф ! (tubo calyc. glabro). Дигорія, Комъ. 4. VIII. 95. Марков ! (tubo calyc. hirsuto). Ледникъ Карагомъ. 8. VII. 91. Акинф ! (tubo calyc. hirsuto). Военно-Осетин. дор. по скаламъ между Мамиссономъ и сел. Заромахъ. 8—11. VII.92. Марков ! (tubo calyc. hirsuto). Мамиссоновскій переваль. Акинф ! (tubo calyc. hirsuto). „Пріютъ“ близъ Мамиссона. 8000', по Ардону. 19. VII. 02. Акинф ! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Тамъ-же. 6000—7000'. 22. VIII. 64. Радде ! (tubo calyc. hirsuto). Истоки р. Пюна. IX. 65. Радде ! (tubo calyc. hirsuto). Тамъ-же. 22. VIII. 64. Радде ! (specim. uniflora tubo calyc. hirsuto). Осетія, горные луга Кюна. 30. VI.00. Левитскій ! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Южный склонъ горы Карца. 4. VI. 90. Кзнец ! (tubo calyc. glabro). Г. Адай-хохъ. Марковичъ ! (tubo calyc. glabro). Близъ сел. Холеть. 2. VII. 97. Марков ! (tubo calyc. glabro). Сурхъ близъ Туганова. 31.VI. Полторацкій ! (tubo calyc. hirsuto). Казбекъ, Девдоракское ущелье по склонамъ. VII. 98. Десулави ! (tubo calyc. glabro). Казбекъ. VIII. 81. Бротерусъ ! (№ 587, specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Тамъ-же. VIII. 75. Радде ! (tubo calyc. hirsuto). Крестовая гора. 1879. Смирновъ ! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Гудауръ. VIII. 75. Радде ! (tubo calyc. hirsuto). Тамъ-же. 1893. Садовникъ Тифл. Ботан. Сада. Кохъ ! (tubo calyc. glabro). 25. VII. 94. Акинф ! (tubo calyc. hirsuto). Военно-Груз. дор. Коби. М. Биб ! (tubo calyc. glabro). Гогенаккеръ ! (tubo calyc. glabro). Гудъ-гора. 6. VIII. 44. Коленати ! (tubo calyc. hirsuto). Тамъ-же. 10000'. Акинфievъ. Военно-Груз. дор. Гвелетская дача. VI. 01. Сатунинъ ! (tubo calyc. glabro). Гора Кайшауръ. М. Биб ! (tubo calyc. glabro). — **А. О.** Хевсурія, соснов. поясъ между переваломъ Велькешили и с. Шатиль, скалы. 8.VI. 03. Бушъ ! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Гуро. 1.VII.75. Радде ! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Тамъ-же. 1. VII. 76. Радде ! (tubo calyc. hirsuto). Субальп. лугъ близъ сел. Рошка. 1. VII. 03. Бушъ ! (tubo calyc. hirsuto). Тамъ-же. Байернъ ! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Альп. луга по р. Аргуну. 16. VI. 03. Се-

лежинскій! (tubo calyc. hirsuto). Тушетія. Джвари-Возелш. 13. VII. 75. Радде! (tubo calyc. hirsuto). Чонтио. 8. VII. 76. Радде! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Субальп. луга между сел. Парема и переваломъ къ г. Комитосъ-цверш. 16. VII. 03. Бушъ! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Между с. Парема и Дартло. 18. VII. 03. Бушъ! (tubo calyc. hirsuto). Субальп. луга въ верховьяхъ Перикительской Алазани. 14. VII. 03. Бушъ! (tubo calyc. hirsuto). Между с. Дикло и г. Диклосъ-мта, субальп. поясъ. 20. VII. 03. Бушъ! (tubo calyc. hirsuto). Тамъ-же. Байернъ! (tubo calyc. hirsuto). Массарскій перев. (между верховьями Кахетинской Алазани и Горы), альп. ковры. 24. VII. 03. Бушъ! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Дагестанъ, г. Мичитль. VI. 98. Оом.!! (tubo calyc. hirsuto). Богоскій хреб. Байернъ! (tubo calyc. glabro). Ахвахъ. 8000'. Байернъ! (tubo calyc. hirsuto). Казикумухскій окр., между горой Дюльти и Жокъ. въ ущельѣ Арчи. 10500'. 10. VII. 97. Алекс.! (tubo calyc. glabro). Между сел. Шотъ и Муктаръ. 5500—6500'. 8. VII. 97. Алекс.! (tubo calyc. glabro). Кахетія, гора Хочаль-дагъ. 24. VI. 98. Оом.!! (tubo calyc. hirsuto). Закатальскій окр., горы въ окрестности аула Сарыбашъ. 1. VI. 99. Оом.!! (tubo calyc. glabro). Гора Ала-гюзы выше аула Сарыбашъ. 3. VI. 99. Оом.!! (tubo calyc. glabro). Нухинскій уѣздъ Елисаветпольск. губ. Ханская гора надъ г. Нухой. 15. VI. 99. Оом.!! (specim. tubo calyc. hirsuto et glabro). Нухинск. уѣздъ, на обрывистыхъ пастбищахъ Ягаръ-сыртъ у истока р. Вандамъ-чай. 8500'. 23. VIII. 00. Алекс.! (f. uniflora tubo calyc. glabro). Подножіе хребта Лапаль. 15. VI. 85. Радде! (tubo calyc. hirsuto). Дагестанъ, Салты. 7000'. 18. VII. 94. Пурингъ! (tubo calyc. parce hirsuto). Курушъ. 1872. Фаустъ! (tubo calyc. hirsuto). Влизъ Куруша. 1874. Беккеръ! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Тамъ-же на скалахъ и осыпяхъ. 7600'. 1. VIII. 98. Алекс.! (f. pumila uniflora tubo calyc. glabro). Между Курушемъ и Кро. 1872. Беккеръ! (tubo calyc. hirsuto). Крызь. 1873. Беккеръ! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Истоки р. Самура. Арахюль. 9. VII. 85. Радде! (tubo calyc. glabro). Самурскій окр., истоки р. Гедымъ-чай на скалахъ. 8600'. 15. VIII. 00. Алекс.! (tubo calyc. glabro). На склонахъ г. Ерисеп (Ярусевъ) у сел. Гедымъ. 9800'. 18. VIII. 00. Алекс.! (tubo calyc. glabro). Влизъ сел. Гедымъ, на сѣверн. скалистыхъ лугахъ. 6900'. 17. VIII. 00. Алекс.! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Бакинск. губ., Кубинскій у., на южномъ склонѣ горы Шахъ-дагъ на влажныхъ лугахъ. 30. VII. 98. Алекс.! (tubo calyc. hirsuto). На восточномъ склонѣ г. Базаръ, на каменнистыхъ осыпяхъ Ятухъ-дере. 10300'. 27. VII. 99. Алекс.! (tubo calyc. hirsuto). Бакинск. губ., Шемахинскій у. влизъ вершины г. Дибраръ. 7250'. 25. VII. 00. Алекс.! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Шемахинск. уѣздъ, у истоковъ р. Пирзагатъ (Заратъ-чай) на холмѣ у мѣст. Авзиль (Гюлишты), альп. луга. 8000'. 3. VIII. 99. Алекс.! (tubo calyc. hirsuto). Бакинск. губ., Кубинск. у. выше сел. Судуръ. 7000'. 3. VII. 99. Алекс.! (tubo calyc. hirsuto). — X. D. Дагестанъ, аулъ Чиркаты. 1889. Кзнец.! (tubo calyc. hirsuto). Аварскій окр. влизъ сел. Гимры (Гену) на склонахъ горы Шуги-мееръ. 4000'. 24. V. 01. Алекс.! (tubo calyc. hirsuto). Темиръ-Ханъ-Шуринскій окр., на сѣвер. склонѣ г. Мадыгинъ-тау выше сел. Эрпели, на лугахъ. 5100'. 29. VI. 98. Алекс.! (tubo calyc. hirsuto). Между сел. Пшкартлы и Каранай Верхній, между кустарниками. 3900'. 21. V. 01.

Алекс.! (tubo calyc. hirsuto). Хунзахъ. Байернъ! (tubo calyc. hirsuto). Гуннбъ. 21. VI. 94. Радде и Кёнигъ! (tubo calyc. hirsuto). Близъ Гуннба. 5000—6500'. 5. VII. 97. Алекс.! (tubo calyc. hirsuto). — **S. D.-K.** Дагестанъ, Даргинскій окр., выше сел. Микиги у Левашинскаго ущелья. 4500'. 30. V. 01. Алекс.! (tubo calyc. hirsuto). Въ березнякъ близъ г. Маара, отъ сел. Акуша къ юго-западу. 6300'. 15. VII. 98. Алекс.! (tubo calyc. glabro). На затѣненныхъ скалахъ лѣса Гумра-дузъ между Акуша и Муги. 5600'. 14. VII. 98. Алекс.! (tubo calyc. hirsuto). На задерненныхъ скалахъ вершины Солухъ-дагъ. 7700'. 12. VII. 98. Алекс.! (tubo calyc. hirsuto). Близъ г. Шуну (Цила), на задерненныхъ скалахъ. 9400'. 20. VII. 98. Алекс.! (tubo calyc. hirsuto). Бакинск. губ., Кубинск. уѣздъ, на скалахъ ущелья Хандыкъ-дере у сел. Хиналугъ. 7600'. 22. VIII. 00. Алекс.! (tubo calyc. hirsuto). На лугахъ ущелья Бугунъ-дере близъ с. Хиналугъ. 9200'. 21. VIII. 00. Алекс.! (tubo calyc. hirsuto). — **S. P.** Абастуманъ. VIII. 75. Радде! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). — **S. Ib.** Иберія. Вильгельмъ! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Стивенъ! (tubo calyc. glabro). Сигнахъ (?) Лаговскій! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Хребетъ Циви-тави, вершина Самтеріо. 20. VI. 98. Том.! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). — **A. A.** Хребетъ Сомлія въ Гурін. 12. VIII. 85. Медвѣдевъ! (tubo calyc. glabro). Хребетъ Сокорне. 20. VIII. 88. Медв.! (tubo calyc. glabro). Зекарскія высоты. 27. VII. 85. Медв.! (tubo calyc. hirsuto). Аджаро-Имеретинскій хребетъ. 1893. Ардасеновъ! (tubo calyc. hirsuto). Аджарія. VI. 1885. Масальскій! (tubo calyc. glabro). Аджарія у бывшей турецкой границы. VIII. 67. Радде! (tubo calyc. hirsuto). Тамъ-же. 7. VII. 74. Радде! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Ахалыхекіи у, Тифлисской губ., у оз. Табишхури. VI. 75. Радде! (tubo calyc. hirsuto). Тамъ-же. 10. VII. 88. Акинф.! (tubo calyc. glabro). — **X. A.** Ахалыхек. у. Уравель. VII. 72. Оверинъ! (tubo calyc. glabro). Карсская обл. между сел. Урѣ и почтов. ст. Беграхатунъ, въ сосновомъ лѣсу. 15. VI. 03. Михайловскій! (tubo calyc. hirsuto). У оз. Хозашинъ близъ сел. Канарбель, въ субальп. регионѣ. 17. VI. 03. Михайловскій! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). У оз. Чалдыръ близъ сел. Джала, на скалахъ. 21. VI. 03. Михайловскій! (tubo calyc. hirsuto). Оз. Чабанъ-гель. 5. VII. 72. Оверинъ! (tubo calyc. hirsuto). Алагезъ, мѣстность Кара-дагъ. 16. VIII. Хочятовскій! (tubo calyc. glabro). Алагезъ, альп. луга. 11. VII. 00. Кзнец.! (tubo calyc. glabro). — **S. S.-K.** Близъ Манглиса. VIII. 80. Радде! (tubo calyc. glabro). Карталинскій хребетъ близъ Манглиса. 7—10. VIII. 87. Медвѣдевъ! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Ломисъ-мта. 5. VII. 88. Медв.! (tubo calyc. glabro et hirsuto). Цхра-цхара. 14. VII. 01. Мищенко! (tubo calyc. glabro). Тамъ-же. 17. VII. 87. Акинф.! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Бакуръяни близъ Боржома. 6500'. 12. VII. 88. Акинф.! [tubo calyc. glabro et hirsuto¹⁾]. Боржомъ за Ликанами. 5000'. 28. VI. 88. Акинф.! (tubo calyc. glabro). — Кавказъ. Парротъ! (tubo calyc. glabro). Адамъ! (tubo calyc. glabro). Муссинъ-Пушкинъ! (tubo calyc. glabro).

1) Экземпляръ, у котораго одинъ цвѣтокъ имѣетъ трубку чашечки совершенно голую, остальные цвѣты имѣютъ трубку волосистую. Здѣсь же встрѣчаются экземпляры, у которыхъ большая часть цвѣтовъ имѣетъ голую трубку и только у нѣкоторыхъ цвѣтовъ наблюдается трубка чашечки волосистая. Подобное явленіе у этого вида наблюдается довольно часто.

Ar. Geogr. Asia minor in Tauro Pontico.

Примѣч. Видъ полиморфный; очень варьируетъ опушеніемъ трубки чашечки, которая бываетъ, то совершенно голая, то болѣе или менѣе опушена бѣлыми, жесткими волосками. Это опушеніе варьируетъ даже на одномъ и томъ-же экземплярѣ и часто случается наблюдать, что у нѣкоторыхъ цвѣтовъ трубка чашечки болѣе или менѣе опушена, у другихъ цвѣтовъ наоборотъ она совершенно голая. Сильно варьируютъ также придатки чашечки, которые часто бываютъ такъ малы, что ихъ съ трудомъ только можно различить, или же наоборотъ они равняются почти $\frac{1}{3}$ трубки чашечки и тогда они представляются въ видѣ короткихъ зубчиковъ.

Количество цвѣтовъ на стеблѣ и величина ихъ зависятъ отъ высоты мѣстности и климатическихъ условий. Въ западной и центральной частяхъ Главнаго хребта на очень большихъ высотахъ весьма часто можно наблюдать экземпляры только съ однимъ или двумя крупными цвѣтками. Въ Дагестанѣ и Арменіи на большихъ высотахъ кромѣ уменьшенія количества цвѣтковъ на одномъ стеблѣ, часто приходится наблюдать и уменьшеніе величины ихъ. Листья варьируютъ главнымъ образомъ въ своей ширинѣ; прикорневые листья бываютъ при основаніи всегда сердцевидными, нижніе стеблевые пмѣютъ чаще основаніе усѣченное или клиновидное. На основаніи опушенія трубки чашечки Траутфеттеръ различалъ у этого вида двѣ разновидности: *ericalyx* и *leicalyx*, которыя, на мой взглядъ, въ виду варіаціи опушенія трубки чашечки у цвѣтовъ одного и того же экземпляра лучше разсматривать какъ простыя формы. У *C. collina* МВ., по моему, можно разсматривать какъ разновидность лишь одну форму — var. *abchasica* Alb., которая при густомъ опушеніи чашечки отъ всѣхъ формъ *C. collina* отличается широко-колокольчатымъ вѣнчикомъ, широко-ланцетными долями чашечки, длинными цвѣтоножками, пильчато-надрѣзными прикорневыми листьями съ длиннымъ черешкомъ, снабженнымъ притомъ маленькими дольками. Кромѣ того пластинка листьевъ и все растеніе пмѣютъ болѣе густое опушеніе. Что касается var. *Fondervisii* (Alb.) Lipsky, то ее ни въ какомъ случаѣ нельзя считать за варіететъ, такъ какъ она является только слабо развитой тѣневой формой. Самъ авторъ, описавшій раньше эту форму какъ отдѣльный видъ (См. Bull. de Herb. Boiss. t. II. p. 117.), позднѣе въ Prodr. Fl. Colch. p. 155. прямо причисляетъ ее къ простымъ формамъ *C. collina*. Указываемый Альбовымъ, какъ особое отличіе упомянутой формы — ползучій корень, является постояннымъ видовымъ признакомъ *C. collina*.

C. collina МВ. представляетъ собою видъ средній между *C. sarmatica* Ker. и *C. rapunculoides* L. Съ послѣднимъ видомъ она имѣетъ много общаго благодаря формѣ и цвѣту вѣнчика, часто почти полному отсутствію придатковъ чашечки и мелкимъ сѣменамъ безъ всякаго ободка. Съ *C. sarmatica*, въ особенности съ ея варіететомъ *gracilis* m., ее сближаетъ var. *abchasica* Alb., у которой черешки листьевъ снабжены подобными же дольками, какъ и у черешковъ *C. sarmatica*, но лишь менѣе развитыми, а большая округлость основанія трубки чашечки и ея густое опушеніе по сравненію съ типичной формой *C. collina* придаютъ var. *abchasica* Alb. большое сходство съ *C. sarmatica* var. *gracilis* m. Помимо другихъ признаковъ, отличающихъ *C. collina* и *C. sarmatica* и ихъ разновидности другъ отъ друга, весьма хорошимъ отличіемъ могутъ служить сѣмена ихъ. У *C. sarmatica* сѣмена много крупнѣе, эллиптической формы и съ широкимъ ободкомъ, тогда какъ у *C. collina* они мелкія, продолговатой формы и совершенно безъ ободка.

* var. *abchasica* Alb. plus minus pubescens grisea, foliis radicalibus ovato-oblongis basi cordatis in petiolum duplo longiorem lobulis parvis instructum attenuatis, caulinis oblongis, omnibus margine inaequaliter serrato-subincisis, calyci hirsuti laciniis late lanceolatis, corolla late campanulata triplo brevioribus, tubo calyceino basi rotundato, floribus longe pedicellatis. \mathcal{A} . v. s. in h. Th.

Albow, Camp. nov. Cauc., in Bull. de l'Herb. Boiss. t. II. (1894), p. 118; Prodr. Fl. Coleh. p. 156.

Hab. in regione subalpina Transcaucasiae occident. — A. W. Абхазія. Бзыбскій хреб., 1900—1950 м. 1893. Альбовъ!

*13. **C. calcarata** Som m. et Lev. parce pubescens vel glabrescens caulibus e rhizomate *squamato repente* ascendentibus *tenuibus* foliosis uni vel paucifloris interdum infra medium ramosis, foliis inferioribus et surculorum sterilium *ovato-cordatis* vel *oblongo-cordatis* margine duplicato crenato-dentatis longe petiolatis, caulinis oblongo-lanceolatis crenato-dentatis breviter petiolatis, superioribus diminutis sessilibus, floribus medioeribus longe pedicellatis spicam subsecundam formantibus, pedicellis bracteolatis, calycis *glaberrimi* laciniis triangulari-lanceolatis corolla coerulea campanulata duplo vel triplo brevioribus, appendicibus *subulatis deflexis extremitate curvatis* vel *hamatis* tubum calicinum excedentibus, stylo corollam subaequantе vel parum exserto, capsula nutante, seminibus minutis flavidis *non marginatis*. 24. v. s. in h. P.

Som m. et Lev. Nuov. Giorn. Bot. Ital. 1895. p. 96; in A. H. P. XVI. p. 324. — Липск. Фл. К. стр. 379.

Icon. Som m. et Lev. in A. H. P. XVI. tab. XXXII!

Hab. Ad rupes regionis silvaticae Caucasi septentrionalis. — S. K. Кубанск. обл. между Учкуланомъ и Индышъ. 3900'. 14. IX. 90. fl. fruct. Соммъ и Левъ!

Примѣч. Неполные экземпляры этого вида, которые я видѣлъ въ гербаріѣ Императорскаго Ботаническаго Сада, не даютъ полного представленія о растеніи. Низовые листья по формѣ напоминаютъ таковыя-же у *C. collina* М. В. или у *C. sarmatica* Кер. var. *gracilis* М. Черешекъ листа тошкій и длинный безъ придатковъ. Односторонняя кисть соцветія аналогична съ таковой-же у обоихъ упомянутыхъ мной видовъ. Сѣмена продолговатыя, довольно мелки и безъ ободка, какъ у *C. collina* М. В. Судя по этимъ признакамъ *C. calcarata* Som m. et Lev. ближе подходит скорѣе къ упомянутымъ мной видамъ, чѣмъ къ *C. Kolenatiana* С. А. М. и *C. Raddeana* Trautv., съ которыми сравниваютъ ее авторы.

Series IV. Scapiflorae (Boiss.).

Caules erecti humiles uniflori, capsula nutans.

Boiss. III. p. 894.

* 14. **C. ciliata** Stev. caulibus e rhizomate simplici verticali 1—2 ascendentibus unifloris, foliis radicalibus *dense rosulatis basi sessili* linearilanceolatis vel oblongo-lanceolatis obtusis vel acutiusculis *glanduloso-crenatis* retrorsum *ciliatis* utrinque glabris, caulinis minutis anguste linearibus margine *ciliatis*, calycis *glabri* laciniis et appendicibus *rigide albociliatis* illis linearilanceolatis vel linearibus hisce triangulari-ovatis tubum subexcedentibus, corolla coerulea *obconico-campanulata* glabra vel interdum ad nervos ciliata laciniis calycinis $1\frac{1}{2}$ —2-plo longiore. 24. v. s. in. h. A. P. K. J. Tm. Th.

Stev. Mem. d. soc. Nat. de Mosc. III. p. 256. — A. D. C. Monogr. Camp. p. 229. — D. C. Prodr. VII. p. 461. — М. В. Fl. taur. cauc. III. p. 147. — С. А. Мей. Verzeich. d. Pflanz. des Cauc. p. 84. — Ledeb. II. p. 876. — Rupr. Bull. d. l'Acad. d. St. Petersburg. XI. p. 174. отд. отд. — Boiss. III. p. 903. — Акипф. Раст. Центр.

Кавк. стр. 24. — Липск. Фл. К. стр. 377. — *Somm. et Lev. in A. H. P. XVI. p. 317. — Radde. Mus. Cauc. II. p. 16. (partim).*
Syn. Medium saxifragum Fisch.? (sec. A. D. C. loc. cit.). —
C. tridentata L. var. ciliata Trautv. in A. H. P. IV. 1. p. 163; IV. 2. p. 387; V. 2. p. 453; VI. p. 58; VII. p. 478; X. p. 120.

Hab. in rupibus alpinis Caucasi magni, 6000—11500'. — **S. T.** Гора Джиналь близъ Кисловодска на вершинѣ. 4300'. Акинф.! Кисловодскъ на холмахъ. VI. 1898. Десулави! Девдорахъ, каменистыя мѣста. 7000'. VI. 91. Десулави! — **A. W.** Гора Ахцархва. 1888. Кзнец.! Кубанск. обл. въ верховьяхъ р. Мары, альпійскія скалы и каменистыя осыпи. 7. VII. 88. Кзнец.! Альп. луга на г. Ачешбокъ. 17. VI. 99. Бушъ! Альп. ковры на г. Тхачъ. 16. VI. 99. Бушъ! Альп. ковры въ верховьяхъ р. Муху, притока Теберды. 24. VII. 97. Бушъ! Переваль Тебердинскій. 2800 m. 2.IX.90. fl. sicc. fr. Соммье и Левье. — **A. M.** Эльбрусъ, въ области р. Малки. 6000'—7200'. 6—8. VII. К. А. Мейеръ. Тамъ-же, Малкскій ледникъ. 14. VII. 92. Липск.! (f. grandiflora sepalis usque ad marginem corollae attingentibus). Тамъ-же. 11000'. Акинфиевъ. Эльбрусъ, скалы высокогорн. обл. 13. VII. 89. Кзнец.! (f. foliis supra pilosis). Тамъ-же. 8200—9000'. 23. VII. 89. Акинф.! Осетія. Адамъ! Вильгельмъ! Ледникъ Азау. 9500'. 19. VII. 96. Акинф.! Бермамутъ, на высотѣ 8000'. 14. VII. 01. Шираевскій! Тамъ-же, на 8500'. 28. VII. 86. Акинф.! Гора Хицанъ-хохъ на ледникъ Цити. 10000'. 26. VII. 94. Акинф.! Г. Эшкаконтъ. 7500'. 22. VII. 89. Акинф.! На старыхъ моренахъ ледника въ Царитъ-хохъ. 9. VI. 90. Кзнец.! По скаламъ въ альпійской области г. Каріу-хохъ. 6. VI. 90. Кзнец.! (corollis ad nervos ciliatis). Мампесонъ. 9500'. VII. 97. Десулави! На каменистыхъ пастбищахъ близъ сел. Холеть. 2. VII. 97. Марков.! Казбекъ. VIII. 75. Радде! Тамъ-же. VIII. 81. Бротерусъ! Лаговскій! (caulibus elongatis, sepalis longis). Тамъ-же. 8500'. 20. VII. 94. Садовникъ Тифл. Ботан. Сада. Кохъ! — **A. O.** Дагестанъ, г. Шальбузь-дагъ. 1880. Беккеръ! Курушъ. 1876. Беккеръ! Магн-дагъ. (№ 232). 1874. Беккеръ! Шахъ-дагъ. (№ 703). К. А. Мейеръ! Тамъ-же. 10000—11000'. 27. VI. 85. Радде! На вершинѣ отъ 11100—11300'. 30. VII. 98. Алекс.! Дагестанъ, Хиналугъ. Стевенъ! Аварск. окр., на задернуемыхъ скалахъ альп. региона Тала-корн. 8340—8400', часто. 2. VII. Нор. Рупрехтъ! [in herb. Tm. ¹⁾].

***var. pontica** Albow dense caespitosa, foliis lanceolatis glanduloso-dentatis margine raro rigide ciliatis. *В. v. s. in h. P. J.*

Albow. Camp. nov. Cauc. in Bull. de l'Herb. Boiss. t. II. (1894). p. 118; Prodr. Fl. Colch. p. 156.

Hab. in rupibus calcareis alpium Transcaucasiae occid. — **A. W.** Абхазія, Взыбскій хреб., ущелье Гечигвара недалеко отъ г. Чипшира. 1893. Альбовъ! Черкесія, гора Фиштъ. 2700—2750 m. 14.IX.93. Альбовъ! Тамъ-же. 8000'. 1. VII. 01. Гриневецкій! Гора Оштенъ на скалахъ. 1893. Альбовъ.

Примѣч. Видъ этотъ распространенъ по всей альпійской области Главнаго хребта, но встрѣчается обыкновенно рѣдко, попадаясь глав-

¹⁾ Radde loc. cit. указываетъ *C. ciliata* изъ Тебулоса и Шара-Аргуни, между тѣмъ въ его гербаріи изъ перваго мѣста подъ этимъ видомъ находится *C. tridentata* Schreb., а изъ втораго мѣста — *C. saxifraga* M.B.

нымъ образомъ на задерпненныхъ скалахъ въ наиболѣе высокихъ мѣстахъ альпійской зоны. Въ видѣ исключенія отъ встрѣчается на болѣе низкомъ уровнѣ только около Кисловодска и на горѣ Джипалъ. *C. ciliata* Stev. представляетъ собою весьма характерное растеніе, которое никакъ нельзя смѣшивать съ *C. tridentata* Schreb., между тѣмъ въ гербаріяхъ оба эти вида часто смѣшиваются. Общее между ними только одна форма вѣнчика, во всемъ же остальномъ наблюдается громадная разница. Чашелистики у *C. ciliata* болѣе узкіе и заостренные, между тѣмъ какъ у *C. tridentata* они шире и притуплены. Листья у *C. ciliata* по всему протяженію края городчатые или какъ у var. *pontica* зубчатые, причемъ городки или зубчики заканчиваются бѣловатой железкой; у *C. tridentata* листья имѣютъ отъ 3—5 зубчиковъ только на верхушкѣ листа, причемъ зубчики не несутъ железокъ. Много общаго и даже какъ-бы родственнаго *C. ciliata* имѣетъ съ алтайской *C. pilosa* Pall., листья которой снабжены по краю такими же зубчиками, заканчивающимися такой-же бѣловатой железкой. Кроме того какъ у этого вида, такъ и у *C. ciliata* листья и чашелистики имѣютъ по краю рѣснички.

*15. *C. Dzaaku* Alb. rhizomate repente tenui caespitosa, caudiculis tenuibus fragillimis, caulibus gracilibus filiformibus unifloris glaberrimis erectis et ascendentibus foliosis, foliis radicalibus et surculorum steriliis rigidis coriaceis dense rosulatis basi sessili lanceolatis vel oblongo-lanceolatis glaberrimis lucidis a medio distanter fere obsolete denticulatis vel subintegris margine saepe revoluta retrorsum ciliatis, caulinis sessilibus minutis bracteiformibus lanceolatis remote denticulatis, calycis glaberrimi lucidi laciniis linearibus corolla glabra e sicco violacea tubuloso-infundibuliformi 5—6-plo brevioribus, appendicibus denticuliformibus fere nullis, tubo calyceino brevi ovato-obconico, receptaculo glabro, capsula ovata. 24. v. s. in h. P. Th. Tm.

Alb. Camp. nov. Cauc. in Bull. de l'Herb. Boiss. t. II. p. 114; Prodr. Fl. Colch. p. 156. — Липск. Фл. К. стр. 378. — Radd. Mus. Cauc. II. p. 121.

Hab. in rupestribus calcareis regionis alpinae Transcaucasiae occidentalis. — А. W. Самурзаканъ, хребетъ Охачкые, 23.VII.94. Альбовъ! Мингрелія, гора Квира. 6000'. 31.VII.94 Альбовъ! Г. Мигарія и г. Джвари. Альбовъ.

Примѣч. Чрезвычайно оригинальное растеніе, кожистые, голые и блестящіе листья котораго собраны въ густыя розетки какъ при плодущихъ, такъ и при безплодныхъ побѣгахъ. Вѣнчикъ средней величины трубчато-воронковидный раздѣленъ до $\frac{1}{3}$ на овальныя доли, заканчивающіяся наверху маленькимъ остроконечіемъ. Линейныя доли чашечки въ 5—6 разъ короче вѣнчика, а придатки чашечки имѣютъ форму очень маленькихъ зубчиковъ, но часто случается, что на нѣкоторыхъ экземплярахъ они такъ малы, что ихъ трудно различить. Растеніе живетъ на известковыхъ скалахъ, гдѣ образуетъ дерновины. Нижніе, старые листья, отмирая не опадаютъ, а остаются на растеніи въ видѣ бѣлыхъ блестящихъ пластинокъ.

*16. *C. tridentata* Schreb. caulibus e rhizomate simplici vel ramoso verticali ascendentibus foliosis unifloris, foliis radicalibus rosulatis oblongo-spathulatis in petiolum sensim attenuatis margine albo-lanuginosis apice obtuso tri-rarius 5—6-crenato-denticulatis, foliis caulinis anguste linearibus margine albo-lanatis, calycis laciniis lanceolato-linearibus elongatis obtusis margine albo-lanatis, appendicibus oblongis vel ovato-oblongis obtusis, margine lana alba valde intricata dense adspersis tubum

calycinum excedentibus, corolla coerulea obconico-campanulata *glaberrima* laciniis calycinis sesqui vel duplo longiore, stylo incluso, receptaculo *glaberrimo*, seminibus compressis *incrassato-marginatis*. 2. v. v. et s. in h. A. P. S. J. K. M. Tm. Th.

Schreb. Dec. 3. t. tab. 2. (ex Linn.). — Rupr. Bull. de l'Acad. d. sc. de St. Petersb. XI. p. 176. отд. отр. — Boiss. III. p. 904. — Акинф. Раст. Центр. Кавк. стр. 24. — Липск. Фл. К. стр. 378. — Somm. et Lev. in A. H. P. XVI. p. 317. — Radde, Mus. cauc. II. p. 121. (partim).

Syn. *C. rupestris* M. B. Fl. taur.-cauc. I, p. 154; III, p. 146. — Stev. in Mem. de la soc. des Natur. d. Mosc. III. p. 256. (sec. Ledeb. Fl. ross.). — *C. Biebersteiniana* Röm. et Schult. Syst. V, p. 147. — A. D. C. Monogr. Camp. p. 227. — D. C. Prodr. VII, p. 460. — C. A. Mey. Verzeichn. d. Pflanz. des Cauc. p. 83. — C. Koch. Linnaea. XVII, p. 279. — Ledeb. II, p. 876. — *C. tridens* Rupr. loc. cit. отд. отр. p. 175. — *C. tridentata* L. Watke. Linnaea, Band 38, p. 706. (partim). — *C. tridentata* L. var. *rupestris* Trautv. in A. H. P. IV, 1, p. 163. (partim); IV, 2, p. 387. (partim); V, p. 453; VI, p. 57. (partim); X, p. 120.

Icon. Schreb. Dec. t. 3. tab. 2. — A. D. C. l. cit. tab. 10! (pessima, dissimilis).

Exsicc. Baenitz. Herb. Europ.! (Legit Brotherus in alpe Kasbek. VIII.). (sub *C. tridentata* Willd.).

Hab. in pratis regionis alpinae Caucasi magni ubique minoris 7000—11000'. — **S. K.** Кубанск. обл., альпийскіе ковры въ верховьяхъ р. Индюкоя. 23. VII. 97. Бушъ! Картджуртъ. 5. VII. 90. Липск.! Ущелье р. Уллукама. 29. V. 84. Сипягинъ! — **S. T.** Терская обл., гора Джиналъ близъ Кисловодска. 4500'. 18. VII. 89. Акинф.! Г. Гусчадка. 5600'. 29. VI. 92. Акинф.! Чечия, Форельное озеро. Байернъ! Верховья р. Харгабе-акхъ, альп. луга. 4. VI. 89. Кзнец.! Тамъ-же, ущелье. 21. VI. 92. Медв.! Ведено, альп. луга. 2. VI. 89. Кзнец.! Верховья р. Хако, альп. луга. 2. VI. 89. Кзнец.! — **X. D.** По южному склону хреб. Салатау, по дорогѣ на сѣрн. заводъ изъ аула Чиркаты. 24. V. 89. Кзнец.! Ханакойтау. 7980'. 1. VII. 61. Овернъ! Тамъ-же, южн. склонъ. 8300'. 8. VII. 61. Овер.! Тамъ-же. 8700'. 9—21. VI. 94. Радде и Кёнигъ! Между Хунзахомъ и Карата. 7900'—8400'. 2. VII. 61. Рупр.! Гунибъ. 6780'. 27. VII. 61. Рупр.! Казикумухск. окр., выше аула Арчи. 9100'—10100'. 9. VII. 97. Алекс.! — **S. D.-K.** Дагестанъ, Даргинск. окр., въ ущельѣ между с.с. Мейсша и Дійбукъ (Дижбукъ). 5400'. 11. VII. 98. Алекс.! — **A. W.** Ущелье р. Уллу-Хурзука. 23. VI. 84. Сипягинъ! Альп. ковры въ верховьяхъ р. Бу-ульгена. 17. VII. 97. Бушъ! Альп. ковры въ верховьяхъ р. Уллу-Мурутчу. 15. VII. 97. Бушъ! Между Тебердинскимъ ауломъ и сел. Аксауткинымъ, хреб. Брушъ, альп. ковры. 1. VII. 96. Бушъ! Альп. ковры въ верховьяхъ р. Мухъ, притока р. Теберды. 24. VII. 96. Бушъ! Альп. ковры на спускѣ съ перевала Эпчикъ. 15. VIII. 97. Бушъ! Альп. ковры въ верховьяхъ р. Кичкине-кола, перваго лѣваго притока р. Уллукама. 6. VIII. 97. Бушъ! Верховья р. Уллукама. 7000—8000'. 5. VII. 92. Акинф.! Альп. ковры въ верховьяхъ прав. притока р. Джалапакъ-кола. 25. VII. 97. Бушъ! Западный Кавказъ. К. А. Мейеръ! Стевень! — **A. M.** Эльбрусъ, лужайки высокогорн. области. 13. VII. 89. Кзнец.! Эльбрусъ, ледникъ Азау. 10000'. 19. VII. 96. Алекс.! Близъ Эльбруса. 10500'. 24. VII. 89. Акинф.! Малкскій ледникъ. 14. VII. 92. Акинф.!

N. Kusnezow, N. Busch, A. Fomin.

Flora caucasica critica.

Fasc. II.

Campanulaceae - A. Fomin.

Vol. 4, pt. 6.

Sig. 4-5.

Jurjew.

1905.

Тамъ-же. 14. VII. 92. Липск.! 21. VII. 98. Тимошеевъ! Ледникъ Терсколь близъ Эльбруса. 11000'. 20. VII. 96. Акинф.! Гора Бермамутъ. Терской обл. 16. VII. 92. Липск.! (f. appendicibus acutiusculis). Чурхуръ. 8000'. 15. VII. 92. Акинф.! Осетія. Кюнь. 26. VII. Полторацкій! Альп. луга близъ Мамиссона. 8—10. VII. 97. Марковичъ! Тамъ-же. 9000'. 10. VII. 97. В. Цингеръ! Мамиссонъ у истоковъ Ріона. VII. 77. Бротерусъ! Г. Мамиссонъ, выше Калаки. 8500—9000'. 7. IX. 61. Рупр.! Военно-Осетинск. дорога между Мамиссономъ и дер. Заромакъ. 8. VII. 97. Марков.! Военно-Осетинская дор. 1893. Флеровъ! Гора Адай-хохъ около Мамиссоновской караулки. 23. VII. 00. Марков.! Г. Куридурбень. 17. V. 97. Марков.! Близъ границы Дигорин 22. V. 61. Рупр.! Балкарія, Стирхохъ-вцекъ. 8000'. 28. VII. 94. Акинф.! Альп. луга горы Каріу-хохъ. 7. VI. 90. Кзнец.! Перевалъ Трусовцекъ, восточный склонъ. VII. 01. Кунницкій! Верховья р. Гизельдона 19. V. 90. Кзнец.! Гора Стули-вцекъ. 11000'. 13. VII. 91. Акинф.! Девдорацкій ледн. 27. VI. 94. Федч.! Тамъ-же. 7000'. 14. VI. 88. Акинф.! Между Гвилетской и Девдорацкой караулками. 26. VI. 94. Федчен.! Центральный Кавказъ, Гвилетская дача. 17. VI. 01. Сатунинъ! Казбекъ. 14. VIII. 44. Колепати! Тамъ-же. V. 76. Радде! VIII. 87. Бротерусъ! Тамъ-же. 1893. Садовникъ Тифл. Ботан. Сада Кохъ! 24. VI. 94. Пурингъ! Военно-Груз. дор. ст. Коби. 6500'. 15. VI. 88. Акинф.! Тамъ-же. 2. VI. 89. Липск.! Байдара. 7100'. 21. VIII. 61. Рупр.! Гора Кайшауръ. Адамъ! Крестовая гора. 5. VI. Сптовскій! — **А. О.** Буслачирскій перевалъ, альп. лужайки. 2. VII. 90. Кзнец.! Хевсурія, перевалъ Ацунта. 9000—10500'. 15. IX. 60. Рупр.! Тамъ-же, альп. ковры западнаго склона. 14. VII. 03. Бушъ! На г. Мастеишъ-мта. 8850'. 16. IX. 60. Рупр.! Между с. Рошка и Рошкинскимъ ледникомъ, альп. ковры. 2. VII. 03. Бушъ! Альп. обл. перевала Архотистави. 28. VI. 76. Радде! Тамъ-же. Байернъ! Тамъ-же, альп. ковры на южномъ склонѣ перевала. 10200'. 3. VII. 03. Бушъ! Сѣверн. склонъ перевала Татю-джвари (Велькетили). 8. VII. 03. Бушъ! Тамъ-же, сѣверн. склонъ перевала. 8. VII. 03. Бушъ! Тушетія. Гора Борбалю. 13. IX. 60. Рупр.! Тамъ-же. 15. VII. 76. Радде! Керго близъ Тебулосъ-мта. 8—15. VII. 76. Радде! Близъ Дано на горѣ Камиторъ-цверн. 9900'. 4. VIII. 61. Рупр.! Выше Циндако. 8700'. 26. VII. 61. Рупр.! Самкурисъ-цверн. 9750'. 8. VIII. 61. Рупр.! Гора Дикло. 8520'—9500'. 31. VII. 61. Рупр.! Диди-гверди. 9300—9600'. 8. VIII. 61. Рупр.! Дагестанъ. Дидойскій окр. г. Кодоръ. 8700'. 20. VIII. 60. Рупр.! Между Акнада и Ратлу, г. Ахвахъ на сѣверн. склонѣ. 9500—10000'. 13. VII. 61. Рупр.! Между Богосомъ и г. Ахвахъ. 9000'. Байернъ. Гора Бочогъ. 9800'—9900'. 15. VIII. 60. Рупр.! Г. Динди-дагъ. 9480'. 10. VII. 60. Рупр.! Телавекъ уѣздъ, Тифл. губ., гора Саба. 11000'. 8. VII. 98. Оом.!! Близъ хреб. Арчи-кала. 10800'. 19. VII. 60. Рупр.! Богоевскія горы, Тиндаль. 8. VII. 61. Рупр.! Тамъ-же, на границѣ лѣсного региона. 7800'. 10. VII. 61. Рупр.!! Между р. Джультн-чай и р. Самуромъ. 16—23. VII. 60. Рупр.! Истоки р. Самура, Гудуръ-дагъ. 9500'. 27. VII. 60. Рупр.! Г. Сарн-дагъ. 10400'. 25. VII. 60. Рупр.! Кавказскомухоко Койсеу, г. Лохо, близъ аула Чуликана. 7400'. 24. VIII. 60. Ходзько! Закатальск. окр. уроч. Акималъ. 28. V. 99. Оом.!! Г. Горнда. 29. V. 99. Оом.!! Гора Алагюзы надъ ауломъ Сарыбашъ. 12. VI. 99. Оом.!! Нухинскій у., Елисаветпольск. губ. Гора Салаватъ къ сѣверу

отъ г. Нухи. 12000'. 14. VI. 85. Радде! Г. Дамиръ-атаранъ. 26. VI. 85. Радде! Г. Даначи. 14. VI. 99. Өм.!! Самурек. окр. на сѣв. склонѣ горы Чилимъ, истоки Гедымъ-чая, у р. Дашагиль-чай. 9500'. 15. VIII. 00. Алекс.! Южный склонъ Куткашинск. перевала въ Нухинскомъ уѣздѣ, Елисаветпольск. губ. 26. VI. 85. Радде! Дагестанъ, Курушъ. 10000'. 29. VI. 85. Радде! Гора Базаръ, ущелье Ятухъ-дере. 10500—10700'. 27. VII. 99. Алекс.! Южн. Дагестанъ, на сѣв. склонѣ г. Алахунъ-дагъ. 10680'. 3. VII. 60. Ходзько! Г. Магн-дагъ. 1874. Беккеръ! Даргинскій окр., альп. луга у вершины Шуну (Цила). 9700'. 20. VII. 98. Алекс.! На лугахъ хребта Солухъ-дагъ. 7700'. 12. VII. 98. Алекс.!—А. А. Верховья р. Аджарисъ-цхали. 14. VII. 74. Радде! Гора Цхра-цхаре. 8000'. 18. VII. 87. Акинф.! Тамъ-же. 24. VII. 00. Кзнец.! Өм.!! Тамъ-же. 5. VI. 01. Мищенко! Ахалцыхск. у., гора Цхи-Джвари. VI. 75. Радде!—S. S.-K. Хребетъ Муровъ-дагъ. 11000'. 1895. Медв.!

Примѣч. *C. tridentata* Schreb. представляет собою растеніе, свойственное такъ называемымъ альпійскимъ коврамъ, т. е. лугамъ высокихъ альпійскихъ регіоновъ, гдѣ растетъ, повидимому, исключительно на дерновинахъ отъ 7000'—11000' надъ ур. моря. Никогда мнѣ это растеніе не случилось встрѣчать на голыхъ скалахъ, между тѣмъ какъ другихъ представителей группы „Scapiflorae“, въ особенности *C. Aucheri* DC. и *C. argunensis* Rurp. я всегда находилъ только на голыхъ скалахъ въ трещинахъ и никогда на альпійскихъ дерновинахъ или задерненныхъ скалахъ. Эти послѣднія формы и *C. tridentata* хорошо различаются даже издали, какъ по формѣ вѣтчика, такъ и по его окраскѣ. *Camp. tridentata* имѣетъ окраску вѣтчика, схожую съ окраской вѣтчика *C. persicifolia* L., т. е. слегка блѣкло-синеваую, а *C. Aucheri* и *C. argunensis* имѣютъ окраску вѣтчика всегда интенсивную сине-лиловую. Типичная форма *C. tridentata* Schreb. распространена преимущественно по всему Главному хребту, по встрѣчается частью и на Маломъ Кавказѣ, гдѣ уже особенно часто наблюдаются ея переходы къ var. *gracilis* m.; постѣдная и замѣняетъ типичную форму какъ въ русской Арменіи, такъ и въ Малой Азіи. Относительно вертикальнаго распространенія *C. tridentata* слѣдуетъ сказать, что въ западной части Главнаго хребта она спускается иногда ниже 7000', но въ восточной части Главнаго хребта она встрѣчается въ наиболѣе высокихъ мѣстахъ альп. области приблизительно отъ 9000'—11000' надъ ур. моря. Ниже указаннаго уровня она попадаетъ крайне рѣдко и только на обвалахъ.

*var. *barbata* m. floribus intensius coloratis, corolla ore barbata. 4. v. s. in h. P. J. S. Tm. Th.

Syn. *C. tridentata* Alb. Prodr. Fl. Colch. p. 157. (partim). — Гринев. Резулт. двухъ ботан. путешеств. стр. 126.

Hab. in regione alpina montium Transcaucasiae occidentalis (Circassia, Abchasia et Swanetia). — А. W. Альп. ковры въ верховьяхъ Курджипса. 24. VII. 99. Бушъ! Гора Оштенъ, верхняя альп. область, лужайки. 26. VI. 88. Кзнец.! Тамъ-же, альп. луга. Альбовъ. Альп. ковры на горѣ Тхачъ. 6. VII. 99. Бушъ! Г. Джугозоякъ, альп. ковры. 27. VI. 99. Бушъ! Альп. ковры на г. Ачешбокъ. 17. VI. 99. Бушъ! Альп. луга горы Ачишко. 1. VII. 01. Гринев.! Верховья р. Мзымты. 26. VI. 93. Радде! Псеашхо, переваль въ Псебай. 28. VII. 93. Радде! Альп. луга хребта Псеашхо. 14. VII. 01. Гринев.! Г. Адзитуко. 7500'. Альбовъ. Верховья р. Лабы, переваль. 28. VII. 88. Кзнец.! Г. Пешышъ, ледн. 21—22. VII. 92. Медв.! Урочище Цибишка близъ Пешыша. 17. VII. 92. Медв.! Альпійскіе ковры на хребтѣ Ахасырта. 27. VIII. 97. Бушъ! Хребетъ Кыпырха, альп. луга. 16. VIII. 94. Альб.! Г. Чипшира. 8000'. VII. Альб.! Г. Ачха, альп. луга.

Альб.! Хреб. Ріуха. 9000'. Альбовъ. Г. Чедымъ. 9300'. 89—91. Альб.! Г. Чамажкха, альп. луга. 3. VIII. 01. Вороновъ! Г. Аншира. 8300'. VIII. 92. Альб.! Ущелье праваго истока р. Черю-кола, альп. ковры. 31. VIII. 99. Бушъ! Г. Нахаръ. 9617'. VII. Альб.! Нахарскій перев., сѣверн. склонъ, альп. ковры. 21. VII. 97. Бушъ! Тамъ-же, южный склонъ, альп. ковры. 21. VII. 97. Бушъ! Западный склонъ Аксауто-Марухскаго хребта, альп. ковры. 22. VIII. 97. Бушъ! — А. М. Мингрелія, гора Гвандра. 10000'. 27. VII. 94. Альб.! Гурія, гора Сомлія, альп. луга. 1893. Альбовъ. Сванетія. VIII. 67. Байернъ! Альпы Сванетіи. 1890. Медв.! Дадіанов. Сванетія. 23. VI. 65. Радде! Тамъ-же, г. Читхаро. 25. VI. 64. Радде! Вершина г. Дадіашъ, верховья р. Цхенисъ-цхали. 23. VI. 64. Радде! Дадіановскій перевалъ. 25. VI. 90. Акинф.! Гульскій ледникъ. 9000'—10000'. 10. VII. 90. Акинф.! Бечосскій перев. 10. VI. 90. Акинф.! Латпарскій перев., междур. р. Цхенисъ-цхали и Ингуромъ, южн. склонъ альп. регіона. 4. VIII. 90. Соммье и Левье! Тамъ-же. 8796'. 8. VIII. 99. Медв.! Военно-Осетинск. дор. къ Мамиссону, по склонамъ. 8000'—10000'. VI. 97. Десеулави!

Примѣч. *C. tridentata* var. *barbata* m. распространена исключительно въ альп. области Западнаго Закавказья (Черкесія, Абхазія, Мингрелія, Гурія и Сванетія), причемъ встрѣчается преимущественно въ горахъ Понтійской области. Болѣе интенсивная окраска вѣнчика и бородасть его служатъ очень хорошими отличительными признаками этого варьетета

var. gracilis m. caulibus plus minus elongatis subnudis *gracilibus*, foliis lanceolato-spathulatis undique pubescentibus vel glabrescentibus integris et remote lanuginosis apice *tridentatis*, calycis laciniis lanceolato-linearibus obtusiusculis glabris, appendicibus anguste lanceolatis *longissime acuminatis* omnibus margine lana *rigidiuscula brevi remote obsitis*, corolla obconico-campanulata glaberrima laciniis calycinis duplo vel triplo longiore. 2. v. s. in h. A. P. J. M. Tm. Th.

Syn. *C. tridentata* L. var. *rupestris* Trautv. in A. H. P. II. p. 561—562.; IV, 1. p. 163. (partim); IV, 2 p. 387. (partim). — *C. tridentata* var. *saxifraga* Trautv. in A. H. P. II. p. 562. — *C. tridens* Rupr. var. *2. ciliata* Rupr. in Bull. de l'Acad. de Sc. d. St. Petersburg. XI. p. 175. (отд. отр.).

Exsicc. Sintenis. Iter Orientale. Armenia turcica. № 7007!

Hab. in regione alpina Armeniae rossicae atque turcicae, ubi a cl. D-re Radde anno 1874 in montibus Palantöken ad meridiem Erserum, 9000', lecta. — X. A. Гора Алагезъ. VI. 75. Радде! Тамъ-же. 25. VII. 00. Хочятовскій! Тамъ-же, альп. луга. 11. VII. 00. Кзнец.! Западный берегъ озера Гокчи. 1886. Медв.! Окрестности Гокчи, Дарачичагъ, вершина Алибека. 31. VII. Теръ-Казаровъ! Большой Аратаръ. 1854. Ходзько! Армения. Мюхтикентъ. Байернъ! Карск. обл., перевалъ Ахъ-Баба. 22. VI. 03. Михайловскій! — S. S.-K. Истоки р. Шамхора. 19. VI. 90. Радде! Гора Кашкаръ-дагъ. 22. VI. 90. Радде! Карабахъ на горѣ Кингуръ-дагъ съ востока отъ оз. Гокчи. VII. 68. Оверинъ! Карабахъ, пастбища у. оз. Кара-гель. 26. V. 90. Радде! Тамъ-же. 27. VI. 95. Ломакинъ! Гора Капуджихъ. 15. VI. 71. Радде! (Herb. Trautv. sub *C. tridentata* L. var. *saxifraga* Trautv.). Тамъ-же. 8500—12000'. 10. VII. 93. Скубницкій! 28. VI. 03. Гринев.! Г. Зіаратъ. 17. VI. 95. Ломак.! Уроч. Шихъ-юрды. Зангезурек. у., Елисаветпольск. губ. 11585'. 18. VI. 96. Медв.! Пастбища горы Кечаль-дагъ. 10000'. 26. VI. 95. Ломак.! Альп.

обл. г. Кенесъ-дагъ, 22—27. VI. 44. Коленати! Урочище Гёзель-дара, 2. VII. 71. Радде! Уроч. Айри-су, 9612'. 24. VI. 96. Медв.! Альп. регионъ близъ сел. Лишкь. 2. VII. 03. Гринев.! Альп. регионъ между сел. Нусъ-Нусъ и Бузакьянъ, 9000'. 21. VI. 03. Гринев.!

Ar. Geogr. Armenia rossica et turcica. Asia minor!

Примѣч. Эта форма, свойственная русской и турецкой Арменіи, отличается отъ типичной формы болѣе или менѣе удлинненными, тонкими стеблями, сравнительно небольшими цвѣтами, болѣе короткими долями чашечки и въ особенности формой ея придатковъ *узко-ланцетныхъ* и *сильно заостренныхъ* на концѣ. У типичной формы *C. tridentata* Schreb. придатки чашечки бывають *яйцевидные* или *яйцевидно-продолговатые* и преимущественно *тупые*. Помимо этихъ отличительныхъ признаковъ существуетъ особенно характерная разница въ опушеніи краевъ листьевъ, а въ особенности долей чашечки и ея придатковъ. У типичной формы опушеніе это *пустое длинно- и мягко-шерстистое*, состоящее изъ длинныхъ, мягкихъ, переплетающихся между собою въ войлокъ волосковъ, которые очень часто, заворачиваясь съ обѣихъ краевъ придатка чашечки, прикрываютъ его голую пластинку, вслѣдствіе чего она кажется какъ-бы войлочной. У разновидности *gracilis* m. это опушеніе *не пустое* и состоитъ изъ болѣе короткихъ, толстоватыхъ, отстоящихъ другъ отъ друга волосковъ, которые отходятъ отъ краевъ долей чашечки и ея придатковъ на подобіе рѣсницъ. Листья у var. *gracilis* m. вдвое уже чѣмъ у типичной формы, причемъ верхняя сторона пластинки бываетъ густо опушена. Это опушеніе особенно характерно у экземпляровъ изъ южной части русской Арменіи и Малой Азіи.

var. stenophylla Boiss. Folia confertiora abbreviata anguste lineari-subspathulata, caules brevissimi; forma e statione excelsa. 24. n. v.

Boiss. III. p. 904.

Syn. *C. Bithynica* D. C. Prodr. VII, p. 460.

Hab. in Olympo Armeno; monte Techdagh prope Erzerum; in summo jago Agerowdagh 12000'; Ponto Lazico supra Khabackar 8000'.

Примѣч. Эта форма, судя по описанію, есть по всей вѣроятности var. *gracilis* m. изъ наиболѣе высокихъ и сухихъ мѣстъ Малой Азіи.

*17. *C. circassica* m. caespitosa, caudiculis nudis, caulibus e rhizomate repente tenui nudo filiformibus *ascendenti-erectis* glabris unifloris, foliis radicalibus et surculorum sterilium lanceolato-spathulatis apice *dentatis* caeterum integris petiolis lamina duplo longioribus, caulinis lanceolatis breviter petiolatis apice *tridentatis*, calycis laciniis *lanceolatis acutis* corolla *campanulata* e sicco violacea glabra 4—5-plo *brevioribus*, appendicibus ovatis tubum calycinum aequantibus, stylo non exserto, receptaculo *glaberrimo*. 24. v. s. in h. J. P. Th. Tm.

Гринев. Результ. двухъ ботан. пут. на Кавк. стр. 126.

Syn. *C. saxifraga* var. *tridentata* Rupr. in Bull. de l'Acad. de Sc. de St. Petersburg. XI. 1867. отд. отд. стр. 184. — Trautv. in A. H. P. VI. p. 58. (partim). — *C. tridentata* Radd. Mus. Cauc. II. p. 121. (partim). — Alb. Prodr. Fl. Colch. p. 157. (partim). — *C. bellidifolia* Radd. Mus. Cauc. II. p. 121. (partim). — *C. saxifraga* Alb. in Prodr. Fl. Colch. p. 157. — Акинф. Раст. Центр. Кавк. стр. 24. (partim). — *C. Aucheri* Alb. Prodr. Fl. Colch. p. 157. (partim).

Hab. in alpinis Transcaucasiae occid. 8000'—10000'. — А. В. Черкесія, на альп. лугахъ горы Псеашхо. 14. VII. 01. Гринев.! Кубанск. обл., осыни альпійскаго пояса подъ Уруштенскимъ I-го разряда ледникомъ, 24

VI. 99. Бушь! (forma elatior, calycis laciniis elongatis, corolla $3\frac{1}{2}$ —4-plo brevioribus) Абхазія на скалахъ альпійскаго регіона горы Большой Кутышъ. 9. VIII. 99. Вороновъ! Истоки р. Секень. Альбовъ! (sub *C. saxifraga* M.B. см. Prodr. Fl. Colch. p. 157). Гора Хариуха (Узунколь) по скаламъ. 9500—10000'. VII. 92. Альб.! (sub *C. Auecheri* DC. см. Prodr. Fl. Colch. p. 157.). Гора Чедымъ по скаламъ. 9000'. Альбовъ! (Prodr. Fl. Colch. p. 157 sub *C. tridentata* Schreb. partim). Скалы альп. региона хребта Прыкхъ. 5. VII. 02. Вороновъ! Переваль Нахаръ, южный склонъ. 14. VIII. 65. Радде! [Radde, Mus. Cauc. p. 121. sub *C. tridentata* (partim) et sub *C. bellidifolia* partim; Rupr. l. cit. sub *C. saxifraga* var. *tridentata*.]. Тамъ-же, южн. склонъ, альпійскіе ковры. 21. VII. 97. Бушь! Тамъ-же въ Кубанской области, сѣверный склонъ перевала, альп. ковры 21. VII. 97. Бушь! — **A. М.** Сванетія, Гульскій ледникъ. 9000'. 6. VII. 90. Акинф.!

Примѣч. Видъ этотъ впервые былъ найденъ д-ромъ Радде въ Абхазіи на Нахарскомъ перевалѣ и былъ опредѣленъ Рупрехтомъ (см. Bull. de l'Acad. de Sc. de St. Petersb. XI p. 184 отд. отг.) какъ *Camp. saxifraga* M.B. var. *tridentata* Rupr.; Траутфеттеръ же послѣ отнесъ ее къ *C. tridentata* L var. *rupestris* Trautv., т. е. иначе говоря къ *C. tridentata* Schreb., между тѣмъ какъ по своимъ морфологическимъ признакамъ это растеніе не можетъ быть отнесено ни къ той, ни къ другой, а составляетъ совершенно особый видъ, хорошо отличающійся какъ отъ *C. saxifraga* M.B., такъ и отъ *C. tridentata* Schreb. Отъ первой, помимо другихъ признаковъ, *C. circassica* м. отличается *голымъ* цвѣтолкемъ, отъ второй *широкимъ*, фиолетовымъ вѣнчикомъ, *острыми ланцетными* долями чашечки съ отсутствіемъ густого войлочнаго опушенія по ихъ краямъ. Отъ обонихъ упомянутыхъ мною видовъ *C. circassica* хорошо отличается тонкимъ, ползучимъ сильно вѣтвящимся и голымъ корневищемъ, а равно и присутствіемъ внизу голыхъ, удлинненныхъ безплодныхъ отпрысковъ. У *C. tridentata* Schreb. и *C. saxifraga* M.B. корневище имѣетъ форму веретенообразную, т. е. у основанія сильно утолщено, а затѣмъ къ вершинѣ постепенно утончается и иногда развѣтвляется. Розетки листьевъ у обонихъ этихъ видовъ сидятъ плотно и непосредственно на утолщенной части корневища. Помимо всѣхъ, указанныхъ мною, признаковъ *C. tridentata* и описываемый мною видъ разнятся и субстратомъ, на которомъ живутъ. Первый представляетъ собою растеніе альпійскихъ луговъ, такъ какъ всегда растетъ только на задерненныхъ мѣстахъ, второй наоборотъ является растеніемъ голыхъ скалъ или чаще каменистыхъ осыпей.

*18. *C. anomala* m. caespitosa, rhizomate repente nodoso vestigiis petiolorum dense obsito, caulibus tenuibus elongatis flexuosis rubescentibus unifloris, foliis radicalibus lanceolato-spathulatis obtusis petiolatis vel oblongo-lanceolatis longe petiolatis margine pubescentibus a medio crenatis vel solum apice obliquo tridentatis, caulinis lanceolatis summis linearilanceolatis saepe tridentatis omnibus margine excepto villosa glabris, corolla latecampanulata e sicco violacea glabra, stylo subexserto, calycis laciniis triangulari-lanceolatis vel saepius oblongo-lanceolatis obtusiusculis corolla triplo brevioribus, appendicibus ovatis obtusis margine plus minus lanuginosis tubum calycinum excedentibus, receptaculo glaberrimo. 24. v. s. in h. A. P. J.

Гринев. Результ. двухъ бот. пут. на Кавк. 126.

Syn. *C. rupestris* Rupr. Bull. de l'Acad. de Sc. de St. Petersb. XI, p. 178 отд. отг. (sub *C. Biebersteiniana* Meyer, № 701.). — *C. Meyeriana* Rupr. l. cit. p. 178 отд. отг. (partim). — *C. Biebersteiniana* C. A. Meyer, Verzeichn. d. Pflanz. des Caucas. p. 83. (partim).

Hab. in rupestribus regionis alpinae Transcaucasiae occidentalis. — Черкесия на скалахъ горы Фиштъ. 8000'. 24. VII. 01. Гринев.! Верховья р. Уруштена, близъ перевала Псеашхо. 13. VII. 01. Гринев.! Кубанск. обл. въ верховьяхъ Гондараи. 22. VII. 97. Бушъ! Альп. ковры въ верховьяхъ р. Бу-ульгена, притока Теберды. 17. VII. 97. Бушъ! Западный Кавказъ. 3—10. VII. 29. К. А. Мейеръ! [vidi in h. Acad. Petrop. et herb. Horti Petrop. (Herb. Bayerni) „№ 701. Enumeratio Casp. Cauc.“].

Примѣч. Видъ близкій къ *C. tridentata* Schreb., отъ которой хорошо отличается широко-колокольчатымъ темно-лиловымъ вѣнчикомъ, широкимъ продолговато-ланцетными долями чашечки и въ особенности болѣе тонкимъ узловатымъ корневищемъ, покрытымъ густо остатками листовыхъ влагалищъ. Отъ *C. saxifraga* М. В., на которую походитъ habitus'омъ, хорошо отличается только цвѣтоположеніемъ. Весьма характерно для *C. anomala* м. присутствие безплодныхъ отпрысковъ, покрытыхъ снизу такими-же листовыми влагалищами какъ и корневище. Этотъ послѣдній признакъ и широкіе тупые чашелистики хорошо отличаютъ *C. anomala* м. отъ *C. circassica* м. Въ гербаріи Императорскаго Ботанич. Сада (Herb. Bayerni) описываемый видъ лежитъ подъ именемъ *C. Biebersteiniana* М. В.; экземпляры эти, очевидно, собраны К. А. Мейеромъ отъ 3—10. VII. 29. въ горахъ Западнаго Кавказа. Такіе-же точно экземпляры хранятся въ гербаріи Импер. Академіи Наукъ, гдѣ на одномъ листѣ гербарія смѣшаны двѣ различныя формы, собранныя въ разныхъ мѣстахъ Кавказа и даже въ разные годы, какъ то видно изъ приложенныхъ этикетокъ. Къ *C. anomala* м. относятся именно экземпляры, при которыхъ на этикеткѣ обозначено: „In alpinis. 3—10 July 29.“ Эти послѣдніе очевидно и собраны въ западномъ Закавказьѣ, какъ то предполагается и Рупрехтъ (см. l. cit. p. 178.). Такіе-же экземпляры *C. anomala* имѣются въ гербаріи Ледебера, принадлежащемъ Импер. Бот. Саду, съ этикеткой слѣдующаго обозначенія; „Herb. Fischer. Campanula Biebersteiniana. Enum. Casp. casp. № 701. Meyer“. Ниже находится подпись Рупрехта: „*C. Meyeriana* (R).“

*19. *C. saxifraga* M. B. caulis e rhizomate saepe crasso squamoso tenuibus unifloris, foliis radicalibus et caulinis praeter marginem crispule puberulum *glabris linearibus vel lineari-lanceolatis* a medio crenatis vel integris in petiolum *sensim attenuatis*, calycis laciniis oblongo-lanceolatis saepius obtusiusculis corolla campanulata intense caeruleo-violacea *glabra vel glabriuscula* 3—4-plo brevioribus, appendicibus triangularibus acutis tubum calycinum excedentibus, stylo incluso, receptaculo *hispid*o, seminibus stramineis complanatis anguste marginatis. 24. v. s. in h. A. P. J. K. Tm. Th.

M. B. Fl. taur.-cauc. I, p. 155; III, p. 147. — Hoffm. hort. mosq. anno 1808. n. 651 (ex M. B.). — Fisch. Cat. hort. Gorenk. anno 1812. p. 31. (sec. A. D. C. Monogr. Camp. p. 228). — Roem. et Sch. Syst. 5. p. 147 (sec. A. D. C. l. cit.). — Spreng. Syst. I, p. 732 (exl. syn. sec. A. D. C. l. cit.). — A. D. C. Monogr. Camp. p. 228. — D. C. Prodr. VII. p. 460. — C. A. Mey. Verzeichn. d. Pflanz. d. Cauc. p. 84. — Hohenacker et Höffft, pl. exsicc. — Ledeb. II, p. 876. — Rupr. Bull. de l'Acad. de Sc. de St. Petersb. XI. 1867. p. 183 отд. отт. (partim). — Ризенк. Пятигорск. Фл. стр. 31. № 830. — Boiss. III. p. 904. et suppl. p. 331 (partim). — Акинф. Раст. Центр. Кавк. стр. 24. — Шмалъг. II, стр. 179. — Липск. Фл. К. стр. 378. — Radde, Mus. Cauc. II, p. 121 (partim).

Syn. *C. triaentata* var. *saxifraga* Trautv. in A. H. P. IV. 2, p. 387; VI, p. 58. (partim). — *C. rupestris* Rupr. l. cit. p. 177 (partim). — *C. affinis* Rupr. l. cit. p. 177.

Icon. A. D. C. Monogr. tab. 10.!

Hab. in rupestribus regionis alpinae Caucasi magni 4000'—10000'. — S. Т. Бештау. VI. М. Биб.! Фишеръ! Вильгельмсъ! Тамъ-же. VI. 1773.

Гюльденштедтъ! (Corol. parce pubesc.) Гогенаккеръ! 4. VII. 43. Колонати! (specim. corolla glabra et parce pubescente). 1. VIII. 67. Оверинтъ! (cum fruct.) 1867. Беккеръ! Тамъ-же. 4500'. 2. VII. 89. Акинф.! 3000'. 2. VI. 85. Акинф.! Вершина Бештау. VI. 96. Литвиновъ! — **A. W.** Гора Адзитуко. 2200 м. Альбовъ. (?) Кубанск. обл. въ верховьяхъ Углу-Мурдучу, притока р. Теберды. 15. VII. 97. Бушъ! Кубанск. обл., Теберды. 11. VI. 90. Липскій! — **A. M.** На горахъ въ верховьяхъ р. Кассаутъ. 3. VII. 29. К. А. Мейеръ! Бермамутъ. 8500'. 28. VII. 86. Акинф.! Тамъ-же. 8000'. 16. VII. 92. Акинф.! Липскій! Эльбрусъ, Малекскій ледникъ. 14. VII. 92. Липск.! Сванетія, Ушкульскій ледн. 30. VI. 90. Акинф.! (f. petiolis elongatis). Бечосскій перев. 10. VII. 90. Акинф.! (specim. corolla parce pubescente). Балкарія, на скалахъ у ледника Рывашки. 29. VII. 93. Акинф.! Осетія, Зромакскій ледникъ. 30. VI. 91. Акинф.! Карагомскій ледн. 6000'. 8. VII. 91. Акинф.! Скалы ледника Цити. 10000'. 26. VII. 94. Акинф.! Казбекъ. VIII. 75. Радде! Военно-груз. дор. Коби. 28. VI. 94. Б. Федченко! Переваль Трусовецк., восточн. склон. VII. 01. Куницкій! Буслачирскій переваль, по скаламъ. 2. VII. 90. Кузнецовъ! — Кавказъ. Мусинъ-Пушкинъ!

Примѣч. *C. saxifraga* М В. представляетъ собою видъ очень близкій къ *C. Aucheri* DC., отъ котораго отличается главнымъ образомъ только юнымъ вѣтчикомъ, а равно и отсутствіемъ опушенія на пластинкѣ листа, исключая ея краевъ. Въ мѣстахъ своего обитанія *C. saxifraga* очень варьируетъ въ ширинѣ листьевъ, въ величинѣ чашелистиковъ и ихъ соотношеніи къ вѣтчику, а встрѣчающіеся изрѣдка экземпляры съ слегка опушеннымъ вѣтчикомъ указываютъ, что главный признакъ — отсутствіе опушенія на вѣтчикѣ также подверженъ варіаціи. Несмотря на варьированіе всѣхъ этихъ признаковъ *C. saxifraga* приходится считать за отдѣльный видъ отъ *C. Aucheri*, такъ какъ отсутствіе опушенія на вѣтчикѣ въ группахъ „Scarpiflorae“ и „Rupestres“ является очень характернымъ признакомъ при различіи видовъ. Кромѣ того *C. saxifraga* въ своемъ обитаніи занимаетъ такой-же опредѣленный районъ, какъ *C. Aucheri* DC. и *C. arguensis* Rupr. Въ общемъ всѣ эти 3 формы настолько характерны, что если бы даже ихъ пришлось считать за одинъ сборный видъ, то и тогда, не выдавши этикетки, безъ малѣйшаго колебанія можно сказать, гдѣ, т. е. въ какой части Кавказа собраны данныя экземпляры. Я однако склоненъ считать *C. saxifraga* и *C. arguensis* за виды молодые, происшедшіе отъ *C. Aucheri*, причемъ *C. arguensis* отклонилась въ своихъ морфологическихъ признакахъ дальше, чѣмъ *C. saxifraga*. Живыхъ экземпляровъ *C. saxifraga* мнѣ не удалось видѣть, а потому объ окраскѣ вѣтчика, его формѣ и прочихъ признакахъ приходится судить только по сухому матеріалу. Видъ этотъ встрѣчается въ центральной части Главнаго хребта, не заходя далеко ни на западъ, ни на востокъ. Альбовъ въ Prodr. Fl. Colch. p. 157. приводитъ эту форму для Черкесіи съ горы Адзитуко и изъ Абхазіи изъ истоковъ р. Секена. Экземпляры Альбова изъ послѣдняго мѣстонахожденія я видѣлъ и нахожу, что они ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть отнесены къ *C. saxifraga*, такъ какъ имѣютъ всѣ признаки общіе съ экземплярами Г. И. Радде съ перевала Нахаръ, Б. В. Гриневцаго съ г. Псеашко, относящимися къ особому виду — *C. circassica* m. Въ гербаріи Кіевскаго университета я видѣлъ экземпляры Акинфіева съ Гульскаго ледника въ Сванетіи, которые онъ считаетъ (см. стр. 24 „Растенія Центр. Кавказа“) за переходныя формы между *C. tridentata* и *C. saxifraga*. На самомъ дѣлѣ никакихъ переходныхъ формъ между означенными видами не существуетъ и экземпляры, которые И. Я. Акинфіевъ считаетъ за переходныя формы, относятся къ тому-же виду — *C. circassica* m.

*f. *stenophylla* m. foliis $1\frac{1}{2}$ —3 mm. latis, calycis laciniis lanceolatis corolla glaberrima 3—4-plo brevioribus. 24. v. s. in h. A. P.

Hab. in rupibus regionis alpinae Caucasi centralis. — A. M. На скалахъ въ ущельѣ р. Уллу-Хурзука. 23. VI. 84. Сиягинъ! Кубанск. обл., скалы южнаго склона праваго берега р. Хурзука. 12. VII. 89. Кузнецовъ! Верховья р. Кубани, Учкуланъ на скалахъ. 7000'. VI. 00. Десулави!

Примѣч. Эта форма отличается отъ типа очень узкими листьями и болѣе короткими чашелистиками. Корневища у нея вѣтвистыя и гораздо тоньше, чѣмъ у типичной формы.

* **var. leptorhiza** Som m. et Lev. rhizomate *tenui repente* vestigiis petiolorum *dense obsitis*, foliis radicalibus lanceolato-linearibus in *petiolum longum attenuatis*, calicis lanciniis lanceolatis corolla 2—3-plo brevioribus. 24. v. s. in b. P.

Som m. et Lev. in A. H. P. XVI. p. 318. — Липск. Фл. К. Добавленіе I, стр. 69.

Hab. in regione alpina Caucasi centralis. — A. M. Гора Эльбрусъ, западная сторона. 2800 m. 10. IX. 90. fr. Соммье и Левье. Тебердинскій хребетъ. 2800—3000 m. 2. IX. 90. fl. Соммье и Левье. Урчюя Кюкюртли. 2500—2600 m. 9. IX. 90. fr. Соммье и Левье. Сванетія, хреб. Джодисюкъ, 2500 m. 22. VIII. 90. fl. specim. pumila. Соммье и Левье. Хреб. Утбери. 1700—1800 m. 19. VIII. 90. fl. Соммье и Левье. Латпарскій перев., южный склонъ, 2200 m. fr. et 2800 m. fl. 4. VIII. 90. Соммье и Левье. Дадіановск. Сванетія, на горѣ Тетенаръ, въ наиболѣе высокихъ мѣстахъ въ альпійской области. 1. VIII. 90. fl. Сомм. и Лев.!

Примѣч. Отъ типичной формы этотъ варьететъ отличается тонкими, ползучими корневищами, густо покрытыми отмершими листовыми влагалищами и болѣе узкими листьями. У типичной формы корневище толстое, хотя и покрытое листовыми влагалищами. Листья у типичной формы съ укороченными черешками, тогда какъ у *var. leptorhiza* они съ длинными черешками. Изъ всего вышеприведеннаго матеріала мнѣ удалось видѣть въ гербаріи Императ. Ботан. Сада лишь экземпляры съ горы Тетенаръ въ Сванетіи. Просматривая гербарій Бротеруса Musei Fennici, я увидѣлъ, что экземпляры Бротеруса съ ледника Цей изъ Осетіи, опредѣленные Соммье и Левье какъ *var. leptorhiza*, представляютъ собою типичную *C. kryophila* Rupr., которая съ *var. leptorhiza* Som m. et Lev. ничего общаго не имѣетъ. На стр. 320. A. H. P. XVI. Соммье и Левье заявляютъ, что экземпляровъ Рупрехта *C. kryophila* они не видѣли. Такъ какъ *C. saxifraga* M B. представляетъ собою видъ сильно варьирующій въ своихъ признакахъ, то *var. leptorhiza* слѣдовало бы, на мой взглядъ, скорѣе считать только за простую форму (*variatio*). Къ сожалѣнію, я не видѣлъ всѣхъ экземпляровъ этого варьетета, собранныхъ Соммье и Левье въ разныхъ мѣстахъ Центрального Кавказа, а потому и не могъ ни прослѣдить, насколько устойчивы признаки этого варьетета, ни провѣрить идентичность всѣхъ этихъ экземпляровъ.

20. **C. Aucheri** DC. caulibus e rhizomate ramoso caespitoso pumilis erectis et ascendentibus foliosis foliis radicalibus *lanceolatis* vel *linearilanceolatis* in petiolum attenuatis margine *crenatis*, caulinis linearilanceolatis in petiolum brevem attenuatis, superioribus linearibus sessilibus, omnibus utrinque dense pubescentibus vel interdum margine excepto glabris, calycis pubescentis laciniis lanceolatis acutis vel acutiusculis corolla *intense violacea basi* inter laciniis calycinis *alba obconico-campanulata dense pubescente* duplo vel triplo brevioribus, appendicibus triangularibus acutis tubum calycinum excedentibus, stylo incluso, receptaculo *hirsuto*, capsula nutante, seminibus stramineis ellipsoideis complanatis marginatis. 24. v. v. et s. in h. A. P. J. M. S. Tm. Th. Fenn.

D. C. Prodr. VII, p. 460. — Bunge, Plant. Abich. p. 13. (591). — Tschischatsch. Asie Mineure, II, p. 392. — Boiss. III, p. 905. (partim). — Акинф. Раст. Центр. Кавк. стр. 24. (partim). — Alb. Prodr. Fl. Colch. p. 157. (partim). — Ломак. Флор. Карабах. стр. 57. — Липск. Фл. К. стр. 378. — Som m. Lev. in A. H. P. XVI, p. 320. — Radde, Mus. Cauc. II, p. 121. (partim). — Оом. Herb. viv. p. 51.

Syn. *C. pubiflora* Rupr. Bull. de l'Acad. de Sc. de St. Petersb. XI, p. 179 отд. отт. — *C. hygrophila* Rupr. l. cit. p. 182. — *C. fallax* Rupr. l. cit. p. 176. — *C. Szovitsiana* Rupr. in herbariis. — *C. pubiflora* var. *Szovitsiana* Rupr. in herbariis. — *C. saxifraga* var. *transcaucasica* Rupr. l. cit. p. 184. — *C. pilosa* C. Koch var. *pontica* et *C. alpingena* C. Koch (sec. Boiss. l. cit.). — *C. tridentata* var. *pubiflora* Trautv. A. H. P. VI, p. 59; IV, 2, p. 388; V, 2, p. 453. (partim).

Icon. Регель, Вѣст. Садов. (sub. *C. tridentata* L. var. *saxifraga* Trautv.)!

Hab. in rupibus regionis alpinae Caucasi minoris ubique Caucasi centralis. 6500'—9500'. — **A. W.** 1) Альп. луга на г. Фиштъ. 1893. (№ 213). Альбовъ. Абхазія, г. Узунколь. 9500'. 1891. Альбовъ. — **A. M.** Бермамутъ. 8500'. Акинфьевъ. Сванетія, уроч. Утвырь-Кираръ. 20. VIII. 93. Медв.! (f. foliis margine excepto glabris). Сѣверн. склонъ Бечосскаго перевала. 10. VII. 90. Акинф.! (f. foliis supra pubescentibus infra glabris). Хребетъ Дадіашъ 9000'—10000'. 23. VI. 67. Радде! (f. foliis margine excepto glabris). Балкарія, Гезевчикъ. 9500'. 31. VII. 93. Акинф.! (f. foliis utrinque pubescentibus). Дигорія, ледникъ Харвесь по Уруху. 8000'. 12. VII. 91. Акинф.! (f. foliis utrinque pubescentibus). Осетія, горные луга г. Кіона. 30. VII. Полторацкій! Тамъ-же. 30. VI. 00. Левитскій! (f. foliis utrinque pubescentibus). Карагомскій ледникъ. 6000'. 8. VII. 91. Акинф.! (f. foliis margine excepto glabris). Уроч. Комъ. 13. V. 95. Марков.! (f. foliis utrinque pubescentibus). На скалахъ между Мамиссономъ и сел. Заромакъ. 8—11. VII. 97. Марков.! (f. foliis margine excepto glabris). Г. Казбекъ. VIII. 75. Радде! (f. foliis margine excepto glabris). — **A. O.** Хевсурія, истоки р. Арагвы, Бло. 26. VI. 76. Радде! (f. foliis margine excepto glabris). Хреб. Архотисъ-мта, водораздѣлъ между р. Ассой и р. Арагвой, альпійскій регионъ. 28. VI. 76. Радде! (f. foliis margine excepto glabris.). Субальп. регионъ между переваломъ Архотисъ-тави и уроч. Миргва-губа. 6. VII. 03. Бушъ! (f. foliis margine excepto glabris)²⁾. Субальп. обл. по р. Аргуну. 16. VI. 03. Сележинскій! (f. foliis margine excepto glabris). Тушетія, Джвари-Возели. 13. VII. 76. Радде! (f. foliis margine excepto glabris). Скалы горы Дикло. 8820'—9240'. 31. VII. 61. Рупр.! (f. foliis margine excepto glabris)³⁾. Тамъ-же. Байернъ! Тамъ-же. 7500—7800'. 29. VII. 61. Рупр.! (f. foliis margine excepto glabris). Влизъ Дикло на горѣ Кавтари. 9720'. 2. VIII. 61. Рупр.! (f. foliis margine excepto glabris). У границы Дидойскаго окр. 9500'. 26. VII. 61. Рупр.! (f. foliis margine excepto glabris)⁴⁾. Выше сел. Паремы. 6.

1) Указываемыя здѣсь мѣстонахожденія привожу со словъ Альбова, см. Prodr. Fl. Colch. p. 157.

2) Форма, уклоняющаяся въ сторону *C. saxifraga* МВ. Вѣничкъ у нѣкоторыхъ экземпляровъ опушенъ слабо, но здѣсь же имѣются экземпляры съ густымъ опушеніемъ вѣничка.

3) Среди этихъ экземпляровъ встрѣчается форма переходная между *C. Aucheri* D. C. и *C. arguensis* Rupr. Отъ первой отличается болѣе широкимъ вѣничкомъ и болѣе широкими стеблевыми листьями. Нижние листья однако типичныя для *C. Aucheri* D. C.

4) Форма, уклоняющаяся нѣсколько въ сторону *C. arguensis* Rupr. Нижние листья болѣе широкіе съ почти округлою пластинкой, но стеблевые линейно-ланцетные.

VIII. 61. Рупр.! (f. foliis margine excepto glabris). На влажных скалахъ, омываемыхъ р. Алазанью въ лѣсн. рег. между Цокалто и Шенако. 5100'. 28. VII. Рупр.! deflor. seminibus maturis. (f. elongata umbrosa, foliis margine excepto glabris Rupr. l. cit. sub *C. hygrophila*). Диди-гверди. 9000'. 8. VIII. 61. Рупр.! (f. foliis margine excepto glabris)¹). Самкурисъ-цверн. 9700'. 8. VIII. 61. Рупр.! (f. foliis margine excepto glabris). Дагестапъ, г. Кодоръ. 8700'. 20. VIII. 60. Рупр.! (f. foliis margine excepto glabris). — **А. А.** Гурія, альп. регионъ. Нордманъ! (f. foliis margine excepto glabris). Гора Кинно. Альбовъ (п. в.) Аджаро-Имеретинскій хреб. 1893. Ардасеновъ! (f. foliis margine excepto glabris). Хребетъ Сакорне. 7000 - 9000'. 12. VIII. 85. Медв.! (f. foliis utrinque pubescentibus). Зекарскія высоты. 29. V. 76. Медв.! (f. foliis margine excepto glabris). Тамъ-же, Зекарскій переваль. 20. VI. 92. Липскіи! (f. foliis latioribus supra pubescentibus infraglabris). Хрб. Перзатъ. Байернъ! (f. foliis margine excepto glabris). Аджарія. VI. 62. Байернъ! (f. foliis utrinque pubescentibus). Истоки р. Куры у монастыря Варцы. V. 76. Радде! (f. foliis margine excepto glabris). Бывшая турецко-аджарская граница. 12. VII. 74. Радде! (f. foliis supra dense pubescentibus, infra glabris). На альп. лугахъ хребта Ханли. 23. VI. 90. Сомм. Лев.! (f. foliis utrinque pubescentibus). Шамбобель. 9. VII. 65. Радде! (f. foliis supra dense pubescentibus, infra glabris). Цхра-Цхаро. VI. Смирновъ! (f. foliis supra pubescentibus, infra glabris). Тамъ-же. 18. VII. 87. Акинф.! (f. foliis supra pubescentibus, infra glabris). Тамъ-же. 24. VII. 00. Том.! (f. foliis supra pubescentibus, infra glabris). Берегъ оз. Табичхурн. VI. 75. Радде! (f. foliis supra dense pubescentibus, infra glabris). Тамъ-же. VI. 81. Бротерусъ! (№ 595. f. foliis utrinque pubescentibus). — **S. S.-K.** Карталинскій хребетъ близъ Мангласа. 6—12. VI. 01. Том.! (f. foliis margine excepto glabris et utrinque pubescentibus). Тамъ-же. Медв.! (f. foliis utrinque pubescentibus). Сомкетія, Цалка. VII. Фриккъ! (f. foliis linearilanceolatis margine excepto glabris). Карабахъ, пастбища Лысогогорска. 3. VII. 95. Ломак.! (f. foliis linearilanceolatis utrinque dense pubescentibus). Г. Айридагъ. 12. VI. 90. Радде! (f. foliis linearilanceolatis utrinque pubescentibus). Г. Капуджихъ. 15. VI. 71. Радде! (f. foliis linearilanceolatis utrinque dense pubescentibus). Тамъ-же. 8000'. 28. VI. 03. Гринев.! (f. foliis linearilanceolatis utrinque dense pubescentibus). Г. Кёпесъ-дагъ. 27. VI. 44. Коленати! (f. foliis linearilanceolatis utrinque dense pubescentibus). Г. Заратъ. 7000'. 16. VI. 95. Ломак.! (f. foliis linearilanceolatis utrinque dense pubescentibus). Альп. регионъ г. Дамурридагъ. 2. VII. 03. Гринев.! (f. foliis linearilanceolatis utrinque dense pubescentibus). Г. Хуступъ. 8000'. 26. VII. 95. Ломак.! (f. foliis linearilanceolatis utrinque dense pubescentibus). Тамъ-же. 1892. Медв.! (f. foliis linearilanceolatis utrinque dense pubescentibus). — **Х. А.** Карсская обл., на скалахъ въ горахъ у озера Чаддырь, близъ сел. Мередисъ. 20. VI. 03. Михайловскій! (f. foliis linearilanceolatis utrinque dense pubescentibus). На скалахъ въ горахъ у озера Арпагель. 22. VI. 03. Михайловскій! (f. foliis linearilanceolatis utrinque dense pubescentibus). Кагызманскій окр., верховья р. Ахъ-чай, по скаламъ рѣдко. 6000'. 21. VI. 86. Масальскій! (f. foliis linearilanceolatis utrinque dense pubescentibus). Вершина г. Сурбъ-хачъ, по скаламъ отъ 6500'. 11—25. VII. 86. Ма-

1) Форма, приближающаяся къ *C. argunensis* Rupr.

сальскій! (f. foliis lineari-lanceolatis utrinque dense pubescentibus). Г. Алагезъ. 20. VII. 71. Радде! (f. foliis lineari-lanceolatis utrinque dense pubescentibus). Тамъ-же. 1888. Калантаръ! (f. foliis lineari-lanceolatis utrinque dense pubescentibus). 11. VII. 00. Кзнецъ! (f. foliis lineari-lanceolatis utrinque dense pubescentibus). Альпійскій регионъ на г. Али-бекъ близъ мѣст. Дарачичагъ, Эриванской губ. 7. VII. 00. Кзнецъ! (f. foliis lineari-lanceolatis utrinque dense pubescentibus). Берегъ озера Гокчи, Башкиндъ. 8000'. 7. VI. 56. Оверинъ! (f. foliis lineari-lanceolatis utrinque dense pubescentibus.) Берегъ оз. Гокчи между Семеновкой и Еленовкой. 5. VII. 00. Өомъ!! (f. foliis lineari-lanceolatis utrinque dense pubescentibus). Горы надъ с. Семеновкой близъ Гокчи. 6. VII. 00. Өомъ!! (f. foliis lineari-lanceolatis utrinque dense pubescentibus). Близъ перевала у Семеновки и отъ Семеновки до оз. Гокчи. 4. VII. 00. Кзнецъ! (f. foliis lineari-lanceolatis utrinque dense pubescentibus, caulibus. 1—5-floris). Вершина южныхъ гокчинскихъ горъ Гёзель-дара. 2. VII. 71. Радде! (f. foliis lineari-lanceolatis utrinque dense pubescentibus). Апаратъ. 12000'. Морницъ! (f. foliis lineari-lanceolatis utrinque dense pubescentibus). Тамъ-же. Бунге. Малый Апаратъ. 9—12. VIII. 71. Радде! (f. foliis lineari-lanceolatis utrinque dense pubescentibus). Тамъ-же. 10000—11000'. 20. VIII. 03. с. fruct. Гриневъ! (f. foliis lineari-lanceolatis utrinque dense pubescentibus). Большой Апаратъ, озеро Кюпгель. 8. VIII. 71. Радде! (f. foliis lineari-lanceolatis utrinque pubescentibus). Тамъ-же на камняхъ. 10000'—11000'. 18. VIII. 03. Гриневъ! (f. foliis lineari-lanceolatis utrinque pubescentibus). Армения. Шо-вичъ! (f. foliis lineari-lanceolatis utrinque dense pubescentibus in herbariis sub *C. pubiflora* var. *Szovitsiana* Rupr. et *C. Szovitsiana* Rupr.).

Ar. Geogr. Persia borealis. (sec. Boiss. l. c. p. 906).

Примъч. Boissier (Fl. Or. III.) соединяетъ подъ видомъ *C. Aucheri* D C. нѣсколько формъ, изъ которыхъ нѣкоторыя должны быть признаны за виды самостоятельные, такъ какъ имѣютъ въ морфологическихъ признакахъ значительную разницу, которая еще притомъ совпадаетъ съ различными географическими районами. Изучивъ обширный гербарный матеріалъ всѣхъ этихъ формъ по различнымъ географическимъ районамъ, я старался изучить нѣкоторыя изъ этихъ формъ и въ живомъ состояніи, культивируя ихъ въ Тифлисскомъ Ботаническомъ Саду, а также и наблюдая ихъ въ мѣстахъ произрастанія на свободѣ. Чтобы уяснить себѣ, какую изъ этихъ формъ считалъ Декандолль за *C. Aucheri*, я обратился къ владѣльцу гербарія Декандолля — М-р Casimir De Candolle въ Швейцаріи съ просьбой, прислать мнѣ гербарные образцы *C. Aucheri* D. C., по которымъ этотъ видъ былъ описанъ. Не находя возможнымъ по установившимся въ гербаріи правиламъ высылать подлинныя образцы, М-р Casimir De Candolle былъ такъ любезенъ, что прислать мнѣ фотографическій снимокъ съ подлинныхъ экземпляровъ сбора М-р Aucher (Eloy) въ 1836 г. въ Армении, а равно и другой снимокъ съ анализа этого вида, прекрасно исполненнаго покойнымъ женевскимъ ботаникомъ Henri Feer. Благодаря этому, а также и обширному матеріалу, собранному въ Карабахѣ и Армении, удалось выяснить, что типичная *C. Aucheri* D C. есть именно форма изъ Армении и Карабаха, которая по признакамъ, касающимся формы листьевъ и вѣнчика, достаточно сильно отличается отъ формы, свойственной преимущественно восточной части Главнаго хребта и названной Рупрехтомъ *C. arguensis* Rupr. Изученіе всѣхъ формъ, соединенныхъ Boissier подъ однимъ общимъ видомъ *C. Aucheri* D C. выяснило, что господствующими здѣсь являются двѣ формы съ двумя различными географическими ареалами распространенія. Одна форма съ обратно-конусовидно-колокольчатой формой вѣнчика и линейно-ланцетными листьями, постепенно суживающимися въ черешекъ, распространена преимуще-

ственно въ Арменіи и Карабахѣ и только по Аджаро-Имеретинскому хребту заходить на Главный хребетъ, гдѣ встрѣчается рѣдко и спорадически только въ его центральной части (Осетія, Хевсурія и Тшетиія). Эта форма, именно, и есть *C. Aucheri* DC. Другая форма съ широко-колокольчатымъ вѣнчикомъ, съ прикорневыми листьями, у которыхъ пластинка овальная или округлая, сразу переходящая въ тонкій или иногда немного крылатый черешекъ, а стеблевые листья подобной-же формы или лопатчатые, распространена въ восточной части Главнаго хребта, попадаясь въ западной и центральной частяхъ Главнаго хребта крайне рѣдко и спорадически. Эта послѣдняя форма и представляетъ собою *C. argunensis* Rupr.

За неимѣніемъ большого гербарнаго матеріала изъ Арменіи и Карабаха, а также не зная, въ какихъ предѣлахъ варьируютъ признаки въ каждой изъ упомянутыхъ мною формъ, Рупрехтъ, несмотря на то, что былъ очень тонкимъ наблюдателемъ, впасть въ крайность и съ одной стороны сталъ различать какъ виды простыя формы, особенность которыхъ происходила, очевидно, отъ мѣстныхъ условій роста, а съ другой стороны смѣшивалъ подъ однимъ видомъ двѣ варьирующія въ своихъ признакахъ, но различныя формы, крайнія проявленія которыхъ онъ самъ-же признавалъ за особые виды. Такъ напр. типичную форму *C. Aucheri* DC. съ пушистыми листьями онъ считалъ за *C. saxifraga* var. *transcaucasica* (l. cit. p. 184 отд. отт.) и также (*C. Szovitsiana* и *C. pubiflora* var. *Szovitsiana* in herbariis), а тотъ-же самый видъ, но съ голыми, неключая краевъ, листьями изъ Хевсуріи и Тшетиі принималъ за *C. pubiflora* (см. l. cit. p. 180). Къ этому-же послѣднему виду онъ относилъ и экземпляры *C. argunensis* изъ Дагестана, не зная, что у *C. argunensis* стеблевые листья варьируютъ отъ округлой и эллиптической до лопатчатой формы. Въ другомъ синонимѣ по Boissier — *C. Meyeriana* Rupr., какъ оказалось, смѣшались двѣ различныя формы и изъ различныхъ областей Кавказа. Въ гербаріи Академіи Наукъ и Импер. Ботан. Сада подъ этимъ видомъ Рупрехта лежатъ экземпляры изъ двухъ областей Кавказа и относятся къ двумъ различнымъ видамъ. Экземпляры, собранные К. А. Мейеромъ въ западной части Главнаго хребта 3—10 іюля 1829 года, относятся къ *C. anomala* M., другіе экземпляры съ г. Шахъ-дагъ въ восточной части Главнаго хребта, собранные К. А. Мейеромъ 30—31 іюля 1830 года, представляютъ собою высоко-альпійскую укороченную форму *C. argunensis* Rupr.

Что касается остальныхъ формъ, какъ *C. hygrophila* Rupr. и *C. fallax* Rupr., то Boissier совершенно справедливо относитъ ихъ къ синонимамъ, такъ какъ первая представляетъ собою тѣневую форму *C. Aucheri* DC. тѣсного региона изъ средней части Главнаго хребта, вторая же есть типичная *C. Aucheri* DC., но неполные экземпляры, повидимому, изъ Аджаро-Имеретинскаго хребта. Слѣдуетъ замѣтить, что формы *C. Aucheri* DC. изъ средней части Главнаго хребта (Хевсуріи и Тшетиі) отличаются обыкновенно отсутствіемъ опушенія на листьяхъ за исключеніемъ ихъ краевъ; кромѣ того вѣнчикъ бываетъ нѣсколько шире, чѣмъ у формы изъ Карабаха и Арменіи. Слѣдуетъ также, что и листья у формъ *C. Aucheri* изъ этихъ мѣстъ бываютъ ланцетные или широко-ланцетные, оттянутые въ тонкій черешекъ и такія формы какъ бы приближаются къ *C. argunensis* Rupr. Опыты, произведенные въ культурѣ надъ обоими этими видами, могли бы разъяснить въ этомъ случаѣ, считать ли упомянутыя формы за переходныя отъ одного вида къ другому или за гибриды обоихъ этихъ видовъ.

Какъ уже замѣчено мною выше (см. примѣч. къ *C. saxifraga* M.B.), *C. Aucheri* DC. является видомъ чрезвычайно близкимъ къ *C. saxifraga* M.B. и въ средней части Главнаго хребта попадаютъ формы какъ бы переходныя между *C. Aucheri* DC. и *C. saxifraga* M.B. Соединять однако оба эти вида я не рѣшаюсь: во первыхъ потому, что *C. saxifraga* M.B. мнѣ не удалось изслѣдовать въ живомъ состояніи, во вторыхъ и оттого, что *C. Aucheri* DC. образуетъ иногда многоцвѣтковые стебли, чего не приходилось наблюдать у *C. saxifraga* M.B. Такія формы съ многоцвѣтковыми стеблями были присланы мнѣ для опредѣленія въ маѣ сего 1904 года изъ сбора проф. Н. И. Кузнецова на берегу оз. Гокчи въ 1900 году. Лѣтомъ нынѣшняго года я наблюдалъ подобные же стебли съ 3—4 цвѣтками у одного изъ экземпляровъ, растущихъ на альпійской горкѣ въ Тиф-

лискомъ Ботаническомъ Саду. Растеніе это было привезено также съ берега оз. Гокчи, какъ и другіе экземпляры. Вълѣдствіе чего, можетъ быть, было бы и правильнѣе выдѣлить *C. Aucheri* D C. въ группу „*Rupestres*“ Boiss. Помимо того въ окраскѣ вѣнчика *C. Aucheri* D C. наблюдается та особенность, что основаніе вѣнчика между чашелистниками остается всегда неокрашеннымъ (бѣлымъ), благодаря чему извнутри вѣнчика получается бѣлый „глазокъ“. У *C. argunensis* Rupr. подобнаго явленія не встрѣчается. Существуетъ ли такая особенность въ окраскѣ вѣнчика у *C. saxifraga* M.B. или нѣтъ, судить по сухому матеріалу довольно трудно, такъ какъ вѣнчики у видовъ *Campanula* при засушиваніи часто свою окраску теряютъ.

C. Aucheri D C. распространена главнымъ образомъ въ Арменіи и Карабахъ и въ средней части Главнаго хребта встрѣчается изрѣдка. Въ восточной части Главнаго хребта ее замѣняетъ *C. argunensis* Rupr., которая однако спорадически понадается и въ западной части его. Къ этой послѣдней формѣ слѣдуетъ м. б. отнести и нѣкоторыя показанія *C. Aucheri* Альбовымъ изъ западной части Главнаго хребта. Такъ какъ въ гербаріяхъ Тифлиск. Ботан. Сада и Импер. Ботан. Сада не имѣется экземпляровъ *C. Aucheri* изъ коллекціи Альбова, то я, благодаря любезности завѣдывающаго Сакарскимъ питомникомъ въ Квирилахъ, В. А. Старосельскаго, могъ провѣрить только экземпляры этого вида изъ коллекціи А. А. Ломакина изъ Имеретин (см. Prodr. Fl. Colch. 157), хранящейся при Сакарскомъ питомникѣ. Эти растенія относятся не къ *C. Aucheri* D C., а къ *C. argunensis* Rupr. Мнѣ извѣстно также нахожденіе этого послѣдняго вида и въ Черкесіи изъ Псеашха, гдѣ онъ былъ собранъ Г. И. Радде и опубликованъ въ Mus. Caus. II. p. 121. подъ видомъ *C. bellidifolia* Ad am.

***var compacta** m. caespitosa, caulibus pumilis abbreviatis, foliis margine excepto glabris radicalibus et caulinis lanceolatis. 2. v. v. et s. in h. J.

Hab. На скалахъ холмовъ близъ Мцхета. 9. VI. 03. Сележинскій!

Примѣч. Отъ типичной формы отличается укороченными стеблями и черешками листьевъ, большимъ количествомъ безплодныхъ побѣговъ, покрытыхъ внизу остатками отмершихъ листьевъ и образующихъ густыя сплошныя подушки. Прикорневые листья широко-ланцетные, стеблевые ланцетные.

***21. C. argunensis** Rupr. caulibus e rhizomate crasso saepe lignoso pumilis ascendentibus foliosis, foliis radicalibus rotundis vel ovato-rotundis longe petiolatis margine serratis, caulinis similibus vel spathulatis argute serrulatis, calycis laciniis triangularibus corolla 2—3-plo brevioribus, appendicibus triangularibus acutis tubum calycinum multo excedentibus, corolla late campanulata violacea dense pubescente, stylo non exserto, receptaculo hirsuto capsula nutante hemisphaerica, seminibus ellipsoideis pallide fuscis marginatis 2. v. v. et s. in h. A. P. J. Tm. Th.

Rupr. Bull. de l'Acad. de Sc. de St. Petersburg. XI p. 181. отд. отд. —

Гриневъ. Резулт. двухъ ботан. путеш. въ 1900 и 1901 гг. стр. 52.

Syn. *C. tridentata* var. *argunensis* Trautv. in A. H. P. IV. 2, p. 388; VI. p. 59. — *C. tridentata* var. *pubiflora* Trautv. in A. H. P. V. 2. p. 457. (partim). — *C. tridentata* var. *petrophila* Trautv. in A. H. P. X. p. 120. et in herbariis Trautvetteri et Musei Caucasi (partim). — *C. Aucheri* Boiss. III. p. 905. (partim). — *C. bellidifolia* Radde, Mus. Caus. II. p. 121. (partim).

Hab. in rupestribus regionis alpinae et subalpinae Caucasi magni praecipue ad orientem versus. 5500'—11000'. — **X. D.** На малой вершинѣ Ханакой-тау. 7920'. 1. VII. 61. Оверинъ! (f. foliis utrinque dense cano-pubescentibus). Тамъ-же. 8310'. 8. VII. 61. и 8800'. 15. VII. 61. Оверинъ! (f. foliis utrinque cano-pubescentibus). Южн. склонъ Салатау, близъ сѣрнаго завода 24. V. 89. Кзнецъ! (f. foliis utrinque dense pubescentibus). На

вершинѣ Гимри, склонѣ къ Эрнели, альп. обл. 21.V. 89. Кзнец.! (f. foliis utrinque dense pubescentibus). Хунзахъ. 5500'—6000'. 29.VII. 85. Радде! (in herbario Trautvetteri sub *C. tridentata* var. *petrophila* Trautv. f. umbrosa caulibus et petiolis foliorum elongatis, foliis margine excepto glabris). Аварскій окр., близъ сел. Хергебъ (Гергебиль) на вершинѣ Зунукъ, скалы, 6100'—6300'. 28.V. 01. Алекс.! (f. foliis supra pubescentibus). Тамъ-же, вершина хребта Зуберха. 7000'. 28.V. 01. Алекс.! (f. parviflora, foliis supra pubescentibus). Гунибъ, на скалахъ, 6600'. 27.VI. 61. Рупр.! (f. foliis utrinque dense pubescentibus.). Тамъ-же на вершинѣ горы Гунибъ. 7500—7700'. 5. VII. 97. Алекс.! (f. foliis utrinque dense pubescentibus). На каменистыхъ мѣстахъ между Карата и Хуштада. 7800'. 5. VII. 61. Рупр.! (f. foliis utrinque dense pubescentibus). — **S. D.-K.** Дагестанъ, Даргинскій окр., гора Шуну (Цила), на скалахъ, 9400'. 20. VII. 98. Алекс.! (f. foliis utrinque pubescentibus). Даргинск. окр., на скалахъ южнаго склона горы Маара у сел. Акуша. 6400'. 15.VII. 98. Алекс.! (f. foliis margine excepto glabris). Акуша, Лагов.! (in herb. Trautvetteri sub *C. tridentata* var. *saxifraga* Trautv. specim. incompl. foliis caulinis margine excepto glabris). Даргинскій окр., въ трещинахъ вертикальныхъ скалъ вершины хребта Солухъ-дагъ. 7700'. 12.VII. 98. Алекс.! (f. foliis utrinque pubescentibus.). — **A. W.** Черкесія, Песашха, VII. 94. Радде и Кёнигъ! (f. foliis margine excepto glabris). Кубанская обл., альп. ковры на г. Тхачъ. 16. VI. 99. Бушъ! (f. foliis margine excepto glabris). Альп. ковры на г. Ачешбокъ. 17. VI. 99. Бушъ! (f. foliis margine excepto glabris). Имеретія, пастбища Ква-Звинеби. 18.VI. Ломакинъ! (Albow. Prodr. Fl. Colch. p. 157. sub *C. Aucheri*). (specim. foliis margine excepto glabris et supra pubescentibus infra glabris). — **A. M.** Переваль Стулу со стороны Балкаріи и Дигорин. 1.VIII. 89. Кзнец.! (f. foliis utrinque dense pubescentibus). Осетія, ледникъ Цити. \pm 10000'. 26. VII. 94. Акинф.! (f. foliis utrinque dense pubescentibus). Гора Каріухохъ, южный склонъ. 7.VI. 89. Кзнец.! (f. foliis supra pubescentibus). — **A. O.** Тушетія, Дикло. 8820'. 31.VII. 61. Рупр.! (∞ *C. Aucheri* DC. f. foliis margine excepto glabris). Пшавія близъ озера Танесъ. 9000'. 23.IX. 60. Рупр.! (c. fruct. foliis margine excepto glabris). Кахетія, Телавскій у., гора Саба. VII. 98. Оом.! (f. foliis utrinque pubescentibus, interioribus rotundo-lanceolatis, caulinis spathulatis). Чечня, по дорогѣ отъ Шатоя. Байернъ! (f. foliis utrinque dense pubescentibus). Пор. Аргуну, на известковыхъ скалахъ близъ Евдокимовскаго. 1860. Байернъ! (f. parvifolia, foliis marg. excerp. glabris). По скаламъ на горѣ Хако въ субальп. поясъ. 1. VI. 89. Кзнец.! (f. foliis marg. excerp. glabris). Формация скалъ и осыпей по южному склону, по р. Халундою. 5. VI. 89. Кзнец.! (f. foliis utrinque pubesc.). Дагестанъ, между Акнада и Ратлу, Ахвахъ. 9300'. 13. VII. 61. Рупр.! (f. foliis utrinque dense pubescentibus). Между Тинди и Акнада. 6000'. 7. VII. 61. Рупр.! (f. foliis marg. excerp. glabris). Между Тинди и Хуарши. Зейдлицъ? (п. в.) Высокогорн. Дагестанъ, истоки р. Иланъ-хеви, гора Бочогъ. 9864'—9960'. 15. VIII. 60. Рупр.! (f. foliis marg. excerp. glabris). Выше Ратлу, Ахвахъ. 8700'—9600'. 13.VII. 61. Рупр.! (f. foliis utrinque dense pubescentibus). Между Ратлу и Хиндагъ. 7680'. 15.VII. 61. Рупр.! (f. foliis marg. excerp. glabris). Тамъ-же, на высотѣ 8940'. 15.VII. 61. Рупр.! (f. foliis utrinque dense pubescentibus). Тиндаль, горы Богосскаго хребта, гора Анчабала, у ледника. 7260'—7530'. 8.VII. 61. Рупр.! (f. foliis marg.

excep. glabris, flor. et fruct. immat.). Тамъ-же, въ регионѣ алып. луговъ. 8100'. 8. VII. 61. Рупр.! (f. foliis marg. excep. glabris). Тамъ-же, на высотѣ 9960'. 10. VII. 61. Рупр.! (f. foliis marg. excep. glabris). Тамъ-же на скалахъ въ лѣсномъ регионѣ. 7800'. 10. VII. 61. Рупр.! (f. umbrosa caulibus et petiolis foliorum elongatis, foliis marg. excep. glabris). Богосъ. Байернъ! (f. foliis utrinque pubescentibus). Между Богосомъ и Ахвахомъ, 9000'. 1860. Байернъ! (calyce, corolla et foliis сапо-pubescentibus). Истоки Казикумухскаго Койсу, Дюльти-дагъ. 9. VII. 85. Радде! (in herbario Trautvetteri sub *C. tridentata* var. *petrophila* Trautv. f. foliis marg. excep. glabris). Дюльти-дагъ. 10080'. 20. VII. 60. Рупр.! (f. foliis marg. excep. glabris). Между р. Дюльти-чаемъ и р. Самуромъ, выше Куесура, на хребтѣ. 9480'—9540'. 23. VII. 60. Рупр.! (f. foliis utrinque pubescentibus). Казикумухск. окр., на холмѣ выше сел. Хелусуъ у горы Дюльти (Ганкра). 10200'—11000'. 12. VII. 97. Алекс.! (f. foliis marg. excep. glabris). Самурскій окр., у истоковъ р. Дюльти-чай. 8500'—9500'. 10. VII. 97. Алекс.! (foliis utrinque dense pubescentibus). Истоки р. Самура на хребтѣ Хутунъ, между зарослями *Rhododendron caucasicum*. 8300'. 11. VII. 97. Алекс.! (f. foliis utrinque pubescentibus). Недалеко отъ хребта Арчи-кала. 10000'—10800'. 19. VII. 60. Рупр.! (specim. foliis utrinque pubescentibus et marg. excep. glabris). Гудуръ-дагъ, истоки р. Самура. 9480'. 27. VII. 60. Рупр.! (foliis marg. excep. glabris). Истоки р. Самура, скалы у подножія горы Сари-дагъ. 7140'. 26. VII. 60. Рупр.! (f. foliis marg. excepto glabris). Истоки р. Самура, Динди-дагъ. 9000'. 10. VII. 60. и тамъ-же. 26. VII. 60. Рупр.! (f. foliis plus minus utrinque pubescentibus). Тамъ-же. 10. VII. 60. Оверинъ! (f. foliis marg. excep. glabris). Арахкуль. 9. VII. 85. Радде! (in herb. Trautvetteri sub *C. tridentata* var. *petrophila* Trautv. f. foliis marg. excep. glabris). Кахетія, г. Хоча-дагъ надъ Лагодехами, скалы въ альпійской обл. около 8000'. 16. VII. 98. О. м.!! Тамъ-же. 11. VII. 00. Гринев.! (f. foliis utrinque pubescentibus). Тамъ-же. 7. VI. 02. Ю. Млокосѣвичъ! (f. foliis utrinque pubescentibus). Дагестанъ, Салты. 15. VII. 94. Пурингъ! (f. foliis marg. excep. glabris). Закавказск. окр., гора Маалъ на скалахъ около 8000'. 1. VI. 99. О. м.!! (f. foliis utrinque pubescentibus subrotundis). На скалахъ горы Алагюзы близъ аула Сарыбашъ. 4. VI. 99. О. м.!! (f. foliis utrinque pubescentibus). Главн. хреб., между Нухой и горой Салаватъ. 11000'. 14. VI. 85. Радде! (in herbario Trautvetteri sub *C. tridentata* var. *petrophila* Trautv. f. foliis utrinque dense pubescentibus). Нухинскій у., Елисаветпольск. губ., Дашагильское ущелье, на скалахъ въ лѣсномъ регионѣ около 5500'—6000'. 15. VI. 99. О. м.!! (f. umbrosa regionis silvaticae, foliis radicalibus subrotundis longe petiolatis marg. excep. glabris). У истоковъ р. Дашагиль-чай, на скалахъ у мѣста Лакаръ Верхній. 9000'. 14. VIII. 00. Алекс.! (f. foliis marg. excep. glabris). Истоки р. Гедымъ-чая, на отвѣсныхъ скалахъ. 8600'—8800'. 15. VIII. 00. Алекс.! (f. foliis marg. excepto glabris). Тамъ-же. (f. foliis utrinque pubescentibus). На юго-западномъ склонѣ горы Ериси (Яруссуъ) близъ с. Гедымъ. 10000'. 18. VIII. 00. Алекс.! (f. foliis utrinque pubescentibus). На скалистыхъ пастбищахъ Яръ-сыртъ, у истоковъ р. Вандамъ-чай. 8700'—8900'. 23. VIII. 00. Алекс.! (f. foliis utrinque pubescentibus). На скалахъ въ лѣсномъ регионѣ у р. Ятухъ-чай (Бумъ-чай). 7100'. 28. VII. 99. Алекс.! (f. umbrosa caulibus et petiolis foliorum elongatis, foliis marg. excep. glabris). Бакинск. губ., Кубинск. у., на восточномъ

склонѣ г. Базаръ, на каменистыхъ осыпяхъ ущелья Ятухъ-дере. 10000' 27.VII. 99. Алекс.! (f. foliis marg. exsep. glabris). Курушь. Беккеръ! (f. foliis utrinque pubescentibus). Магн-дагъ. 1874. Беккеръ! (f. foliis utrinque pubescentibus). Шальбузъ-дагъ. 29.VI. 85. Радде! (in herbario Trautvetteri sub *C. tridentata* var. *petrophila* Trautv. f. foliis marg. exsep. glabris). Шахъ-дагъ, вершина Туфанъ-дагъ. 30—31.VII. 1830. К. А. Мейеръ! (f. abbreviata, foliis utrinque pubescentibus)¹⁾. Тамъ-же, въ трещинахъ известковыхъ скалъ. 11400'. 30. VII. 98. Алекс.! (f. abbreviata foliis utrinque pubescentibus). Бакинской губ., Кубинск. уѣздъ, на отвѣсныхъ скалахъ ущелья Хандикъ-дере, у сел. Хиналугъ. 7600'. 22.VIII. 00. Алекс.! (f. foliis marg. exsep. glabris). — **А. А.** Аджарія, Шавшетскій хреб. Медв.! (f. foliis utrinque pubescentibus). Скалы горы Большая Карта. 22.VI. 01. Мищенко! (f. foliis utrinque pubescentibus, appendicibus calycis saepe parvis).

Примѣч. *C. argunensis* Rupr. распространена преимущественно въ восточной части Главнаго хребта; встрѣчаясь еще кое-гдѣ въ его центральной части, она сразу убываетъ на западъ, гдѣ попадается лишь спорадически. Обиліе и типичность этого вида сильно возрастаютъ въ направленіи къ востоку и, повидимому, эту часть Главнаго хребта приходится считать за центръ ея возникновенія и распространенія. Особенно характерно, что уклоняющихся формъ отъ *C. argunensis* къ *C. Aucheri* въ Дагестанѣ и вообще на востокъ отъ Тушетин совершенно не встрѣчается. Отъ *C. Aucheri* DC. описываемый видъ хорошо отличается прикорневыми листьями округло-овальными или округлыми, стеблевыми листьями такой-же формы или лопатчатыми и, наконецъ, широко-колокольчатой формой вѣтника.

Траутфеттеръ in A. H. P. IV. 2. p. 388 и VI, p. 59., очевидно, различалъ *C. argunensis* Rupr. какъ особый варіететъ отъ *C. tridentata*, между тѣмъ въ его гербаріи всѣ формы, которыя относятся къ *C. argunensis* Rupr. опредѣлены имъ какъ *C. tridentata* L. var. *petrophila* Trautv. и помѣщаются въ особыхъ листахъ среди настоящей *C. petrophila* Rupr., которая ничего общаго съ *Camp. argunensis* не имѣетъ.

***22. *C. bellidifolia* Adam caespitosa e radice ramoso caudiculis basi squamosis, caulibus tenuibus unifloris, foliis margine excepto glabris vel parce puberulis, radicalibus longe petiolatis parvis ovato-rotundis crenato-dentatis, caulinis similibus diminutis breviter petiolatis crenulatis, calycis glabri vel glabriusculi laciniis oblongis obtusiusculis corolla campanulata violacea glabra 4—5-pla brevioribus, appendicibus lanceolatis obtusiusculis vel acutis tubum calycinum excedentibus, receptaculo hirsuto, capsula subglobosa, seminibus fuscis maturis turgidis non marginatis. 24 v. v. et s. in h. A. P. Tm. Th.**

Adam, in Weber et Mohr (1805) Beiträge I, p. 47. — Rupr. in Bull. de l'Acad. de Sc. de St. Petersb. XI. p. 181 (отд. отд.). — Boiss. III, p. 906; suppl 331. — Акинф. Раст. Центр. Кавк. стр. 25. — Шмалъг. II, стр. 179. — Albow, Prodr. Fl. Colch. p. 157. — Липск. Фл. К. стр. 378. — Radde, Mus. Cauc. II, p. 121. (partim). — Оом. Труд. Тифл. Ботан. Сада, вып. VI. стр. 51.

Syn. *C. Adami* M.B. Fl. taur-cauc. I. p. 155; 423; III. p. 148. — Stev. in Mem. de la soc. des Natur. de Mosc. III, p. 256. (sec. A. D. C. Monogr. Camp). — A. D. C. Monogr. Camp. p. 226. — D. C. Prodr. VII, p. 460. — C. A. Mey. Verzeich. d. Pflanz. des Cauc. p. 83. (partim). — Ledeb. II, p. 875. — *C. tridentata* var. *bellidifolia* Trautv. in A. H. P. IV. 2. p. 388; VI. p. 58.

Icon. M. B. Cent. pl. ross. I, t. 16. (n. v.). — A. D. C. Monogr. t. 11. f. 1!

¹⁾ Въ герб. Импер. Акад. Наукъ нѣкоторые изъ этихъ экземпляровъ наклеены вмѣстѣ съ экзempl. *C. anomala* т., которая едва-ли была собрана К. А. Мейеромъ на Шахъ-дагѣ.

Hab. in fissuris rupium Caucasi centralis. 2500'—10000'. — **S. T.** Между Владикавказомъ и Ларсомъ. 9. VII. 43. Колепати! (с. fruct.). Тамъ-же, на скалахъ. 4. VI. 95. Бушъ! Балта, известковые скалы. 3000'. 20—22. VII. 94. Акинф.! На скалахъ у Ларса. Адамъ! Тамъ-же. 1806. Стевень! 9. VII. 43. Колен.! На скалахъ у р. Терека. 2400—3600'. К. А. Мейеръ. (п. v.). На скалахъ около ст. Ларсъ. 3240'. 22. VIII. 61. (с. fruct.). Рупр.! Ларсъ. 24. V. 84. Бротерусъ! Тамъ-же. 12. VI. 88. (с. fruct.). Акинф.! 1. VI. 89. Липскій! (f. appendicibus parvis). 25. VI. 94. Федчен! 4. VI. 95. Бушъ! Между Ларсомъ и Казбекомъ. 12. VI. 77. Вдовьевъ! Между Ларсомъ и Дарьяломъ. 3240'—3840'. 4. X. 60. (с. fruct.). Рупр.! Дарьяль. 28. V. 61. Оверинъ! (f. foliis vix pubescentibus). Тамъ-же. 22. VIII. 61. Рупр.! Дарьяльское ущелье, замокъ Тамары. 4100'. 13. VI. 88. Акинф.! — **A. W.** Мингрелия, г. Чита-Гвала. 2250 m. 1893. № 333. Альбовъ (п. v.). — **A. M.** Влизъ сел. Холеть въ Осетин. 2. VII. 97. Марков.! Осетия, верховья р. Гизель-дона, по скаламъ близъ аула Джимара. 19. V. 90. Кзнец.! Военно-Груз. дор. Байернъ! Девдоракскій ледникъ. 14. VI. 88. Акинф.! Между Казбекомъ и Дарьяломъ. 28. V. 61. Оверинъ! Дарьяльское ущелье ст. Казбекъ. 1. VI. 89. Липск.! (f. grandiflora). Тамъ-же. 19. V. 01. Фом.! Казбекъ. VIII. 74. Радде! (с. fruct.). Тамъ-же. 8000'. 24. VI. 94. Пурингъ! Казбекъ. Монастырская роща. 16. VI. 01. Сатунинъ! Гвилетская дача. 17. VI. 01. Сатун.! Коби. 14. VI. 67. Оверинъ! (f. foliis marg. excepto glabris, floribus mediocribus). Тамъ-же. 14. VI. 67. Оверинъ! (f. grandiflora). Тамъ-же. 28. VI. 94. Федченко! Гудауръ. Смирновъ! — **A. O.** Хевсурія, сѣверный склонъ перевала Архотисъ-тави. 10200'. 3. VII. 03. Бушъ!

Примѣч. Этотъ видъ встрѣчается только въ центральной части Главнаго хребта, поэтому показаніе *C. Koch'a* для Арменіи (*C. Koch*, in Linnaea. XVII. p. 279. sub *C. Adami* M.B.), очевидно, ошибочно. Точно также ошибочно показаніе д-ра Г. II. Радде (см. Mus. Sauc. p. 121.) о нахожденіи *C. bellidifolia* A.d. въ Западномъ Закавказьѣ на горѣ Псеашха и Нахаръ, а въ восточной части Главнаго хребта на Ханакой-тау. Дѣло въ томъ, что растенія изъ указанныхъ мѣстополюженій были опредѣлены невѣрно. Подъ видомъ *C. bellidifolia* изъ Псеашха и Ханакой-тау въ гербаріи Радде, принадлежатъ Кавказскому Музею, хранятся экземпляры *Camf. argunensis* Rupr., а изъ Нахара — *C. circassica* m. Требуется проверка и показаніе Альбова (l. cit.) *C. bellidifolia* изъ Мингрелии, такъ какъ экземпляровъ его изъ этой мѣстности я не видѣлъ.

C. bellidifolia A.d. m. представляетъ собою видъ очень характерный, который трудно смѣшать съ какимъ-либо другимъ видомъ, хотя по формѣ листьевъ онъ и напоминаетъ отчасти *C. argunensis* Rupr., отчасти *C. kryophila* Rupr. Отъ перваго вида *C. bellidifolia* хорошо отличается продолговатой формы и туповатыми чашелистниками, отсутствіемъ опушенія на вѣтчикѣ, правильной и одинаковой формой всѣхъ листьевъ, какъ прикорневыхъ, такъ и стеблевыхъ, и наконецъ формой сѣмянъ, которыя въ зрѣломъ состояніи у *C. bellidifolia* имѣютъ форму продолговатую и безъ ободка, а не эллиптическую, какъ у *C. argunensis*. Отъ втораго вида *C. bellidifolia* отличается колокольчатой формой вѣтчика, широкими чашелистниками и присутствіемъ жестко-волосистаго опушенія на цвѣтоложѣ.

* **var. longisepala** m. calycis laciniis angustioribus subacutis corolla 3-*plo brevioribus*. 24. v. s. in h. A. P.

Hab. in fissuris rupium regionis montanae, 4000—8000', Caucasi centralis. — **A. M.** Осетія. На камняхъ, подъемъ къ сел. Дагомъ. 16. V. 97. Марковичъ! Дейкопъ. 17. VI. 98. Марков.! На скалахъ около Мамиссона. 10. VII. 97. Марков.! На скалахъ между Мамиссономъ и сел.

Заромакъ, 8—11. VII. 97. Марков.! Ларсъ. VI. 94. Федченко! Девдоракскій ледникъ. 6000'. 14. VI. 88. Акинф.! Между Гвилетской и Девдоракской караулками. 26. VI. 94. Федченко! Между Казбекомъ и Коби. 14. VI. 61. Оверинъ!

Примъч. Этотъ варьететъ, отличающійся отъ типичной формы болѣе длинными и узкими чашелистиками, встрѣчается вмѣстѣ съ формой типичной по Военно-Грузинск. дорогѣ, а также и другихъ мѣстахъ Осетии. По общему *habitus*'у онъ приближается къ *C. kryophila* Rupr., но легко отличается отъ послѣдней вдвое широкими, туповатыми чашелистиками, формой стеблевыхъ листьевъ и присутствіемъ жестковолосистаго (диска) цвѣтоложа.

*23. *C. kryophila* Rupr. *glabrescens caespitosa caudiculis vestigiis petiolorum obsitis, caulibus e rhizomate crassiusculo squamato gracilibus unifloris, foliis radicalibus et surculorum steriliu longe petiolatis, petiolis tenuioribus, lamina foliorum parva ovato-rotunda vel ovato-oblonga a medio crenato-dentata caeterum integra, caulinis lanceolatis in petiolum brevem attenuatis, calycis laciniis acutis anguste lanceolatis vel linearibus, appendicibus lanceolatis acutis tubum calycinum excedentibus, corolla anguste campanulata glabra usque ad tertiam partem fissâ laciniis calycinis 2 1/2 vel duplo longiore, receptaculo glaberrimo, capsula late ovata, seminibus fuscis oblongo-ellipticis non marginatis.* 24. v. s. in h. A. P. Mus. Fenn.

Rupr. Bull. de l'Acad. d. Sc. d. St. Pétersb. XI. p. 184. отд. отд.

Syn. *C. ardonensis* β. *kryophila* Boiss. III. p. 906. — Липск. Фл. К. стр. 378. — *C. tridentata* var. *saxifraga* Trautv. in A. H. P. VI p. 58. (partim). — *C. saxifraga* var. *leptorhiza* Som m. & Lev. in A. H. P. XVI. p. 318—319. (partim).

Hab. in rupestribus Caucasi centralis. 6000—9000'. — A. M. Осетія, ледникъ Цей. 6360—6420'. 5. IX. 61. с. fruct. Рупр.! Тамъ-же: VIII. 81. с. flor. Бротерусъ! (№ 597.) [Sommier et Levier in A. H. P. XVI. p. 318. et 319. sub *C. saxifraga* var. *leptorhiza*]. 9000'. 31. VII. 94. Акинф.! 2. VIII. 94. Акинф.! 1893. Флеровъ! Осетія. Сѹби. 24. V. 95. Марковичъ! Алагирское ущелье за сел. Визъ. 9. VI. 96. Марков.! Мамиссонъ. 8000'. „Приютъ“. 19. VII. 02. Акинф.!

Примъч. Видъ близкій къ *C. ardonensis* Rupr., отъ котораго хорошо отличается округло-овальной или овально-продолговатой до середины городчатой пластинкой листа, узко-ланцетными или линейными чашелистиками и болѣе короткими разрывами долей вѣнчика. Отъ *C. bellidifolia* Adm var. *longisepala* m., съ которой сходенъ по общему *habitus*'у, отличается совершенно голымъ цвѣтоложемъ и формой верхнихъ стеблевыхъ листьевъ. Послѣдніе у *C. kryophila* Rupr. имѣютъ линейную форму, тогда какъ у var. *longisepala* m. они такой-же формы, какъ и ея прикорневые, т. е. округло-овальные. Найденный проф. Бротерусомъ на Цейскомъ ледникѣ экземпляръ *C. kryophila* Rupr. (№ 597), Соммье и Левье неправильно отнесли къ *C. saxifraga* M.B. var. *leptorhiza* Som m. & Lev. Слѣдуетъ замѣтить, что *C. kryophila* Rupr. очень хорошо отличается отъ *C. saxifraga* M.B., какъ формой листьевъ, болѣе узкимъ вѣнчикомъ, узкими чашелистиками, такъ и въ особенности совершенно голымъ цвѣтоложемъ.

*24. *C. besenginica* Fom. *caespitosa, caudiculis vestigiis petiolorum obsitis, caulibus tenuibus elongatis erectis et ascendentibus unifloris, foliis integris supra adpresse retrorsum pilosis infra glaberrimis lucidis, radicalibus et surculorum steriliu crebris anguste lanceolatis longe petiolatis, caulinis linearibus, calycis laciniis triangulari-lanceolatis obtusiusculis extus glaberrimis lucidis intus dense albo-tomentosis corolla anguste cam-*

panulata glabra coerulea triplo brevioribus, appendicibus denticuliformibus brevissimis fere indistinctis, receptaculo glaberrimo. 24. v. s. in h. P.

Фом. Труд. Тифл. Ботан. Сада, вып. VI. кн. 2. стр. 8.

Hab. ad glaciem Besengi prov. Terek. — А. М. Терск. обл., ледникъ Безенги. 6000'. 25.VII. 92. Липск.! и Акинф.! Тамъ-же. 5000'. VII. 93. Акинф.!

Примѣч. Корневища у этого вида густо покрыты остатками листовыхъ влагалищъ. Тонкіе стебли, покрытые оттопыренными волосками, качиваются всегда однимъ цвѣткомъ. Листья узко-ланцетные, оттянутые въ длинный тонкій черешекъ; верхняя поверхность листовой пластинки покрыта загнутыми назадъ, прижатыми волосками, нижняя же поверхность пластинки наоборотъ совершенно гладкая и часто блестящая. Черешки листьевъ по краю густо покрыты мягкими оттопыренными волосками. По *habitus*у это растеніе отчасти напоминаетъ *C. ardonensis* Rupr., отъ которой хорошо отличается болѣе широкой и цѣльнокрайней листовой пластинкой, опушеніемъ листьевъ, широкими треугольно-ланцетными съ наружной стороны гладкими и со внутренней стороны густо бѣло-войлочными чашелистиками, чрезвычайно тонкими стеблями, опушеніемъ листьевъ и чашелистиковъ и наконецъ голымъ дискомъ цвѣтка. По характеру опушенія листьевъ *C. besengina* имѣетъ много общаго съ *C. Ledebouriana* Trautv., у которой листовая пластинка на верхней поверхности покрыта такими-же загнутыми назадъ и прижатыми волосками, между тѣмъ какъ нижняя ея поверхность совершенно гладкая. (См. также примѣч. Фом. l. cit.).

*25. *C. ardonensis* Rupr. *glabriuscula saepius glaberrima caespitosa, rhizomate crasso ramoso, caudiculis tenuibus vestigiis petiolorum dense obsitis, foliis radicalibus et surculorum steriliis crebris anguste linearibus margine remote serrulatis in petiolum filiformem attenuatis, caulinis angustissime linearibus, caulibus elongatis filiformibus unifloris folia radicalia vix superantibus, calycis glabri laciniis anguste linearibus fere subulatis acutissimis corolla intense coerulea glabra anguste campanulata usque ad medium fissa duplo brevioribus, appendicibus lanceolatis acuminatis tubo sublongioribus, stylo incluso, receptaculo glaberrimo, capsula haemisphaerico-conica, seminibus pallide fuscis oblongis non marginatis.* 24. v. s. in h. A. P. Tm. K.

Rupr. Bull. de l'Acad. de Sc. d. St. Pétersb. XI. p. 185. отд. отд. — Boiss. III. p. 906. — Липск. Фл. К. стр. 378. — Radde Mus. Cauc. II. p. 121.

Syn. *C. tridentata* L. var. *ardonensis* Trautv. in A. H. P. VI. p. 58.

Hab. in rupestribus graminosis Caucasi centralis. — А. М. Осетія, у р. Ардона ниже Мисурцы. 3120'. 21.V. 61. Рупрехтъ! Осетія. Лихачевъ! Осетія, Дейкопъ. 17. VI. 98. Марков.! На скалахъ у р. Архондонъ. 17. VI. 98. Марков.! Около Мамиссона на скалахъ. 10. VII. 97. Марков.! (appendicibus calycis tubo calycino multo longioribus). На скалистыхъ откосахъ ур. Замодъ. 16. V. 97. Марков.! На скалахъ въ лѣсу, Цейдонъ. 17. VII. 97. Марков.! Близъ Заромака. 16. VI. 90. Акинфѣвъ! Ардонъ. 5000'. 28. VII. 91. Акинф.! Садонъ. 17. VI. Арнольд! Сейдонъ по Ардону съ 3500'—7000'. 28. VII. 91. Акинф.! На скалахъ между Мамиссономъ и сел. Заромакъ. 11. VII. 97. Марков.!

*var. *latifolia* m. foliis radicalibus lanceolato-linearibus calycis laciniis anguste lanceolatis. 24. v. s. in h. K.

Hab. in Ossetia. — **A. M.** Осетія, Ходское ущелье, горные луга. 29. VI. 00. Левитскій!

Примѣч. Очень оригинальный видъ; прикорневые и стеблевые листья имѣютъ линейную или узко-ланцетно-линейную форму и напоминаютъ собою листь какого-либо злака, но по краямъ снабжены отдаленными и острыми зазубринами. Разрѣзы узко-колокольчатого вѣнчика доходятъ до его середины. Чашелистики у типичной формы очень узки, почти шиловидные, тогда какъ у var. *latifolia* м. они нѣсколько шире. Boissier l. cit. относитъ къ этому-же виду какъ варьететъ и *C. kryophila* Rupr., однако очень значительная разница у обоихъ видовъ въ формѣ листьевъ, строеніи частей цвѣтка и отсутствіе какихъ-либо переходныхъ формъ, заставляютъ признать *C. kryophila* Rupr. за самостоятельный видъ, хотя и близкій къ *C. ardonensis* Rupr. У послѣдняго разрѣзы долей вѣнчика доходятъ до его половины, а у *C. kryophila* они доходятъ только до $\frac{1}{3}$ вѣнчика; пластинка листа у *C. ardonensis* линейная или линейно-ланцетная снабжена по краю отдаленными и острыми зазубринами. между тѣмъ какъ у *C. kryophila* она овально-округлая или овально-продолговатая и до середины *горобчатая*.

Series V. Rupestres (Boiss.).

Caules pauciflori saepius fragiles humiles vel decumbentes.
Boiss. III. p. 894.

*26. *C. hypopolia* Trautv. caespitosa pubescens, caudiculis subterraneis tenuissimis elongatis, caulibus tenuibus foliosis apice parce fastigiato-ramosis, foliis radicalibus et fasciculorum steriliis crebris *anguste linearibus* basi longe angustatis supra glabrescentibus vel parce pubescentibus subtus *dense cano-tomentellis* margine *minute et remote dentatis* saepius revolutis, caulinis angustissime linearibus sessilibus, floribus erectis medicribus, calycis pubescentis laciniis *lineari-lanceolatis* obtusiusculis *valde reflexis* corolla campanulata coerulea extus *pubescente* 3—4-plo *brevioribus*, appendicibus late lanceolatis acuminatis tubum calycinum subaequantibus, stylo subexserto vel saepius exserto, receptaculo glabro, capsula suberecta, seminibus ellipticis fuscis marginatis. 24. v. s. in h. P. J. M. Tm. Th. Trautv. Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 389; VI. p. 61. — Boiss. Suppl. p. 331. — Schedae ad. Herb. Flor. Rossic. I. p. 20. — Липск. Фл. К. стр. 378. — Delect. plant. exsicc. Hort. botan. Jurjew. II. p. 34.; III. p. 53. — Radde, Grundz. p. 365; Mus. Cauc. II. p. 122. Exsicc. Herb. Fl. Rossic. № 72! — Delect. plant. exsicc. Hort. Botan. Jurjew.!

Hab. in rupestribus alpium Ossetiae Caucasi centralis. 7000'—8000'. — **A. M.** Военно-Осетин. дор. около дер. Лперн. 15. VII. 97. Десулави! Тамъ-же. 10. VII. 97. Марков.! „Приютъ“ близъ Мамнессона по Ардону. 8000'. 20. VII. 02. Акинф.! Близъ Мамнессона. 8000'. 19. VII. 02. Акинф.! Осетія, близъ Заромака. 16. VII. 90. Акинф.! Военно-Груз. дор., Гудауръ. VIII. 75. Радде! Тамъ-же. 1895. Десулави! Между Гудауромъ и Коби. 20. VII. 77. Вдовьевъ!

Примѣч. Видъ этотъ селится на скалахъ въ центральной части Главнаго хребта и до сихъ поръ извѣстенъ только изъ четырехъ мѣстонахожденій. Отъ всѣхъ формъ группы „*Rupestres*“ отличается загнутыми назадъ чашелистиками и узко-линейными, снизу войлочными листьями. Тонкіе красноватые, извилистые стебли покрыты мягкимъ пушкомъ; прицвѣтники на тонкихъ цвѣтоножкахъ крючковидно загнуты внизъ.

*27. *C. petrophila* Rupr. diffuse caespitosa dense puberula vel glabrescens, caudiculis numerosis tenuibus prostratis nudis fasciculos floriferos

et steriles edentibus, caulibus tenuiter filiformibus pumilis foliosis uni- vel 3—5-floris pedunculis elongatis foliosis, foliis inferioribus et fasciculorum sterilium *minimis longe petiolatis ovatis* vel *obovato-rotundis* apice crenato-dentatis, caulinis diminutis breviter petiolatis *obovatis* vel *ellipticis*, calycis puberuli laciniis triangulari-lanceolatis obtusiusculis corolla coerulea glabra vel ad nervos pilosa campanulata vel subtubuloso-campanulata *ore barbata* 3—4-plo brevioribus, appendicibus *brevissimis dentiformibus* tubum calycis *non aequantibus*, receptaculo nudo, capsula semiglobosa, seminibus oblongis compressis *anguste marginatis*. 2. v. s. in h. A. P. J. M. Tm. Th.

Rupr. Bull. de l'Acad. de Sc. de St. Pétersb. XI. p. 186. отд. отт. — Trautv. in A. H. P. V. 2. p. 453. — Boiss. III. p. 906. — Липск. Фл. К. стр. 378. — Somm. & Lev. A. H. P. XVI. p. 320. — Radde, Grundz. p. 365; Mus. Cauc. II. p. 122. (partim.). — Бушъ. По горамъ Хевсур. и Тушет. стр. 13; 36; 38; 46; 49; 52.
Syn. *C. tridentata* var. *petrophila* Trautv. in A. H. P. VI. p. 58; X. p. 120. (partim.). — *C. petrophila* var. *linoides* Rupr. l. c. — *C. petrophila* var. *borbalensis* Rupr. l. c. — *C. Adami* C. A. Meyer (in herb. Acad. Imper. Petrop.). Verzeichn. d. Pflanz. des Kauk. p. 83. (partim.).

Hab. in fissuris rupium Caucasiorientalis ubique centralis. 4200'—11400'.
— **A. M.** Эльбурсъ, близъ ледника Азау. 9000'. 19. VII. 96. Акинф.! Центральн. Кавказъ, у ледника Тапахохъ. 28. VII. Арнольд! Гора Кюнъ-хохъ. 3. VII. 97. Марков.! Военно-Осет. дор., у Мамиссона, на скалахъ. 10000'. VII. 97. Десулави! (f. parviflora, appendicibus vix ad dimidium tubum calycis attingentibus). Ауль Тибъ у Ардона. VII. 77. Бротерусъ! Девдоракскій ледникъ, морены. 8000'—8500'. VI. 91. Десулави! Г. Казбекъ, на обвалахъ. 6. VIII. 98. Десулави! Дарьяль. 4200'. 22. VIII. 61. Рупр.! Гора Гудъ, на вершинѣ. 25. VII. 88. Акинф.! — **A. O.** Буслачирскій перев., южный склонъ, скалы. 4. VII. 90. Кзнец.! Тамъ-же. 12. VII. 01. Сатунинъ! Хевсурия, на влажныхъ скалахъ горы Борбало. 9200'. 13. IX. 60. Рупр.! (f. umbrosa laciniis calycinis latioribus. Rupr. l. cit. sub *C. petrophila* ̢. *borbalensis* Rupr.). Альпійскіе ковры между сс. Рошка и Бло. 3. VII. 03. Бушъ! Истоки р. Арагвы, ущелье близъ с. Бло. 26. VI. 76. Радде! (f. umbrosa calycis laciniis latioribus elongatis). Между сс. Борисахо и Рошка, скалы. 1. VII. 03. Бушъ! Тушетія, между сс. Омало и Бечела. 22. VII. 03. Бушъ! Парсма, на скалахъ у р. Алазани. 6180'. 6. VIII. 61. Рупр.! Между с. Парсма и переваломъ къ горѣ Комитосъ-цвери, альп. ковры. 16. VII. 03. Бушъ! Субальп. дуга въ верховьяхъ р. Перикитеской Алазани. 14. VII. 03. Бушъ! Сел. Чонтіо. 8. VII. 76. Радде! Г. Вестамта. 7560'—7800'. 8. VIII. 61. Рупр.! Близъ Дано, на скалахъ. 6480'—6360'. 5. VIII. 61. Рупр.! На горѣ Кавтари. 9720'. 2. VIII. 61. Рупр.! Надъ переваломъ Тюльти въ Тушетіи. 1889. Медв.! Массарскій перев., между верховьями Кахетинской Алазани и Юры, альп. ковры. 24. VII. 03. Бушъ! Дагестанъ. Истоки р. Планъ-хевн, на горѣ Бочогъ. 9600'. 15. VIII. 60. Рупр.! Между Ратлу и Хиндагъ, на перевалѣ. 8400'. 15. VIII. 61. Рупр.! (f. abbreviata parviflora). Истоки р. Самура, между Куссуромъ и подножіемъ горы Сари-дагъ, на скалахъ. 6960'. 24. VII. 60. Рупр.! (f. abbreviata parviflora). Южный Дагестанъ, въ направленіи верховьевъ р. Самура, на каменистомъ берегу ручья Бадагъ. 6320'. 25. VII. 60. Рупр.! (f. parviflora). Вадалъ-Булагъ-дагъ. 6000—7200'. 9. VII. 60. Рупр.! (f. par-

viflora foliis caulinis late lanceolatis margine undulatis). На горѣ Динди-дагъ, на скалахъ въ субальпійской полосѣ. 6000'. 9. VII. 60. Рупр.! У р. Дюльти-чай, притока р. Самура, близъ Киргилъ. 6300'—6060'. 14. VII. 60. Рупр.! Истоки р. Самура, близъ Башъ-Мухахъ. 6300'—6600', на каменистыхъ осыпяхъ. 14. VII. 60. Рупр.! (*f. caespitosa c. fruct. immat.*) Тиндалъ, горы Богосъ, выше сел. Завагадаръ. 6600'. 12. VII. 61. Рупр.! Тиндалъ, горы Богосъ, на скалахъ горы Анчабала. 8160'. 8. VII. 61. Рупр.! Истоки Казикумухекаго Койсу, г. Дюльти-дагъ. 9. VII. 60. Оверинъ! Тамъ-же. 17. VII. 85. Радде! (*f. foliis caulinis elliptico-lanceolatis*). Истоки р. Самура, на скалахъ близъ Хутунъ. 7200'. 11. VII. 97. Алекс.! Нухинск. у., Елисаветпольск. губ., истоки р. Дашагиль-чай, на скалахъ выше границы лѣса. 7400'. 14. VIII. 00. Алекс.! Тамъ-же. 9000', на скалахъ у мѣста Лакаръ Верхній. 14. VIII. 00. Алекс.! Дагестанъ, Самурскій окр., истоки р. Гедыль-чай, на отвѣсныхъ скалахъ. 8600'. 15. VIII. 00. Алекс.! Бакинск. губ., Кубинскій уѣздъ, на восточномъ склонѣ г. Базаръ, каменистая осыпь ущелья Ятухъ-дере. 10000'. 27. VII. 99. Алекс.! Дагестанъ, Самурск. окр., близъ сел. Курушъ, въ ущельѣ Кекеръ-дере. 8800'. 21. VIII. 00. Алекс.! Бакинск. губ., Кубинск. у., южный склонъ горы Шахъ-дагъ. 30. VII. 1830. К. А. Мейеръ! (*alabastra et folia*). Тамъ-же, въ трещинахъ известковыхъ скалъ. 11400'. 30. VII. 98. Алекс.! По обрывамъ ущелья Хандыкъ-дере, на югъ отъ сел. Хиналугъ. 7600'. 22. VIII. 00. Алекс.!

Примѣч. Количество цвѣтовъ на стеблѣ варьируетъ въ зависимости отъ высоты мѣстности. Въ субальпійскомъ и лѣсномъ регионахъ встрѣчаются главнымъ образомъ формы съ 3—4 цвѣтками на стеблѣ, между тѣмъ какъ въ наиболѣе высокихъ мѣстахъ альпійской области встрѣчаются формы преимущественно только съ однимъ цвѣткомъ на стеблѣ. Цвѣты до распускания обыкновенно направлены прямо вверхъ, послѣ распускания поникающіе. Вѣнчикъ у типичной формы обратно-коническо-колокольчатый и очень варьируетъ по величинѣ въ зависимости отъ условий мѣстности. Въ Дагестанѣ на скалахъ, подверженныхъ дѣйствию сухихъ вѣтровъ и сильной инсоляціи, растеніе развиваетъ небольшіе цвѣты, всѣ части растенія укорочены, стебли пригнуты къ землѣ. Наоборотъ, въ болѣе защищенныхъ и затѣненныхъ мѣстахъ, главнымъ образомъ въ ущельяхъ Центрального Кавказа, а равно и восточной части Главнаго хребта, растеніе развиваетъ крупныя цвѣты; чашелистики у такихъ цвѣтовъ болѣе широкіе и обыкновенно въ $2\frac{1}{2}$ —3 раза короче вѣнчика, стебли растенія всегда удлинены. Въ виду этого var. *γ. linoides* и *δ. borbaleensis* Rupr. я отношу къ числу синонимовъ типичной формы. Листья варьируютъ преимущественно на стеблѣ и опять таки въ зависимости отъ мѣстныхъ условий роста. У экземпляровъ изъ упомянутыхъ сухихъ мѣстъ Дагестана стеблевые листья болѣе узкіе продолговато-ланцетные и болѣе крѣпкой консистенціи; у экземпляровъ изъ защищенныхъ мѣстъ ущелій стеблевые листья всегда болѣе широкіе округлые или продолговато-эллиптические и нѣжной консистенціи. Одноцвѣтковые экземпляры этого вида изъ наиболѣе высокихъ мѣстъ альпійской области въ виду нѣкотораго вѣшняго сходства смѣшивались въ гербаріяхъ иногда съ *C. bellidifolia* Adm. Отъ послѣдней *C. petrophila* Rupr. можно всегда легко отличить: по маленькимъ придаткамъ чашечки, болѣе или менѣе бородатому вѣнчику и отсутствію опушенія на цвѣтоложѣ.

Въ гербаріи Императорскаго Ботан. Сада (*in herbariis Trautvetteri et Ledebouri*), а также и въ гербаріи Кавказскаго Музея подъ видомъ *C. petrophila* Rupr. хранятся отчасти экземпляры *C. argunensis* Rupr., ошибочно опредѣленные Траутфеттеромъ. (Ср. также примѣч. къ *C. argunensis* Rupr. p. 64.)

* *var. longiflora* Rupr. calyx corolla subtubulosa $1\frac{1}{4}$ -pollicari 6—8-plo brevior. 24. v. s. in h. A.

Rupr. l. cit. p. 188. отд. отд. — Boiss. III. p. 907.

Hab. in rupestribus angustiarum regionis alpinae et subalpinae Tuschetiae. 6000'—8000'. — **A. O.** Тушетія, Дикло. 7500—8000'. 29. VII. 61. Рупр.! Тамъ-же. Байернъ! Тушетія, между с. Джваръ-босели и г. Самкурисъ-цвери, субальп. регионъ. 23. VII. 03. Бушъ!

Примѣч. Отъ типа отличается длиннымъ трубковидно-колокольчатымъ въичкомъ, который отъ 6 до 8-ми разъ длиннѣе чашечки.

* **var. exappendiculata** Som m. & Lev. caulibus unifloris, calycis *exappendiculati* laciniis triangulari-lanceolatis corolla 2—3-plo brevioribus. 24. n. v.

Som m. & Lev. in A. H. P. XVI. p. 320.

Hab. in Caucaso magno. — **A. M.** Кошъ-Измаель. Лойка.

Примѣч. Судя по описанію Соммье и Левье, у этого варьетета совершенно отсутствуютъ придатки чашечки. Среди формъ *C. petrophila* Rupr. весьма часто попадаются экземпляры съ очень короткими придатками чашечки, которые имѣють форму очень маленькихъ зубчиковъ. Экземпляровъ съ полнымъ отсутствіемъ придатковъ чашечки мнѣ не приходилось наблюдать.

* **var. angustiflora** m. omnibus partibus *dense patule pubescens*, calyx corolla *parva tubulosa* ad nervos *longe pilosa* ore *dense barbata* 4-plo brevior. 24. v. s. in. h. J.

Hab. in rupestribus regionis alpinae montium Kachetiae. 8000'. — **A. O.** Кახетія, выше Лагодехъ, на скалахъ въ альпійской области горы Нене-горн. 8000'. 29. VII. 01. Ю. Млокосѣвичъ!

Примѣч. Густое сѣрое опушеніе, маленькій трубковидный въичекъ, по habitus'у напоминающій таковой-же у *C. sibirica* L. или у *C. caucasica* M.B., сильно отличаютъ этотъ варьететъ отъ всѣхъ формъ *C. petrophila* Rupr. Всѣ листья этого варьетета какъ нижніе, такъ и стеблевые одинаковые — эллиптическіе.

*28. **C. Ledebouriana** Trautv. caespitosa, rhizomate ramoso repente nodoso, caulibus pumilis numerosis 1—4-floris setulis retrorsum adpressis parce conspersis, foliis radicalibus et sureulorum steriliū *oblongo-lanceolatis* vel saepius *lineari-lanceolatis* in petiolum plus minus longum angustatis caulinis *lineari-lanceolatis* minutis sessilibus, omnibus margine remote *glanduloso-denticulatis* infra *glaberrimis* supra *setulis retrorsum adpressis strigulosis sparsim obsitis*, calycis *glaberrimi subcoriacei* laciniis late *lanceolatis* obtusis parce et breviter *ciliatis* corolla glabra caerulea campanulata 3—4-plo brevioribus, appendicibus lanceolatis acuminatis tubum calycinum excedentibus, stylo subexserto, receptaculo glabro. 24. v. s. in h. P. Tm.

Trautv. Stirp. nov. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 477, 562; VI. p. 59.

— Boiss. III. p. 905. — Липск. Фл. К. стр. 378. — Radde, Grundz. p. 364, 374, 376; Mus. Cauc. II. p. 121.

Hab. in rupestribus regionis alpinae montium Transcaucasiae australis ad fines turcicas. 8000'—11000'. — **X. A.** Карсская обл., ущелье р. Дигоръ-чай по скаламъ рѣдко. 15. VI. 86. Масальскій! (f. caulibus elongatis 1—4-floris). Пограничный хребетъ между Араксомъ и верховьями Евфрата, по скаламъ не часто. 19. VII. 86. Масальскій! Гора Б. Арапатъ, скалы у оз. Кюпгѣль. 11000'. 8. VIII. 71. Радде!

Примѣч. *C. Ledebouriana* Trautv. встрѣчается, повидимому, очень рѣдко и только въ горахъ южной части русской Арменіи, пограничныхъ

съ Турціей. Экземпляры Г. И. Радде съ Арарата представляют собою форму изъ наиболѣе высокихъ мѣстъ алыійской области съ густой дерновиной укороченныхъ безплодныхъ побѣговъ и съ укороченными стеблями, закапчивающимися всего только однимъ цвѣткомъ. Вѣнчикъ средней величины въ 4—5 разъ длиннѣе чашелистиковъ; листья у плодущихъ и безплодныхъ побѣговъ небольшіе вслѣдствіе своей укороченности кажутся продолговато-ланцетными, но здѣсь-же уже встрѣчаются болѣе вытянувшіеся листочки, форма которыхъ линейно-ланцетная съ удаленными по краю зубчиками. У экземпляровъ кн. В. И. Масальскаго, взятыхъ очевидно, изъ затѣненныхъ мѣстъ съ меньшей высоты, плодущіе и безплодные побѣги сильно удлинены; стебли несутъ отъ одного до четырехъ цвѣтковъ. Вѣнчикъ нѣсколько крупнѣе, чѣмъ у экземпляровъ Г. И. Радде, а чашелистики только въ 3—4 раза короче вѣнчика; нижніе листья у плодущихъ и безплодныхъ побѣговъ линейно-ланцетные, постепенно переходящіе въ удлинненный черешекъ.

*29. *C. andia* Rupr. omnis minute dense pubescens grisea, caulibus e rhizomate tenui filiformibus flexuosis nanis 1—7-floris decumbentibus vel ascendentibus foliosis, foliis minimis firmulis subtus *elevatim pellucido-venosis* irregulariter obtuse serrulatis, radicalibus *ovato-cordatis* petiolis aequilongis vel brevioribus, caulinis *orbiculato-reniformibus* breviter petiolatis, superioribus diminutis *oblongis* subsessilibus, floribus mediocribus breviter pedicellatis, pedicellis bracteolatis acutem aequantibus, calycis griseo-tomentosi laciniis anguste *lanceolatis* acutiusculis corolla ore *plus minus barbata* (e sicco) violacea dense pubescente campanulato-infundibuliformi ad *dimidiam partem fissâ* 3—4-plo brevioribus, appendicibus brevissimis, tubo calycino multo brevioribus, stylo corolla multo breviorе, receptaculo glaberrimo. 4. v. s. in h. A. J. Tm.

Rupr. Bull. de l'Acad. d. Sc. de St. Pétersb. XI. p. 189. отд. отт. sub *C. andia* Rupr. — Липск. А. Н. Р. XIV. 2. p. 312; Фл. К. стр. 379. — О о м. Труд. Тифл. Бот. Сада, вып. VI. кн. 2. стр. 4. — Syn. *C. Gumbetica* Boiss. III. p. 914. — *C. Bayerniana* Radde. Mus. Cauc. II. p. 122. (partim).

Hab. in rupibus calcareis Daghestaniae ubique Caucasi centralis. 5000'—7000'. — А. М. Военно-Груз. дор., скалы въ горахъ надъ ст. Балта. 7000'. VI. 91. Десулави! (f. grandiflora). — X. D. Дагестанъ, Кири, известковые скалы. 20. VII. 94. Радде и Кёнигъ! (f. multiflora). Ботлихъ, на скалахъ. VI. 95. Десулави! Гумбетъ, близъ Дануха. 26. VII. 61. Оверинъ!

Примѣч. Распространеніе этого вида по Главному хребту пока мало изслѣдовано. Экземпляры изъ центральной части Кавказа имѣютъ отъ 1—2-хъ сравнительно крупныхъ цвѣтковъ и характерное сѣрое опушеніе листьевъ; подобное же опушеніе имѣютъ экземпляры изъ средняго Дагестана, но количество цвѣтовъ на стеблѣ больше. Въ восточной части Дагестана уже встрѣчается var. *Alexeenkoi* m. съ голыми листьями. Слѣдуетъ замѣтить, что величина цвѣтовъ, количество ихъ на одномъ стеблѣ и длина цвѣтоножекъ и стеблей сильно варьируютъ въ зависимости отъ высоты мѣстности. Экземпляры Десулави, собранные имъ на высотѣ 7000' въ горахъ надъ ст. Балта по Военно-Груз. дорогѣ, имѣютъ на стеблѣ по 1—2 сравнительно крупныхъ цвѣтковъ, цвѣтоножки у нихъ очень коротки и цвѣты кажутся почти сидячими, стебли укорочены и густо покрыты кругловатыми листочками. У экземпляровъ Десулави изъ Ботлиха съ высоты 5500' имѣется тоже 1—2, но уже менѣе крупныхъ цвѣтка; цвѣтоножки значительно длиннѣе и почти равняются чашечкѣ. Наконецъ у многочисленныхъ экземпляровъ Г. И. Радде изъ Кири 5000' стебли несутъ отъ 1 до 7 хорошо развитыхъ цвѣтковъ одинаковой величины съ цвѣтками экземпляровъ Десулави изъ Ботлиха и Оверина изъ Дануха. Опу-

шеніе у всѣхъ этихъ экземпляровъ одинаковое мягкое, сѣрое, цвѣтоножки по длинѣ равняются чашечкѣ.

Весьма характерна у *C. andia* Rupr. первація листьевъ съ нижней стороны — она выдается и, какъ это видно на сухихъ экземплярахъ, просвѣчиваетъ. (См. также примѣч. *Θ о м.* I. cit.)

***var. Alexeenkoi** m. caulibus parce pubescentibus foliis praeter marginem *glabris*, calycis pubescentis laciniis anguste lanceolatis *acutis* corolla pubescente triplo brevioribus, appendicibus brevissimis, pedicellis calyce *duplo longioribus*. *℥. v. s.* in h. A. (in herbario Alexeenkoi)

Θ о м. Труд. Тифл. Ботан. Сада, вып. VI. кн. 2. стр. 5.

Hab. in rupestribus Daghestaniae orientalis. 3900'—6400'. — **X. D.** Аварскій окр., близъ сел. Гимры на вертикальныхъ скалахъ сѣверо-западн. склона горы Шухи-мееръ. 3900'. 24. V. 01. (alabast.). Алекс.! — **S. D-K.** Дагестанъ, Даргинскій окр., близъ сел. Акуша, на скалахъ горъ Маара. 6400'. 15. VII. 98. Алекс.! Между сел. Акуша и Муги (Меге). 4900'. 14. VII. 98. Алекс.!

Примѣч. Отъ типичной формы отличается длинными цвѣтоножками, отсутствіемъ густого сѣраго опушенія на стебляхъ, голыми листьями и болѣе острыми долями чашечки. Нервація листьевъ такая-же, какъ и у типичной формы, а просвѣчиваніе первовъ еще замѣтнѣе благодаря отсутствію опушенія. Стебли значительно удлинены. (См. примѣч. *Θ о м* II, I. cit.)

Series VI. *Symphandraeformes* m i l i.

Calyx corolla multo latior, laciniis calycinis patentibus, antherae in floribus junioribus saepius apice conjunctae.

***30. C. Autraniana** Alb. glaberrima caulibus e rhizomate tenui ramoso decumbentibus flexuosis foliosis parce ramulosis, ramulis congestis unifloris, foliis e sicco *rigidis subcoriaceis* radicalibus cordato-ovatis, ovatis vel ovato-oblongis apice angustatis acutiusculis basi cuneatis, rotundatis vel oblique cordatis margine irregulariter duplicato-serrato-dentatis longissime petiolatis petiolis interdum lobulis minimis setaceis obsitis caulinis *oblongis basi cuneatis* breviter petiolatis, superioribus *oblongo-lanceolatis* vel lanceolatis subsessilibus, floribus mediocribus *secundis* post anthesin *mutantibus*, calycis glaberrimi laciniis *linearibus* corolla anguste campanulata 4—5-plo brevioribus, sinubus reflexis vix appendiculatis, stylo incluso, receptaculo glabro, capsula obconica, seminibus fuscis *minutis* ovatis *turpidis non marginatis*. *℥. v. s.* in h. P. Tm.

Alb. Camp nov. Cauc. in Bull. de l'Herb. Boiss. t II (1894.) p. 115; Prodr. Fl. Coleh. p. 157. — Липск. Фл. К. стр. 378.

Hab. in rubus montium Transcaucasiae occidentalis, 1800—1900 m. — **A. W.** Черкесія, гора Фиштъ, на скалахъ въ субальпійскомъ регионѣ на границѣ лѣса. 1800—1900 m. (№№. 551 и 403). 14. IX. 93. Альбовъ! fl. fr.

Примѣч. Видъ, хотя и близкій къ *C. suanetica* Rupr., но сильно отличающійся отъ него: стеблевыми листьями съ клиновиднымъ основаніемъ, поникающими цвѣтами, линейными чашелистками, лишенными зубчиковъ, и наконецъ болѣе мелкими сѣменами, вздутыми и безъ ободка.

***31. C. suanetica** Rupr. glaberrima, caulibus e rhizomate tenui *squamoso* ascendentibus foliosis apice ramulosis subcorymbose paucifloris, ramulis tenuibus axillaribus 1—3-floris, foliis radicalibus et fasciculorum ste-

rilium reniformi- vel ovato-cordatis longissime petiolatis caulinis ovatis vel oblongo-ovatis basi plus minus *profunde cordatis* attenuato-acuminatis breviter petiolatis, floribus mediocribus longe pedicellatis, pedicellis tenuibus erectis, calycis glaberrimi laciniis *valde patentibus lineari-lanceolatis denticulatis* corolla coerulea infundibuliformi-campanulata glabra ad *tertiam partem lobata ore barbata 2—3-plo brevioribus*, appendicibus parvis dentiformibus tubo multo brevioribus, stylo subexserto, receptaculo glabro, capsula matura hemisphaerica *erecta*, seminibus flavo-fuscis *nitidis* parvis *compressis latiuscule marginatis*. *2l. v. s. in h. A. P. Tm.*

Rupr. Bull. de l'Acad. de Sc. de St. Pétersb. XI. p. 190. отд. отд. — Boiss. III. p. 910. — Trautv. in A. H. P. VI. p. 66. — Липск. Фл. К. стр. 378. — Somm. & Lev. in A. H. P. XVI. p. 323. — Radde Mus. Cauc. II. p. 122.

Icon. in A. H. P. XVI. tab. XXXI. f. 1—5!

Exsicc. Sommer & Levier. Iter Caucasicum. № 879!

Hab. in rupibus regionis silvaticae Caucasi occidentalis. — **S. P.** Сванетия, у р. Цхенись-цхали, близъ сел. Мури. 1530'. 16. VI. 64. flor. Радде! На вертикальныхъ скалахъ праваго берега р. Цхенись-цхали между Мури и Лентехи. 29. VII. 90. fruct. Соммье и Лев.!

Примѣч. Въ гербаріи Император. Петербургскаго Ботан. Сада (in herbario Ledebourii) среди экземпляровъ *C. Raddeana* Trautv., собранныхъ д-ромъ Г. Н. Радде въ Боржомъ, имѣется одинъ экземпляръ *C. suanetica* Rupr. съ этикеткой, гдѣ мѣсто нахождения обозначенъ Боржомъ. Экземпляръ этотъ, надо полагать, попалъ сюда случайно, такъ какъ въ гербаріи Г. Н. Радде въ Кавказскомъ Музее среди *C. Raddeana* Trautv. экземпляровъ *C. suanetica* Rupr. не имѣется. Флора Боржома изслѣдована довольно хорошо и нѣкто изъ экскурсировавшихъ тамъ ботаниковъ — ни Смирновъ, ни Медвѣдевъ, ни Акнифьевъ, ни Мищенко *C. suanetica* Rupr. не находили.

Видъ близкій къ *C. Autraniana* Alb., отъ которой хорошо отличается: прикорневыми и стеблевыми листьями съ глубокимъ сердцевиднымъ вырѣзомъ у основанія, сильно отогнутыми назадъ линейно-ланцетными чашелистниками, снабженными по краю зубчиками, и наконецъ болѣе крупными сплюснутыми и лоснящимися сѣменами съ широкимъ ободкомъ. На таблицѣ XXXI, въ А. Н. P. XVI, вѣнчикъ изображенъ очень узкимъ почти трубчатымъ, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ онъ узокъ только внизу, а сверху сильно расширенъ.

* **f. appendiculata** (Somm. & Lev.) m. appendicibus subulatis capsulam maturam fere aequantibus. *2l. v. s. in h. P.*

Somm. & Lev. in A. H. P. XVI. p. 323.

Icon. A. H. P. XVI. tab. XXXI. f. 6—8!

Exsicc. Stéphen Sommer — Plantae in Caucaso lectae. № 879!

Hab. in Suanetia Caucasi occidentalis. — **S. P.** Сванетия, у р. Цхенись-цхали, на скалахъ близъ сел. Лентехи. 29. VII. 90. fl. fr. Соммье и Лев.!

Примѣч. Отъ типа отличается только болѣе длинными придатками чашечки.

* **32. C. Kolenatiana** C. A. Mey. glabriuscula caulibus e rhizomate crasso pluricipiti elatis¹⁾ ascendenti-erectis vel flexuosis basi parce ramosis ramis 1-floris vel racemose et subunilateraliter paucifloris, foliis radicalibus *cordatis ovatis inciso-crenatis* obtusis longe petiolatis petiolis *lobulis instructis* caulinis mediis ovatis saepe breviter petiolatis superioribus oblon-

1) In locis siccis pumilis.

gis sessilibus, pedunculis tenuibus brevibus bracteolatis saepius nutantibus, floribus magnis, calycis glabri laciniis et appendicibus *triangulari-lanceolatis acutis remote denticulatis setis dilatatis strigosis obsitis*, hisce triplo brevioribus sed tubum calycinum excedentibus, corolla late campanulata violacea *glabra ore plus minus barбата* laciniis calycinis triplo longiore, receptaculo glabro, stigmate subexserto. 24. v. v. et s. in h. P. Tm. Th.

C. A. Meyer ined. ex Rupr. Bull. de l'Acad. d. Sc. de St. Pétersb. XI. p. 191. отд. отр. — Boiss. III. p. 910 — Trautv. in A. H. P. VI. p. 65; X. p. 121. — Липск. Фл. К. стр. 378. — Radde, Grundz. p. 365; Mus. Cauc. II. p. 122. — Оом Труд. Тифл. Ботан. Сада, вып. VI. кн. 2. стр. 51.

Hab. in rupestribus regionis silvaticae et subalpinae Caucasi orientalis. — **A. O.** Главн. хреб., на скалах у сел. Бежита, близъ Геледа. 4800'. 17. VII. 1861. Рупр.! (In herb. Ledeb. H. B. Petrop.). Кахетия. Лагодехское ущелье. 4000'. 23. V. 01. Ю. Млокосъвичъ! Закатальск. окр., близъ аула Сарыбашъ, около 5000'. 10. VI. 99. Оом.! Нухинскій уѣздъ, Елисаветпольской губ., Дашагильское ущелье. 3400'. 16. VI. 99. Оом.!! Тамъ-же, близъ сел. Верхн. Дашагиль, на скалахъ. 3700'. 14. VIII. 00. Алексее.! Итѣки р. Самура, Арахюль. 9. VII. 85. Радде! Между Нухой и р. Салаватъ. 14. VI. 85. Радде! Главн. хреб., г. Шальбузь-дагъ. 29. VI. 85. Радде!

Примѣч. *C. Kolenatiana* С. А. Меу. представляетъ собою растеніе лѣсного регіона, но поднимается и до субальпійскаго регіона. Селится обыкновенно на скалахъ въ глубокихъ и влажныхъ ущельяхъ въ восточной части Главнаго хребта на южномъ его склонѣ. Попадаясь на скалахъ вдоль вьючныхъ тропъ, ведущихъ изъ Кахетин, Закатальскаго окр. и Нухинскаго уѣзда Елисаветпольской губ. въ Дагестанъ, это растеніе, очевидно, заносится человѣкомъ и на сѣверный склонъ Главнаго хребта, но растетъ тамъ плохо, страдая отъ сухости. Въ кавказскомъ отдѣлѣ Тифлискаго Ботанич. Сада это растеніе выведено изъ сѣмянъ, собранныхъ мною въ Дашагильскомъ ущельѣ Нухинскаго уѣзда, и, будучи посажено ради опыта на открытомъ мѣстѣ безъ всякаго притѣненія, растетъ низкими и корявыми кустикомъ и очень страдаетъ отъ солнца и вѣтровъ, даетъ некрупные цвѣты, а въ нѣкоторые годы даже и не цвѣло. Между тѣмъ какъ на мѣстѣ въ Дашагильскомъ ущельѣ растеніе развивается высокіе и стройные стебли и даетъ очень крупныя цвѣты. То-же самое можно наблюдать на всѣхъ гербарныхъ экземплярахъ, взятыхъ въ разныхъ мѣстахъ съ южнаго склона Главнаго хребта Ю. Млокосъвичъ, мной, О. Н. Алексѣенко и Г. И. Радде. Гербарные экземпляры, взятые Рупрехтомъ и Радде съ сѣвернаго склона, представляютъ собою именно корявые и низкіе кустики съ мелкими листьями и некрупными цвѣтами.

Очень красивое растеніе. Крупные и широко-колокольчатые цвѣты по краю вѣнчика всегда бываютъ болѣе или менѣе бородачатыми. Треугольно-ланцетныя доли чашечки и ея придатки снабжены удаленными зубчиками и усажены по краю щетинистыми кнizu расширяющимися волосками. Придатки обыкновенно въ $2\frac{1}{2}$ раза короче чашелистиковъ. Длинные черешки прикорневыхъ листьевъ снабжены съ боковъ небольшими ланцетными или ланцетно-линейными долями. Средніе стеблевые листья имѣютъ короткіе черешки, тогда какъ верхніе листья всегда сидячіе. Цвѣты на тонкихъ короткихъ ножкахъ направлены косо вверхъ или чаще понакающіе.

*33. *C. Raddeana* Trautv. glabra, caulibus e rhizomate tenui repente squamoso gracilibus erectis simplicibus vel parce et breviter ramulosis laxepaniculatis, foliis acutiuscule dentatis radicalibus et fasciculorum steriliumpetiolatis profunde cordatis ovatis vel triangularibus, caulinis breviter pedunculatis ovatis vel triangularibus, superioribus diminutis subsessilibus acuminatis, floribus mediocribus ad axillas superiores solitariis paucis bre-

viter et subunilateraliter racemosis, pedunculis bracteolatis calyce longioribus cernuis, calycis glabri laciniis *triangularibus* acuminatis *setis pellucidis basi dilatatis* obsitis, appendicibus triangulari-lanceolatis strigosis tubum *excedentibus*, corolla *violacea campanulata* ore subbarbata laciniis calycinis duplo longiore, antheris *aurantiacis*, stylo *exserto*, receptaculo glabro. **21.** v. v. et s. in h. A. P. J. Tm. Th. Fenn.

Trautv. Fl. nov. Cauc. in Bull. de l'Acad. de Sc. de St. Pétersb. X. p. 395; A. H. P. IV. 2. p. 388; V. 2. p. 453; VI. p. 65. — **Boiss.** III. p. 910. — Радде. Путеш. въ Мингрельск. алы. стр. 218. — Липск. Фл. К. стр. 378. — **Radde.** Mus. Cauc. II. p. 122; Grundz. p. 284. — **Ом.** Труд. Тифл. Бот. Сада. Вып. VI, кн. 2. стр. 11 и 51. **Syn.** *C. Brotheri* **Somm. & Lev.** Nuov. Giorn. Bot. Ital. 1897. p. 199; Act. Hort. Petrop. XVI. p. 315.

Hab. in rupestribus Somchetiae. 3500'—4500'. — **S. S.-K.** Боржомъ. 7. VI. 65. Радде! — **X. A.** Близъ сел. Ацхуръ. VI. 75. Радде! Тамъ-же, на скалахъ. 19. VII. 00. **Ом.**!! На скалахъ по дорогѣ къ Ацхуру, въ 3-хъ верстахъ отъ Ацхура, на южномъ склонѣ. 1. VI. 01. Мищенко! Между Руставомъ и Ахалцыхомъ, на скалахъ. 20. VII. 00. flor. fruct. **Омниъ**!! Близъ Ахалцыха. 7. VI. 81. **Бротерусъ**! (№ 590 cum alabastr.). Близъ Уравели въ Ахалцыхск. уѣздѣ. V. 76. Радде! (alabastra).

Примѣч. **Соммье** и **Левье** въ N. Giorn. Bot. Ital. 1897. p. 199 и въ Acta Hort. Petrop. XVI. p. 315, очевидно не выдавши *C. Raddeana* **Trautv.**, описали это-же самое растение по экземплярамъ **Бротеруса** какъ новый видъ и назвали *C. Brotheri* **Somm. & Lev.** (См. **Омниъ**, l. cit.)

Отъ всѣхъ формъ группы „*Synphyandraeformes*“ m. *C. Raddeana* **Trautv.** отличается кожистыми крупно-городчато-зубчатыми листьями, пластинка которыхъ варьируетъ отъ сердцевидной до треугольно-сердцевидной. Растение это даетъ множество бесплодныхъ ползучихъ побѣговъ, которые затѣмъ укореняются. Вѣнчикъ темно-лиловый и по краю болѣе или менѣе бородатый. Пыльники оранжево-красные и въ молодыхъ цвѣтахъ часто слѣпляются наверху по два или по три. Чашелистики при цвѣтеніи оттопырены и не касаются вѣнчика. Рѣсницы по краю чашелистиковъ и придатковъ чашечки жесткія и прозрачныя, книзу расширенныя и у живыхъ растений направлены пемного вкось.

34. C. Bayerniana **Rupr.** glabra vel minute hirta, rhizomate ramoso caespitoso, caulibus tenuibus flexuosis paucifloris pumilis, foliis subcoriaceis, radicalibus et fasciculorum sterilium longe petiolatis *reniformi-* vel *ovato-cordatis grosse* inaequaliter et *crebre dentatis* margine *rigide* et *crispule ciliatis* caulinis diminutis *ovato-rotundis* vel *ovatis grosse* acute 5—9-dentatis breviter petiolatis, floribus parvis, pedunculis bracteolatis calyce duplo longioribus, calycis laciniis *triangularibus longe* acuminatis margine *rigide crispule ciliatis*, corolla anguste campanulata coerulea extus *glabra* intus *barbata* 4—5-plo brevioribus, appendicibus-brevissimis, tubo calycino basi rotundato vel saepius obconico, stylo incluso, filamentorum dilatationibus intus saepe barbatis, receptaculo glaberrimo. **21.** v. v. et s. in h. A. P. Tm. Th.

Rupr. Bull. de l'Acad. de Sc. de St. Petersb. XI. p. 188. отд. отд. — **Boiss.** III. p. 914. — **Trautv.** in A. H. P. II. 2. p. 563; VI. p. 66. (partim). — **Ломак.** Фл. Караб. стр. 58. — **Липск.** Фл. К. стр. 379. — **Radde.** Grundz. p. 295, 365; Mus. Cauc. II. p. 122. (partim). — **Ом.** Труд. Тифл. Ботан. Сада, вып. VI, кн. 2, стр. 6.

Hab. in rupestribus regionis subalpinae et alpinae montium Armeniae rossicae ad fines persicas, a 6000'—10000'. — **S. S.-K.** Въ ста верстахъ

восточнѣе Ордубада, въ альпійской области у Тумана близъ Шахаусъ. 1861. Байернъ! На границѣ Карабаха и Арменіи, близъ сел. Беченагъ. VI. 71. Радде! Выше сел. Беченагъ, близъ вершины г. Казучи-дагъ. 26. V. 00. Ө. о. м.!! Карабахъ, между камней на горѣ Перичингиль. 10000'. 6. VII. 95. Ломак.!

Ag. Geogr. *Persia borealis*!

Примѣч. Видъ этотъ встрѣчается на границѣ Арменіи и Карабаха и въ южной части Карабаха, въ горахъ, пограничныхъ съ Персїей. Экземпляры, взятые съ большихъ высотъ, представляются въ видѣ очень маленькихъ растений высотой отъ 1—2 вершк. съ большимъ количествомъ тонкихъ стеблей, отходящихъ отъ утолщенной части корневища, гнѣздящихся въ трещинахъ скалъ. Листья прикорневые маленькіе почковидно- или овально-сердцевидные по краю съ крупными и мелкими острыми зубцами и жесткими загнутыми рѣсничками; стеблевые еще болѣе уменьшены овальныя съ такими-же зубцами и рѣсничками. Экземпляры съ болѣе низкихъ мѣстъ обыкновенно сильнѣе развиты во всѣхъ своихъ частяхъ, имѣютъ болѣе крупныя листья и удлинненныя стебли. Вѣнчикъ у типичной формы голый, чашечка у основанія слегка закруглена или обратно-конусовидная. У кавказскихъ экземпляровъ опушеніе, въ формѣ жесткихъ волосковъ, наблюдается только у молодыхъ листочковъ, между тѣмъ какъ у персидскихъ экземпляровъ, собранныхъ д-ромъ Г. И. Радде на Саваланѣ, подобное опушеніе распространяется на все растение, исключая вѣнчика. Отъ близкаго къ нему вида *C. Chodatowskyi* Fom. отличается формой вѣнчика, сильно оттянутыми и заостренными долями чашечки, снабженными по краю загнутыми жесткими рѣсничками и наконецъ меньшими размѣрами всѣхъ частей растенія.

*var. *Trautvetteri* m. omnis cum foliis et floribus dense hirsuta, dentibus foliorum latioribus abbreviatis, tubo calycino hemisphaerico. 24. v. v. et s. in h. P. Tm. J. Th.

Ө. о. м. Труд. Тифл. Ботан. Сада, вып. VI, кн. 2, стр. 7.

Syn. *C. Bayerniana* var. *andina* Trautv. in A. H. P. II. 2. p. 563; VI. p. 66.

Hab. in fissuris rupium montium Armeniae et ditionis Karabach ad fines persicas. 5000'—10000'. — X. A. Нахичеванск. у., Эриванск. губ., близъ сел. Беченагъ. VI. 71. Радде! Тамъ-же, Беченагск. ущелье. 5000'—6000'. 25. V. 00. Ө. о. м.!! — S. S.-K. Карабахъ, на камняхъ горы Перичингиль, близъ сел. Базаръ-чай, около 10000'. 17. VII. 03. Гриневецкій!

Примѣч. Этотъ варьететъ встрѣчается иногда по сосѣдству съ типичной формой въ высокихъ областяхъ горъ, но чаще попадаетъ въ болѣе низкихъ регионахъ горъ приблизительно отъ 5000'—6000'. Траутфеттеръ (см. A. H. P. II. 2. p. 563. и VI. p. 66.) эту форму принималъ за *C. andina* Rupr. (*C. andina* Rupr.), между тѣмъ послѣдняя такъ сильно отличается отъ *C. Bayerniana* Rupr., что смѣшать ихъ другъ съ другомъ трудно. *C. andia* отличается мягкимъ сѣрымъ опушеніемъ, мелко-городчатыми, овальными съ сердцевиднымъ основаніемъ листьями, узкими ланцетными туповатыми чашелистками, отсутствіемъ внутри вѣнчика мягкихъ длинныхъ, переплетающихся между собой волосковъ и, наконецъ, формой вѣнчика, разрывы долей котораго доходятъ почти до середины. У *C. Bayerniana* var. *Trautvetteri* листья съ сравнительно крупными неравными зубцами, чашелистники, также какъ и у типичной формы, широко-треугольные по краю съ загнутыми рѣсничками и сильно оттянутые въ длинное остріе; вѣнчикъ узко-колокольчатой формы, какъ напр. у *C. sibirica* L., изнутри сильно бородатый, благодаря массѣ длинныхъ переплетающихся между собою волосковъ. По краю вѣнчика, однако, у *C. Bayerniana* такіе длинные волоски отсутствуютъ, тогда какъ у *C. andia* они всегда имѣются, благодаря чему вѣнчикъ у послѣдняго вида по краю всегда бородатый.

Отъ типичной формы этотъ варьететъ отличается: густымъ жесткимъ

опушеніемъ всѣхъ частей растенія, не исключая и вѣнчика, полушаровидной трубкой чашечки и листьями, зубцы которыхъ шире и короче, чѣмъ у тина.

* 35. **C. Choziatowskyi** Fom. *glabra vel parce hirta, caulibus e rhizomate crasso caespitoso ascendentibus flexuosis parce ramosis multifloris, foliis crassiusculis in sicco coriaceis inferioribus longe petiolatis cordato-ovatis grosse et acute dentatis margine subrevolutis interdum remote rigide ciliatis caulinis ovatis basi subcordatis vel rotundatis breviter petiolatis margine acute dentatis, superioribus diminutis ovato-lanceolatis subsessilibus, floribus mediocribus coeruleis, pedunculis filiformibus flore brevioribus bracteolatis, bracteolis parvis lanceolatis vel lanceolato-linearibus, calycis glabri subrotati laciniis triangularibus acutis valde patentibus, appendicibus brevissimis, tubo calycino late obconico, corolla tubuloso-infundibuliformi basi contracta capsula intus dense barbata, stylo inclusio, receptaculo glaberrimo, exsula matura obconica, seminibus minutis ovatis fuscis nitidis turgidis*. *24. v. v. et s. in h. Th.*

Fom. in Act. Hort. Tiflis. VI. 3. p. 38.

Hab. in rupestribus regionis montanae Armeniae rossicae. — **X. A.** Эриванская губ., окрестности оз. Гокчи, берегъ р. Занги близъ сел. Арзакендъ. Хочятовскій¹⁾. Тамъ-же, на скалахъ въ трещинахъ. 4700'. 17. VII. 02. Оминъ!!

Примъч. Видъ этотъ впервые былъ найденъ И. Ф. Хочятовскимъ въ окрестности оз. Гокчи, берегъ р. Занги близъ сел. Арзакендъ. Собранные имъ экземпляры куда-то затерялись, такъ что видѣть ихъ мнѣ не удалось, но И. Ф. Хочятовскій далъ мнѣ точное указаніе мѣсто-нахождения этого вида, благодаря чему лѣтомъ 1902 года въ юлѣ я нашелъ это растеніе какъ разъ въ указанномъ мнѣ мѣстѣ. Отсюда я привезъ въ Тифлисскій Ботаническій Садъ и живыя растенія, которыя ежегодно тамъ цвѣтутъ.

C. Choziatowskyi по листьямъ очень напоминаетъ *Symphyandra armena* DC. и ближе всего стоитъ къ *C. Bayerniana* Rupr. и *C. Raddeana* Trautv., отъ которыхъ хорошо отличается трубчато-воронковиднымъ вѣнчикомъ, перетянутымъ у основанія, и колесовидной чашечкой, доли которой отогнуты почти горизонтально и лишены рѣсницъ.

* 36. **C. Massalskyi** m. *caulibus e rhizomate crasso pluricipiti pumilis tenuibus filiformibus flexuosis fragillimis breviter ramulosis sub lente patule pubescentibus 1—3-floris, foliis minimis crassiusculis inferioribus ovato-rotundis in petiolum attenuatis, caulinis orbiculato-vel ovato-subcordatis breviter petiolatis omnibus margine irregulariter denticulato-undulatis supra lacte viridibus velutino-pilosis, infra velutino-canis tomentosis, floribus parvis axillaribus terminalibusque longiuscule pedicellatis, calycis viridi-velutino-pilosi laciniis late triangularibus acutiusculis, sinubus reflexis vix appendiculatis, tubo calycino hemisphaerico, corolla tomentella anguste tubuloso-infundibuliformi calyce triplo vel quadruplo longiore, stylo inclusio, receptaculo glabro*. *24. v. s. in h. P.*

Hab. in rupestribus montium Armeniae rossicae. — **X. A.** Карсская обл., Кагызманскій окр., по р. Дигоръ-чай, Бешъ-килиса, по скаламъ. 7. VII. 86. Масальскій!

Примъч. Видъ, близкій къ *C. Bayerniana* Rupr. и *C. candida* DC. Отъ первой отличается: характернымъ опушеніемъ листьевъ, отсутствіемъ

1) См. прим. В. И. Линскаго, Фл. К. стр. 380.

по краю листьевъ длинныхъ острыхъ зубцовъ, короткими лишь слегка приостренными долями чашечки и отсутствіемъ по ихъ краю рёсничекъ. Отъ второй, какъ это видно изъ описанія Boiss. Flor. Or. III. p. 913 и A. DC. Monogr. Camp. p. 234, отличается формой листьевъ, а также и опушеніемъ ихъ. У A. DC. Monogr. Camp. l. cit. относительно *C. candida* сказано: „folia pallide incana superne potius sericea, subtus pubescentia“, а у нашего вида листья сверху свѣтло-зеленые бархатистые, снизу бархатисто-сѣро-войлочные. Присланный мнѣ для сравненія изъ Импер. Акад. Наукъ экземпляръ *C. argentea* Lam., собранный Бунге въ Персіи, отличается особенно сильно отъ *C. Massalskyi* т однообразнымъ, сѣрымъ войлочнымъ опушеніемъ, цѣльнокрайними лопатчатыми и линейно-ланцетными листьями и ланцетными чашелистиками.

Отъ *C. incanescens* Boiss., съ которой имѣетъ сходство въ формѣ листьевъ, отличается: формой чашелистиковъ широко-треугольныхъ, сразу коротко приостренныхъ, вѣнчикомъ трубчато-воронковиднымъ, который въ 4 раза длиннѣе чашелистиковъ и, наконецъ, мягкимъ бархатистымъ опушеніемъ листьевъ и чашечки. У *C. incanescens* листья и чашечка имѣютъ опушеніе изъ жесткихъ длинныхъ бѣлыхъ волосковъ, которые иногда настолько густы, что опушеніе листьевъ кажется бѣло-войлочнымъ.

Series VII. Heterophylla Nym.

Foliis surculorum steriliū, radicalibus caulinisque inferioribus diversis valde variantibus.

Nym. Consp. Flor. Europ. p. 479.

37. *C. rotundifolia* L. glabra vel parte inferiore tenuiter et breviter pubescens, rhizomate repente caudiculoso caules floriferos tenues 1-paucifloros surculosque steriles edente, foliis surculorum longe petiolatis reniformibus vel ovato-cordatis crenato-dentatis caulinis inferioribus late lanceolatis vel interdum ovato-lanceolatis crenato-serratis superioribus saepius sessilibus lineari-lanceolatis vel linearibus integris, floribus erectis longiuscule pedunculatis, calycis laciniis lineari-filiformibus patulis corolla turbinato-campanulata coerulea subduplo brevioribus, stylo incluso, receptaculo glabro, capsula nutante turbinata glabra, seminibus parvis ovato-oblongis turgidis fuscis non marginatis. *Ц.* v. v. et s. in herbariis Europ., Asiat. et Americ.

L. sp. 232. — A. DC. Monogr. Campan. p. 281. — DC. Prodr. VII. p. 471. — C. Koch, in Linnaea. XVII. p. 280. — Ledeb. II. p. 888.

— Boiss. III. p. 919. — Шмальг. II. стр. 176. — Линск. Фл. К. стр. 379. — Trautv. in A. H. P. VI. p. 78. — J. Witasek. Ein Beitrag zur Kenntn. der Gattung *Campanula* p. 11. Icon. Rechb. tab. 242. — Leon. Flor. Dan. 835.

Exsicc. Buhse. Herb. Flor. Ross. № 370! — Herb. Flor. Ingr. cent. III. № 391! — Herb. Est-, Liv- und Kurland. Girgensohn. № 476! — Ledeb. Herb. Flor. Alt! — Clements. Herb. Formation. Colorad. №№ 130, 203!

Hab. in Caucaso, Tscherkessia. C. Koch.

Ar. Geogr. Europa!, Asia septentrionalis!, America borealis!

Примѣч. C. Koch, p. 280. in Linnaea. XVII. указываетъ для Кавказа *C. rotundifolia* L. въ Черкесіи „In Cercetia (Tscherkessia)“, между тѣмъ Ледебуръ, Flor. ross. II p. 889, это показаніе К. Коха относитъ къ Сѣверному Кавказу (Kabarda). Это послѣднее мѣстонахожденіе повторяется со словъ Ледебюра и Траутфеттеромъ in A. H. P. VI. p. 80: „In Caucaso Kabardinico occurit“. Никто изъ позднѣйшихъ ботаниковъ этого вида на Кавказѣ не находилъ, поэтому показаніе C. Koch'a нуждается еще въ провѣркѣ.

* **var. *hirta*** Trautv. (non Mertens et Koch) caulibus foliis et sepalis hirtis. *℄. v. s. in h. P.*

Trautv. in A. H. P. VI. p. 79. sub var. *hirta* Mert. et Koch. Deutschl. Fl. II. p. 155.

Hab. in rupestribus angustiarum Darial Caucasi septentrionalis. —

S. T. На скалахъ Дарьяльскаго ущелья. 28. VII. 56. Лаговскій!

Примч. Въ гербаріи Траутфеттера подъ *C. rotundifolia* L. var. *hirta* лежатъ двѣ различныхъ формы. Первая съ этикеткой „на скалахъ въ Дарьяльскомъ ущельѣ“ представляетъ два неполные экземпляра и по своимъ признакамъ можетъ быть разсматриваема, какъ варьететъ *C. rotundifolia* L. Существенное отличіе этихъ экземпляровъ отъ типа заключается въ болѣе широкихъ ланцетныхъ верхнихъ стеблевыхъ листьяхъ и жесткомъ опушеніи всѣхъ частей растенія, исключая вѣичика. Цвѣтокъ также, какъ и у типичной формы, направленъ вверхъ, чашелистики также въ два раза короче вѣичика. Траутфеттеръ неправильно отнесъ эту форму къ var. *hirta* Mertens et Koch, такъ какъ послѣдніе понимали подъ этимъ варьететомъ только форму, у которой опушеніе въ нижней части стебля состояло изъ болѣе длинныхъ и жесткихъ волосковъ, чѣмъ у обыкновенной формы *C. rotundifolia* L. По поводу этого J. Witasek (l. cit. p. 20.) говоритъ слѣдующее: „Trautvetter fasst den Namen *C. „hirta“* also offenbar anders auf als Mertens und Koch. Nach seiner Beschreibung müsste im Kaukasus eine völlig behaarte Form der *C. rotundifolia* vorkommen.“ Хотя J. Witasek экземпляровъ изъ гербарія Траутфеттера не видѣла, тѣмъ не менѣе высказанное его предположеніе оказалось вѣрнымъ. Дѣйствительно, экземпляры Лаговскаго изъ Дарьяльскаго ущелья имѣютъ опушеніе на всѣхъ вегетативныхъ частяхъ растенія и по характеру опушенія отличаются отъ всѣхъ формъ *C. rotundifolia*, которыя мнѣ пришлось видѣть изъ Европы, Азіи и Сѣв. Америки. Видно, что и Траутфеттеръ колебался, прежде чѣмъ отнести экземпляры Лаговскаго изъ Дарьяльскаго ущелья къ *C. rotundifolia*, такъ какъ при этихъ экземплярахъ имѣется слѣдующая приписка его рукою: „Es scheint dass Reichenb. Icon. auf I, fig. 161, 162 eben diese Form als *Camp. pubescens* abgebildet hat. Auch Koch, Syn. Fl. Germ. p. 537. (sub *C. pusilla*) bringt diese Abbildung zu *C. rotundifolia*, während *C. pubescens* Schmidt zu *C. pusilla* gehört, welche eine corolla hemisphaerico-campiculata haben soll.“ На югъ Швейцаріи и въ верхней Италіи, какъ увѣряетъ J. Witasek (l. cit. p. 19.) встрѣчается форма *C. rotundifolia* съ густымъ опушеніемъ всѣхъ вегетативныхъ частей растенія, т. е. слѣдовательно такая-же, какъ и найденная Лаговскимъ въ Дарьяльскомъ ущельѣ на Кавказѣ.

Что касается второй формы съ берега озера Чалдырь-гѣль, то, на мой взглядъ, она ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть отнесена къ *C. rotundifolia* L., такъ какъ сильно разнится отъ нея формой листьевъ, попикающими цвѣтами, короткими чашелистиками и опушеніемъ. Прикорневые листья у этихъ экземпляровъ овально-сердцевидные городчато-зубчатые, стеблевые продолговатые или широко-ланцетные, оттянутые въ черешекъ и по краю съ закривленными зубчиками. Самые верхніе листья линейные съ отдаленными зубцами. Стебель, особенно въ нижней части, покрытъ бѣлыми сравнительно длинными волосками; листья въ нижней половинѣ, а равно и черешекъ по краямъ снабжены бѣлыми рѣсницами. По моему убѣжденію эта форма можетъ быть съ полнымъ правомъ отнесена къ *C. pusilla* Haenk. При сравненіи экземпляровъ Лаговскаго съ озера Чалдырь-гѣль съ гербарными экземплярами, недавно выписанной мной изъ за границы, *C. pusilla* Haenk. изъ южнаго Тироля (Herb. N. Eggers), оказалось, что послѣдніе отъ экземпляровъ Лаговскаго ничѣмъ не отличаются. Этотъ послѣдній фактъ, а также и нахожденіе въ коллекціи Лаговскаго другихъ западно-европейскихъ формъ, какъ *C. thyrsoides* L. и *Primula longiflora* All., присутствіе которыхъ на Кавказѣ никѣмъ, кромѣ Лаговскаго, не подтверждено, заставляють думать, что формы эти происходятъ изъ западной Европы и попали въ кавказскую коллекцію Лаговскаго случайно. Въ послѣдніе три года въ

С. у. Норманъ
Варваръ
Н. Кузнецовъ, Н. Бушъ, А. Фоминъ.

Flora caucasica critica.

МАТЕРІАЛЫ
для
ФЛОРЫ КАВКАЗА.

Критическое систематическо-географическое изслѣдованіе.

Вып. 12-ый.

A. Fomin
Campanulaceae обработать **А. Фоминъ.**

6-ой вып. IV-й части (листы 6—7).

P. Mischchenko
Lupcaseae обработать **П. Мищенко.**

4-ый вып. II-й части (листы 1—3).

Цѣна 50 коп.

Юрьевъ.

Типографія К. Маттисена.

1906.

765
LIBRARY OF THE GRAY HERBARIUM

HARVARD UNIVERSITY.

BOUGHT.

Предполагаемая программа всего изданія¹⁾ „Флоры Кавказа“:

Часть I-ая: **Cryptogamae** и **Gymnospermae**.

Вып. 1-ый: Filicales, Equisetales, Lycopodiales — **обрабатывается.**

2-ой: Coniferae, Gnetales — **обрабатывается.**

” II-ая: **Monocotyledoneae**.

Вып. 1-ый: Pandanales, Helobiae — **обрабатывается.**

2-ой: Glumiflorae — **обрабатывается.**

3-ий: Glumiflorae, Spathiflorae — **обрабатывается.**

4-ый: Liliiflorae — **печатается.**

5-ый: Microspermae — **обрабатывается.**

” III-ья: **Archichlamydeae** (Choripetalae et Apetalae):

Вып. 1-ый: Salicales, Juglandales, Fagales, Urticales, Santales, Aristolochiales — **обрабатывается.**

2-ой: Polygonales, Centrospermae.

3-ий: Ranales — **обработалъ Н. Бушъ.**

4-ый: Rhoecadales, Sarraceniales — **печатается.**

5-ый: Rosales — **обрабатывается.**

6-ой: Rosales — **обрабатывается.**

7-ой: Geraniales — **обрабатывается.**

8-ой: Sapindales (Celastrales), Rhamnales, Malvales.

9-ой: Parietales, Myrtiflorae — **обрабатывается.**

10-ый: Umbelliflorae — **обрабатывается.**

” IV-ая: **Metachlamydeae** v. **Sympetalae**:

Вып. 1-ый: Ericales, Primulales, Ebenales, Contortae **обработалъ Н. Кузнецовъ.**

2-ой: Tubiflorae — **обрабатывается.**

3-ий: Tubiflorae — **обрабатывается.**

4-ый: Tubiflorae, Plantaginales — **обрабатывается.**

5-ый: Rubiales.

6-ой: Campanulatae — **печатается.**

7-ой: Campanulatae.

1) Въ обработкѣ изданія этого въ настоящее время принимаютъ дѣятельное участіе или любезно изъявили свое согласіе на таковое участіе нижеслѣдующія лица: G. Beck von Mannagetta, Н. А. Бушъ, J. Velenovsky, Г. О. Вестбергъ, Ю. Н. Вороновъ, В. Б. Гриневскій, В. Л. Комаровъ, Н. П. Кузнецовъ, К. Ю. Купферъ, В. В. Марковичъ, Я. С. Медвѣдевъ, С. Н. Михайловскій, П. И. Мищенко, П. В. Паллбинъ, Р. Э. Регель, Б. А. Федченко, А. О. Флеровъ, Г. Г. фонъ Эттингенъ и А. В. Фоминъ.

Печатаніе вып. 4-го III-ей части — *Rhoecadales* Н. А. Буша и вып. 4-го II-ой части — *Liliiflorae* П. И. Мищенко производится по распоряженію Г. Уполномоченнаго Министра Землед. и Госуд. Имуществъ на Кавказѣ и выпускъ этотъ составитъ 9-й и 10-й выпуски Трудовъ Тифлискаго Ботаническаго Сада.

Кареской области велись весьма детальныя и обстоятельныя ботаническія изслѣдованія С. И. Михайловскимъ и Е. Г. Кёнигомъ, которые не могли найти примѣющихся въ коллекціи Лаговскаго изъ той мѣстности ни *C. thyrsoides* L., ни *C. pusilla* Haenke. Можно съ увѣренностью сказать, что ихъ тамъ нѣтъ.

Series VIII. Trachelioideae (Boiss.).

Caules elati. Flores racemosi, capsula nutans.

Boiss III. p. 894.

38. C. latifolia L. glabra vel pubescens caule obsolete angulato elato simplicifolioso in racemum foliosum abeunte, foliis *amplis hirtis ovato-lanceolatis acuminatis grosse duplicato-serratis inferioribus breviter petiolatis* interdum subcordatis, summis *oblongo-lanceolatis sessilibus*, floribus *magnis* in racemum dispositis, pedunculis solitariis axillaribus *erectis*, calycis laciniis *late lanceolatis acuminatis* margine ciliatis et interdum remote denticulatis, tubo hemisphaerico glabro vel plus minus albo-hispido 1 1/2—2-plo longioribus, corolla *magna* campanulata violacea ad tertiam partem fissâ ore barbata laciniis calycinis 3—4-plo longiore, stylo incluso, receptaculo glabro, capsula nutante *magna globosa* laciniis patulis calycis coronata, seminibus fuscis complanatis ovato-ellipticis anguste marginatis. **Ч.** v. et s. in h. A. P. M. J. S. Tm. Th. Fenn.

L. Sp. 233. — A. D. C. Monogr. Camp. p. 264. — D. C. Prodr. VII. p. 469. — M. B. Fl. taur.-cauc. III. p. 140. — Stev. in Mém. de la soc. de Natur. de Mosc. III. p. 255. — C. A. Mey. Verzeichn. d. Pflanz. d. Cauc. p. 84. — Hohenack. Enumer. Elisabethp. p. 221.; Enum. Talsch. p. 63. — C. Koch, in Linnaea XVII. p. 279. — Ledeb. II. p. 882. — Bunge, Plant. Abich. p. 13. (591). — Tchihatch. Asie Mineure. II. p. 397. — Rupr. Bull. de l'Acad. de sc. de St. Petersb. XI. p. 196 отд. отр. — Boiss. III. p. 921. — Trautv. in A. H. P. IV. I. p. 164.; VI. p. 72. — Шмалъг. II. стр. 178. — Ломак. Тр. Тифл. Бот. Сада. I. стр. 59; Фл. Караб. стр. 57. — Липск. Фл. К. стр. 379. — Radde Grundz. p. 194, 241, 365.; Mus. Cauc. II. p. 122. (partim). — Гринев. Резулт. двухъ ботан. путеш. стр. 53 и 126. — Бушъ. По горамъ и ущельямъ Хевсур. и Тумет. стр. 12, 51.

Syn. *C. Iberica maxima subhirsuta flore maximo coeruleo* Tourn. herb. cor. 4. (sec. A. D. C. I. cit.). — *C. macrantha* Fisch. Ined. (sec. A. D. C. I. cit.). — *C. eriocarpa* M. B. Fl. taur.-cauc. I. p. 149. — *C. urticifolia* M. B. Fl. taur.-cauc. I. p. 149. (partim)¹⁾. — *C. latifolia* L. varr. *leiocarpa, intermedia, eriocarpa* et *canescens* Trautv. in A. H. P. VI. pp. 72 и 73; IV. 2. p. 390. — *C. Trachelium* C. A. Mey. Verzeichn. der Pflanz. des Cauc. p. 84. — Radde Mus. Cauc. II. p. 122.

Icon. Rchb. Ic. Fl. Germ. tab. 238.!

Exsicc. Herb. Fl. Est-, Liv- und Kurland, № 471! — Herb. Flor. Saxon., legit Missbach.! — Fl. exsicc. Austro-Hungar. № 2985! — Кульковъ, Delect. plant. exsicc. Hort. Botan. Jurjew.!

Hab. in regione silvatica et subalpina totius Caucasi, 2500—7000'. —

S. K. Кубанск. обл., Хамышки, лѣсная зона. 30. VI. 88. Кэзпц.! (tubo calycino glabro, sepalis denticulatis). Подъемъ къ Кунскимъ полянамъ въ 8—10 верст. отъ Баговской, дубов. поясъ 15. VI. 99. Бушъ! (tubo calyc. glabro).

1) „In alpe Kaischaur Caucasi semel lecta“, M. B. I. cit.

Пихтово-елов. лѣса по р. Малой Лабѣ, между уроч. Затпшые и Умпырь. 21. VI. 99. Бушѣ! (specim. tubo calyc. glabro et parce pubescente). Березовый лѣсъ по р. Тебердѣ въ 5 верст. выше Хумары. 7. VII. 97. Бушѣ! (с. fruct. tubo calyc. glabro.). Влизъ Георгіевск. монастыря около Хумары, дубовый лѣсъ. 22. VI. 96. Бушѣ! (tubo calyc. parce pubescente). Между Сентами и Тебердинскимъ ауломъ, поясъ дубово-березоваго лѣса. 24. VI. 96. Бушѣ! (tubo calyc. glabro). Теберды. 11. VII. Липск.! (tubo calyc. parce pubescente). Кардтжуртъ. 5. VII. 90. Липск.! (forma foliis superioribus breviter petiolatis, tubo calyc. glabro, sepalis subdenticulatis). Карачай. 8. VI. 86. Сипягинѣ! (tubo calyc. hirsuto). — **S. Т.** Бештау. К. А. Мейеръ. Тамъ-же. Стевенъ. М. Биб. Гѣффтъ! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Тамъ-же. Гогенаккеръ! (tubo calyc. glabro). 19. VII. 67. Оверинѣ! (tubo calyc. glabro). Тамъ-же. 3000'. 20. VI. 84. Акинф.! (specim. tubo calyc. villosus et glabro). 2500'. 22. VI. 84. Акинф.! (tubo calyc. glabro). 2400'. 1. VI. 86. Акинф.! (tubo calyc. glabro). Тамъ-же, дубовый лѣсъ. 28. VI. 89. Кзнц.! (tubo calyc. glabro). Кисловодскъ, у Нарзана. К. А. Мейеръ. Тамъ-же. Стевенъ. М. Бибер. Тамъ-же. 11. VI. 94. Б. Федченко! (tubo calyc. hirsuto). Пятигорскъ. 1843. Коленати! (tubo calyc. glabro). Тамъ-же. 23. VI. 96. Литвиновъ! (tubo calyc. glabro). Лѣса у Желѣзноводска. 23. VI. 96. Литв.! (tubo calyc. glabro). Владикавказъ. 3000'. 10. VII. 88. Акинф.! (tubo calyc. glabro). Тамъ-же. V. 01. Н. Зейдлицъ! (tubo calyc. glabro). Окрестности Владикавказа, дача Попова. 15. VI. 94. Б. Федч.! (tubo calyc. glabro.). Влизъ Владикавказа. Лысая гора. 15. VI. 00. Левитскій! (tubo calyc. glabro). Влизъ Владикавказа, въ саду. V. 01. Н. Зейдлицъ! Чечия, Буртунай. VI. 94. Радде и Кёнигъ! (tubo calyc. parce hirsuto). — **A. W.** Кубанск. обл., Куржупъ близъ горы Оштень. 29. VI. 88. Кзнц.! (tubo calyc. parce hirsuto). Кубанск. обл., между Чернорѣчьемъ и горой Ахцархва, полоса березы и сосны. 14. VII. 88. Кзнц.! (tubo calyc. minute hirsuto). Подъемъ на гору Тхачъ, субальп. луга. 15. VI. 99. Бушѣ! (tubo calyc. glabro). По р. Умпырь, субальп. зона. 20. VII. 88. Кзнц.! (tubo calyc. glabro). Истоки р. Мзымты, на берегу озера Карадывачъ. 1. VII. 01. Гринев.! (tubo calyc. glabro). Субальп. лугъ на горѣ Ачишхо. 1. VII. 01. Гринев.! Абхазія, гора Чедымъ, въ субальп. регионѣ. 6000'. 28. VII. 88. Ивановъ! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Тамъ-же. VI. 93. Альбовъ! (tubo calyc. hirsuto). Гора Апшира, въ субальп. полосѣ. VII. 93. Альб.! (tubo calyc. hirsuto). Долина р. Чхалты, у подножія горы Хутый Малый. 2. VI. 02. Вороновъ! (tubo calyc. hirsuto). Самурзаканъ, хребтъ Охацкуэ, альп. луга. 1894. Альбовъ. Мастаканъ. 27. VII. 93. Радде и Кёнигъ! (tubo calyc. glabro). Кубанск. обл., субальп. лугъ подъ Клухорскимъ переваломъ. 18. VII. 97. Бушѣ! (tubo calyc. glabro). Тамъ-же, Клухорскій переваль. 2100—2200 m. 27. VIII. 90. Соммье и Левье. На хребтѣ Клычъ. 1500—1700 m. 26. VIII. 90. Соммье и Левье. — **A. М.** Мингрелія, гора Асхи. 9. VIII. 90. Кзнц.! (tubo calyc. parce hirsuto). Гора Квира. 1850 m. (№ 261). 1894. Альбовъ. Гора Кернахони. 6000'. (№ 251). 28. VII. 94. Альб.! (tubo calyc. hirsuto). Сванетія, на горѣ Тетенаръ, выше сел. Чолуръ, у р. Цхенисъ-цхали въ субальп. регионѣ. 2000 m. 1. VIII. 90. Сомм. и Лев.! (tubo calyc. glabro). Латпарскій пер. 2100 m. 4. VIII. 90. fl. fr. Сомм. Левье. На хребтѣ Утбири. 19. VIII. 90. fr. Соммье и Левье. Гурехевъ. fl. fr. Лойка. Осетія, въ лѣсахъ V. 92. Марков.!

(tubo calyc. glabro). По р. Цроу. 2.VII. 95. Марков! (tubo calyc. glabro). Военно-Осетинск. дор., у Мамиссона, горные луга. 7000'. VII. 97. Десулави! (tubo calyc. glabro). Осетия, луга по холмам, обращенным на сѣверъ близъ р. Гизеля, въ нижнихъ терассахъ близъ рѣчки. 28. V. 90. Кзизц! (tubo calyc. glabro). Осетия, между сс. Кожка и Ракн, у р. Диди-Ляхва. 19. VII. 81. Бротерусъ! (tubo calyc. glabro. № 586.). Гора Казбекъ, горные луга. 7000'. VII. 91. Десулави! (tubo calyc. glabro). Терская обл., перевалъ Бакъ-фонтанъ. 9. VIII. 97. Пурингъ! (tubo calyc. glabro). — **А. О.** Хевсурія, Ликокское ущелье, подъемъ къ сел. Кобуло. 30. VI. 03. Бушъ! (tubo calyc. glabro). Тушетія, правый склонъ ущелья Кахетинской Алазани, субальп. заросли березы и *Acer Trautvetteri* Med w. 24. VII. 03. Бушъ! (tubo calyc. glabro). Массарскій хребетъ Кахетинской Алазани, субальп. заросли березы и *Acer Trautvetteri* Med w. 24. VII. 03. Бушъ! (tubo calyc. glabro). Тифл. губ. Телавскій у., подъемъ на г. Больш. Андаразанъ. 10. VII. 98. Оом!! (tubo calyc. glabro). Кахетия, гора Хочаль-дагъ надъ Лагодехами. 7000'. 18. VII. 94. Пурингъ! (tubo calyc. glabro). Тамъ-же. 25. VII. 98. Оом!! (tubo calyc. glabro). Тамъ-же. 6000'. 12. VII. 00. Гринев! (tubo calyc. glabro). — **S. D.-К.** Бакинск. губ., Кубинск. уѣздъ, у дороги между Кюзунъ и Судуръ, субальп. луга. 6100'. 2. VII. 99. Алексѣенко! (tubo calyc. glabro). — **S. P.** Цхенись-цхали. Абихъ. Долина Ріона. Абихъ. Къ сѣв.-вост. отъ Кутанса, верхняя часть долины Ріона, Накерала. Радде! (tubo calyc. glabro). Батумск. обл., Арвинскій окр., сел. Накеравъ, въ ущельѣ между кустарниками. 7. VII. 04. Михайловскій! Абастуманъ. Абихъ. — **S. Ib.** Иберія, Вильгельмъ! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Коджоры, близъ Тифлиса. Смирновъ! (tubo calyc. hirsuto). Тамъ-же. 1878. Смирновъ! (tubo piloso in herb. Trautv. sub var. *intermedia* Trautv.). — **A. A.** Гурія, Нордманнъ! (tubo calyc. glabro). Зекарскій перев. VI. 75. Оверинъ! (tubo calyc. hirsuto). Тамъ-же. 27. VII. 86. Медвѣдевъ! (tubo calyc. hirsuto). Бывшая турецкая граница. VIII. 67. Радде! (tubo calyc. hirsuto). Аджарская граница. 7. VII. 74. Радде! (Horibus in uno specimine tubo calyc. glabro et parce hirsuto. In herb. Trautv. sub var. *intermedia* Trautv.). Аджарія. 7. VII. 71. Радде! — **X. A.** Близъ Ахалыха. Ивановъ! (tubo calyc. hirsuto). Саганлугскій хреб. Лаговскій! (tubo calyc. hirsuto, caulibus pubescentibus. In herb. Trautv. sub var. *canescens* Trautv.). Тамъ-же. Лаговскій! (tubo calyc. hirsuto). Окрестности оз. Гокчи, Дарачичагъ, ущелье Алибека. 24. VII. Теръ-Казаровъ! (tubo calyc. hirsuto). Тамъ-же. 24. VII. Теръ-Казаровъ! (tubo calyc. parce hirsuto). Арменія, Дарачичагъ. VIII. 37. К. Кохъ! (tubo calyc. hirsuto.). Тамъ-же. 6. VII. 71. Радде! (tubo calyc. hirsuto). Близъ оз. Гокчи, Чубухлы. 4. VII. 71. Радде! (tubo calyc. hirsuto). — **S. S.-К.** Мамутлы. Байернъ! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Боржомъ въ лѣсу по рѣчкѣ Недзвуркъ. 20. VI. 01. Мищенко! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Лѣсъ, деревня Гомна близъ Боржома. 30. VI. 01. Мищенко! (tubo calyc. hirsuto). Близъ Боржома. 8. VII. 87. Акинф! (tubo calyc. parce hirsuto). Бакурьяни. 14. VII. 88. Акинф! (tubo calyc. hirsuto). Тамъ-же. 6000'. 15. VII. 87. Акинф! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Тамъ-же. 25. VII. 00. Оом!! (tubo calyc. hirsuto). Гора Саріаль. Гогенаккеръ! (tubo calyc. glabro). Гора Цихи-Джвари. VI. 75. Радде! (specim. tubo calyc. glabro et hirsuto). Карабахъ, близъ

сел. Лишкѣ въ субальп. регионѣ. 25. VII. 03. Гриневецкій! (tubo calyc. glabro). Лѣсъ у сел. Хараръ. 19. VI. 95. Ломакъ! (tubo calyc. glabro.) Въ лѣсу на горѣ Кенесъ-дагъ. 11. VII. 44. Коленаги! (tubo calyc. glabro). — **S. L.** Талышъ, въ лѣсахъ 700—900 hex. К. А. Мейеръ. Близъ Ленкорани. Гогенаккеръ. Талышъ, Давара-Барнасаръ. V. 70. Радде! (tubo calyc. glabro). Лѣсъ у сел. Оранджъ. 4500'. 22. VI. 94. Ломакъ! (tubo calyc. glabro). Гермюшъ, лѣсъ. 30. VI. 80. Радде! (tubo calyc. glabro). — Кавказъ. Адамъ! (tubo calyc. hirsuto). Мусинъ-Пушкинъ! (tubo calyc. hirsuto). Тамъ-же. 1877. Вдовъевъ! (tubo calyc. glabro).

Ar. Geogr. Europ. media ab Anglia et Scandinavia ad Pyreneos, Italiam medium et Rossiam australem, Ural, Himalaya.

Примѣч. Кавказскіе экземпляры *C. latifolia* L. имѣютъ часто чашелистики, снабженные у основанія зубчиками, между тѣмъ какъ на экземплярахъ изъ Россіи такихъ зубчиковъ не наблюдается. Въ этомъ случаѣ кавк. экз. имѣютъ общее съ экземплярами западно-европейскими, у которыхъ имѣются подобные-же зубчики на чашелистикахъ. Какъ на особо отличительное свойство кавказскихъ экземпляровъ *C. latifolia* L. слѣдуетъ указать на опушеніе трубки чашечки, которое всетаки сильно варьируетъ. Формы съ голой и пушистой трубкой чашечки часто встрѣчаются въ одномъ и томъ-же мѣстѣ. Западно-европейскіе и русскіе экземпляры всегда лишены опушенія на трубкѣ чашечки. Къ сожалѣнію мнѣ не удалось видѣть экземпляровъ этого вида изъ Гималая, чтобы судить о томъ встрѣчается ли и тамъ подобное опушеніе на трубкѣ чашечки.

39. C. odontosepala Boiss. caulibus glabris erectis flexuosis simplicibus foliosis, foliis teneris praeter marginem ciliatum glabris vel interdum infra ad nervos parvis pilosis omnibus petiolatis a basi rotundata vel subcordata ovato-oblongis attenuato-acuminatis acutiuscule et ascendente-serratis, floribus omnibus axillaribus 1—2-nis pedicello recurvo calyce subbreviore suffultis, calycis laciniis lineari-lanceolatis vel linearibus patulis vel reflexis denticulatis breviter crispule ciliatis tubo glabro hemisphaerico duplo longioribus, corolla campanulata ad tertiam partem lobata ore barbata laciniis calycinis triplo longiore, capsula ovata nutante valvis basilariibus, seminibus fuscis oblongis marginatis. 24. v. s. in h. A. (herb. Alexeankoi).

Boiss. Diagn. Ser. I, 11, p. 66; Flor. Orient. III. p. 921. — Buhse, Aufzuehl. p. 143.

Hab. in regione silvatica ditionis Talysch Transcaucasiae austro-orientalis. — **S. L.** Талышъ около Ванардюнъ. 4000', и около Ахевларъ. VIII. 47. Бузе (№ 782). У р. Ленкоранъ-чай между сел. Рва и Тенгиванъ (Тангованъ). 2. VIII. 97. Алексѣенко! Между сел. Озбижанъ и Джангампанъ. 2300—4100'. 10. VIII. 97. Алекс!.

Ar. Geogr. Persia borealis.

Примѣч. Видъ близкій къ *C. latifolia* L., отъ которой отличается менѣе крупными цвѣтами, узкими ланцетно-линейными или линейными всегда зубчатыми чашелистиками при цвѣтеніи сильно отогнутыми назадъ и верхними стеблевыми листьями, которые всегда снабжены болѣе или менѣе длиннымъ черешкомъ. Отъ *C. rapunculoides* L. отличается извилистыми стеблями, пазушнымъ расположеніемъ цвѣтовъ, болѣе узкими и зубчатыми чашелистиками и длинными черешками стеблевыхъ листьевъ.

40. C. Trachelium L. parce strigosa caule argute angulato folioso simplicis vel ramuloso oblongo-racemoso vel stricte paniculato, foliis grosse et duplicato-dentatis piloso-scabris inferioribus longe petiolatis triangulari-

-cordatis caulinis triangulari-ovatis breviter petiolatis superioribus sessilibus oblongis vel late-lanceolatis acuminatis, floribus ad pedunculos breves axillares geminatis vel ternis et ad apicem cauli approximatis erectis, calycis laciniis erectis ovato-lanceolatis parce strigosis vel glabris tubo obconico-hemisphaerico duplo longioribus, corolla campanulata violacea ad tertiam partem in lobos ciliatos fissa, capsula reflexa ovoidea, seminibus fuscis ovato-oblongis compressis anguste marginatis. *℥. v. v. et s. in h. A. P. S.*

L. Sp. 235. — *A. D. C. Monogr. Campan.* p. 266. — *D. C. Prodr.* VII, p.

469. — *Ledeb.* II, p. 882. — *Trautv. in A. H. P.* p. 74. — *Boiss.*

III, p. 922. — *Шмальг. II. стр.* 177.

Syn. C. urticifolia Schm. — *M. B. Fl. taur.-cauc.* I, p. 149. (partim); III, p. 141.

Icon. Rchb. Ic. Fl. Germ. tab. 239!

Exsicc. Herb. Fl. Ingric. Cent. III. № 387!

Hab. in regione silvatica Caucasi septentrionalis. — **S. T.-N.** Крымъ. М. Биб. Крымъ, въ тѣнистыхъ лѣсахъ близъ Алушты, по дорогѣ къ Козмодемьянскому монастырю. 28. VII. 94. Алексѣенко! Въ лѣсу Козмодемьянскаго монастыря. 22. VII. 02. Гольде! Близъ Чатырдага, въ буковомъ лѣсу. 8. VII. 97. Гольде! Берегъ р. Авинды противъ Гурзуфа. 12. VII. 96. С. Ѳедосѣевъ! Чуфутъ-кале. 2. VII. 52. Чугаевичъ! Гора Чатырдагъ. Траутфеттеръ! Крымъ. Шмальгаузенъ. — **A. M.** Алагиръ, по теченію Ардона. Лаговскій!

Ar. Geogr. Europa omnis a Scandinavia ad Lusitaniam, Dalmatiam, Rossiam sept. et australem, Sibiria uralensis, Africa borealis.

Примѣч. М. Биберштейнъ указываетъ для Кавказа *C. Trachelium* L. (sub *C. urticifolia*) на горѣ Кайшауръ ошибочно, такъ какъ растеніе, собранное М. Биберштейномъ въ указанномъ мѣстѣ и хранящееся въ гербаріи Императорской Академіи Наукъ, есть ни что иное какъ *C. latifolia* L. изъ затѣннаго мѣста съ однимъ цвѣткомъ на стеблѣ. Что касается экземпляровъ д-ра Лаговскаго изъ Алагира, то они, дѣйствительно, представляютъ собой настоящую *C. Trachelium* L. Слѣдуетъ сказать, что находки Лаговскаго вообще мало надежны и вѣрѣе всего, что эти экземпляры не съ Кавказа. Изъ окрестностей Алагира я имѣлъ гербарій В. В. Марковича, въ которомъ находились всѣ рѣдкія и вулгарныя формы *Campanula* исключая, однако, *C. Trachelium* L.

41. C. rapunculoides L. radice repente stolonifera caule erecto teretiusculo folioso in racemum terminalem secundum abeunti, foliis setuloso-asperis inaequaliter serratis radicalibus longe petiolatis ovato-vel oblongo-cordatis, caulinis brevissime petiolatis vel subsessilibus oblongo-lanceolatis acuminatis, floralibus lanceolatis vel lineari-lanceolatis sessilibus, pedunculis solitariis axillaribus brevibus cernuis bracteolatis, calycis glabri vel hirti laciniis lanceolatis acuminatis patenti-reflexis tubo obconico sesqui vel duplo longioribus corolla caeruleo-violacea vel intense violacea infundibuliformi laciniis calycis triplo longiore ad tertiam partem in lobos ciliatos fissa. *℥. v. v. et s. in h. A. P. M. S. J. Tm. Th. Fenn.*

L. Sp. 234. — *A. D. C. Monogr. Camp.* p. 268. — *D. C. Prodr.* VII, p.

469. — *M. B. Fl. taur.-cauc.* I, p. 150; III, p. 141. — *C. A. Mey.*

Verzeichn. d. Pflanz. d. Cauc. p. 84. — *Eichw. Casp. cauc.* p.

22., 32. — *Hohenack. Enum. Elisabethpol.* p. 221; *Enum. Talysch.*

p. 63. — *Ledeb.* II, p. 883. — *Bunge, Plant. Abich.* p. (591).

13. — *Rupr. Bull. de l'Acad. d. sc. de St. Petersb.* XI, p. 197. отд.

отт. — *Tchihatsch. Asie Mineure.* II, p. 391. — *Boiss.* III,

p. 922. — *Trautv. in A. H. P.* II, 2, p. 564; IV, 1, p. 163; IV,

2, p. 390; VII, 2, p. 479; X, p. 121. (partim). — *Albow, Prodr.*

Fl. Colch. p. 160. — Шмалъг. II. стр. 177. — Ломак. Фл. Карабах. стр. 57. — Липск. Фл. К. стр. 379. — Somm. & Lev. in A. H. P. XVI. p. 325. — Radde, Grundz. p. 121, 163. — Гринев. Резулт. двухъ ботан. пут. въ 1900 и 1901 гг. стр. 53 и 126. — Бушъ. По горамъ и ущельямъ Хевсур. и Тушет. стр. 7, 11, 41.

Syn. *C. rapunculoides* L. var. *glabrata* Trautv. in A. H. P. VI. p. 75. — Ломак. Труд. Тифл. Ботан. Сада I. стр. 59. — *C. rapunculoides* L. var. *trachelioides* Trautv. (partim) in A. H. P. VI. p. 75 et in herbariis. — *C. dumetorum* Boiss. (sec. Boiss. l. cit.).

Icon. Ic. Fl. Dan. tab. 1327. — Rehb. Icon. Fl. Germ. tab. 239.!

Exsicc. Annenkoff. Fl. Mosquen. exsicc.! — Herb. Flor. Ingric. Cent. III. № 383! — Jacobson Herb. Fl. Est. Liv- & Kurland. № 473! — H. Magnusson. Herb. Fl. Suecie.!

Hab. in lapidosis, ruderatis, pratis regionis silvaticae et subalpinae Caucasi usque ad 8000'. — **St. A.** Ставрополь. Гѣффтъ! (caule et calyce glabris). Пелагеада близъ Ставрополя. VII. 89. Акинф.! (caule pubescente calyce minute hirta). — **S. K.** Крымская. 8. VI. 91. Липск.! (caule et calyce glabris). Кубанск. обл. по р. Кубани. 15. VII. Полторацкй! (caule pubescente, calyce hirta). Кубанская обл. Гурійская стан., дубовый лѣсъ. 15. VI. 89. Кзнц.! (caule et calyce glabris). Близъ Екатеринодара $\frac{1}{2}$ V. Дейнега! (f. umbrosa caule pubescente, calyce hirta). Горячій Ключъ. 11. VI. 88. Кзнц.! (caule et calyce glabris). Армавиръ. 19. VI. 90. Липск.! (caule parce pubescente, calyce hirta). Невинномысская. 13. VI. 90. Липск.! (caule pubescente, calyce hirta). Стан. Даховская. 4. VII. 89. Кзнц.! (caule glabro, calyce hirta). Ново-Аеонск. монастырь близъ стан. Даховской. 5. VII. 89. Кзнц.! (caule pubescente, calyce hirta). Пихтово-еловые лѣса по р. Абаго и по хребту, ограничивающему его ущелье съ восточной стороны. 29. VII. 99. Бушъ! (caule basi dense pubescente apice glabro, calyce glabro). Псебай. 11. VII. 89. Кзнц.! (caule glabro, calyce hirta). Между Бурнымъ и казеннымъ домомъ на М. Лабъ около Псебая, Шахгиреевское ущелье, дубовые лѣса. 28. VI. 99. Бушъ! (caule glabro, calyce hirta). Ущелье Закана, поляны въ хвойномъ лѣсу. 4. VII. Бушъ! (caule apice glabro et calyce glabro). Баталпашинскъ. 2. VII. 90. Липск.! (caule glabrescente, calyce hirta). Тамъ-же. 2. VII. 90. Липск.! (caule apice albo-setoso, calyce hirsuto ∞ var. *trachelioides* D. C.). Между р. Индишъ и Хумаринскимъ укрѣпленіемъ. Соммье и Левье. Ущелье р. Аксаута отъ устья Б. Маркй вверху до мѣста слиянія обонхъ истоковъ. 23. VII. 96. Бушъ! (caule et calyce glabris). Восточный склонъ Аксаута-Марухекаго хребта, сосновый лѣсъ. 22. VIII. 97. Бушъ! (caule et calyce glabris). Подъемъ въ верховья р. Уллу-Мурутчу, притока Теберды, сосновый лѣсъ. 15. VII. 97. Бушъ! (caule parce pubescente, calyce hirta). Долина р. Теберды близъ Тебердинскаго аула. 11. VII. 97. Бушъ! (caule albo-setoso, calyce hirsuto ∞ var. *trachelioides* D. C.). Сорныя растенія въ пшеничныхъ поляхъ около аула Доуга. 14. VIII. 97. Бушъ! (caule glabro, calyce hirta). Учкуланъ. 13. IX. 90. Соммье и Левье (н., caule et calyce glabris). Карачай въ лѣсахъ и ущельяхъ. 4. VI. 84. Сиягинъ! (caule parce pubescente, calyce hirta). Около естественнаго моста черезъ р. Уллукамъ, немного выше устья Узункола. 9. VIII. 97. Бушъ! (caule et calyce glabris). Сосновые лѣса по р. Узунколу, лужайки среди лѣса. 3. VIII. 97. Бушъ! (caule et calyce glabris). Долина р. Уллукама между устьями рр. Кички-

не-кола и Черю-кола. 8. VIII. 97. Бушъ! (caule pubescente calyce hirt). — **S. T.** Желъзноводскъ. 27. VI. 84. Акинф.! (caule parce pubescente, calyce minute hirt). Бештау. 1. VIII. 1829. К. А. Мейеръ! (caule pubescente, calyce minute hirt). Тамъ-же. 19. VII. 67. Оверинъ! (specim. caule et calyce glabris vel parce pilosis). 1867. Беккеръ! (caule parce pubescente calyce minute hirt). Тамъ-же. 31. VII. 89. Акинф.! (caule glabro, calyce minute hirt). Близъ Пятигорска. 2. VII. 43. Коленати! (caule glabro, tubo calycino minute hirt, sepalis hirsutis). Кисловодскъ. VII. 86. Акинф.! (caule et calyce glabris). Тамъ-же по рѣчкѣ Ольховкѣ. 28. VI. 86. Акинф.! (caule parce pubesc., calyce minute hirt). На лугахъ у рѣчки Кичмалки. 30. VI. 1829. К. А. Мейеръ! (floribus majoribus, caule parce pubescente, calyce minute hirt). Терек. обл. Незлобная, лѣсъ по правому берегу Подкумка. 23. VI. 89. Кзнц.! (caule pubescente, calyce hirt). Близъ Нальчика въ заросляхъ облъпихи. 24. VII. 89. Кзнц.! (caule pubescente, calyce hirt). Алагиръ, по лугамъ и между кустарниками. 23. VI. Левитскій! (caule et calyce glabris). У р. Баксана. 3000'. 15. VII. 96. Алекс.! (caule parce pubescente, calyce hirt). Близъ ст. Баксанская. 1500'. 14. VII. 96. Алекс.! (caule pubesc., calyce hirt). Въ долину Баксана, выше аула Урусбиева. 18. VII. 89. Кзнц.! (caule parce pubesc., calyce hirt). Урусбиево. 16. VII. 96. Акинф.! (caule et calyce glabris). Близъ Владикавказа. VII. 01. Н. Зейдлицъ! (caule pubescente, calyce hirt). Тамъ-же. VII. 01. Н. Зейдлицъ! (caule glabro, calyce dense hirt, floribus parvis). Чечня, Шатой. 10. VII. 94. Радде и Кёнигъ! (caule et calyce glabris). Озеро Эзень-амъ, субальп. поясъ. 6500'. 29. VII. 04. Бушъ! (caule glabrescente, calyce hirt). Качкалинновскій хребетъ надъ р. Мичикъ. Лаговскій! (caule et calyce glabris; in herbario Trautvetteri sub var. *glabrata* Trautv.). — **X. D.** Дагестанъ, Хунзахъ. 5500—6000'. 29. VII. 85. Радде! (caule apice setoso, tubo calycino glabro, sepalis hirsutis ∞ *trachelioides* DC.; in herbario Trautvetteri sub var. *glabrata* Trautv.). Микра. 29. VI. 85. Радде! (caule glabro, calyce hirt; in herbario Trautvetteri sub var. *trachelioides* Trautv.). Тамъ-же. 29. VI. 85. Радде! (caule glabro, tubo calycino minute hirt, sepalis hirsutis ∞ var. *trachelioides* DC.). Турчи-дагъ. Лаговскій! (specim. caule et calyce glabris vel calyce minute hirt; in herbario Trautvetteri sub var. *glabrata* Trautv.). — **S. D.-K.** Окрестности Темиръ-Ханъ-Шуры. 20. VI. Анисимовъ! (caule parce pubesc., calyce parce hirt). Даргинскій окр. въ Дагестанѣ, близъ сел. Леваша между посѣвами. 3700'. 2. VII. 98. Алекс.! (caule pubescente, calyce parce hirt). Даргинск. окр., близъ сел. Мургукъ. 2700'. 7. VII. 98. Алекс.! (caule glabro, calyce hirt). Близъ сел. Маджалисъ. 1872. Беккеръ! (caule parce pubescente, calyce parce minute hirt; in herbar. Trautvetteri sub var. *trachelioides* Trautv.). Даргинск. окр., Гумра-дузь, между Акуша и Муги (Меге). 4900'. 14. VII. 98. Алекс.! (caule et calyce glabris). — **A. W.** Черкесія, гора Фиштъ, на скалахъ, 1900 м. 1893. Альбовъ. (№ 518) п. v. Гора Ахача, альп. луга. 1894. Альбовъ. п. v. Хребетъ Атѣжэрта, альп. луга. 1894. Альбовъ. (forma paniculata) п. v. Абхазія, гора Копеймье, альп. луга. 1894. Альбовъ. п. v. — **A. M.** Балкарія. Зигитиль. 4000'. 28. VII. 93. Акинф.! (caule et calyce glabris). Военно-Осетинск. дор. 16. VI. Ариольди! (f. ramosa caule glabro, calyce hirt). Мингрелія, гора Квира, хвойный лѣсъ. 16. VIII. 90. Кзнц.! (caule pubesc., calyce glabro). Въ тѣнистыхъ заросляхъ по берегу горнаго

ручья между ауломъ Лешамуги и горою Квира. 17. VIII. 90. Кэнц.! (caule et calyce glabris). Осетія. Г. Бузовникортъ. 10. VI. 97. Марков.! (caule glabro, tubo calycino glabro, sepalis hirtis). Сел. Нхой по дорогѣ на опушкѣ лѣса. 14. VII. 96. Марков.! (caule et calyce glabris). По дорогѣ къ Святому лѣсу. 26. VII. 95. Марков.! (caule et calyce hirtis). Ленскортъ. VI. 92. Марков.! (caule et calyce glabris) По дорогѣ на Сурхъ. 1. VIII. 95. Марков.! (caule glabro, calyce hirtis). Уроч. Комъ въ Дигорин. 3. VIII. 95. Марков.! (∞ var. *trachelioides* DC.; caule parce albo-setoso, bracteis et sepalis valde albo-setosis, tubo calycino hirtis). Заросли кустовъ по Ардону. 24. VII. 95. Марков.! (specim. caule et calyce glabris vel calyce hirtis). Въ окрестности горы Кайшауръ. 5400'. 20. IX. 60. Рупр.! (f. uniflora, caule et calyce glabris) Кайшауръ. Вильгельмсъ! (caule et calyce glabris). — **А. О.** Пшавія, по р. Пшавской Арагвѣ, бл. уроч. Ори-цхалн. 27. VI. 03. Бушъ! (caule glabro, calyce parce hirtis). Тушетія, субальп. луга между сел. Чиги и Дартло. 19. VII. 03. Бушъ! Дагестанъ, Андійскій окр. между Гимерсу и Тлибюши, переваль. 24. VII. 04. Бушъ! (caule glabro, tubo calycino glabro, sepalis hirsutis). Между Тляиздинскимъ хуторомъ и с. Сагада. 20. VII. 04. Бушъ! (caule apice glabro, calyce glabro). Между сел. Сагада и Куайни, верхн. часть соснового пояса. 21. VII. 04. Бушъ! (specim. caule parce setoso, calyce glabro et ∞ var. *trachelioides* DC.). Субальпійскіе луга между переваломъ изъ Китурн и сел. Кидеро. 10. VII. 04. Бушъ! (caule glabro, calyce hirtis) Верхняя часть пояса сосны между Кодорскимъ переваломъ и Хупро. 18. VII. 04. Бушъ! (caule et calyce glabris). Кахетія, гора Хочаль-дагъ надъ Лагодехами „Лысая гора“. 6000'. 18. VII. 94. Пурингъ! (caule et calyce glabris). Тамъ-же, субальпійскіе луга. 6500'. 16. VI. 98. Ом.!! (caule et calyce glabris). 24. VI. 98. Ом.!! (caule glabro, calyce hirtis). Южный Дагестанъ въ направленіи истоковъ р. Самура, Куссуръ. 6600'. 15. VII. 60. Рупр.! (caule parce pubescente, calyce hirtis vel parce hirtis). На горѣ Калай ниже 4058'. VII. 60. Ходзько! (specim. caule glabro vel pubescente, calyce hirtis). У подножія горы Сарн-дагъ. 7080—7140'. 24. VII. 60. Рупр.! (caule parce pubescente, tubo calycino parce hirtis, sepalis hirsutis). Ниже горы Динди-дагъ у р. Мухахъ, въ лѣсномъ регионѣ. 3900'. 30. VII. 60. Рупр.! (caule glaberrimo, foliis grosse biserratis, calyce glabro). Елисаветпольск. губ., гора Салаватъ въ Нухинскомъ уѣздѣ. 13. VIII. 43. Коленати! (caule et calyce glabris). Нухинскій уѣздъ, у р. Ятухъ-чай (Бумъ-чай), въ лѣсномъ регионѣ. 6700'. 28. VII. 99. Алексѣенко! (caule glabro, calyce parvissime hirtis). Близъ сел. Ахты. 1874. Беккеръ! (caule glabro, calyce minute hirtis; in herbario Trautvetteri sub var. *trachelioides*). Между с. Курушъ и Ахты. 29. VI. 85. Радде! (caule glabro, calyce hirtis; in herb. Trautvetteri sub var. *trachelioides*). Крысь. 1873. Беккеръ! (caule glabro, calyce hirtis; in herb. Trautvetteri sub var. *trachelioides*). Бакинск. губ., Кубинск. уѣздъ на отвѣсныхъ скалахъ ущелья Хандикъ-дере, къ югу отъ сел. Хиналугъ. 7600'. 22. VIII. 00. Алекс.! (caule parce pubescente, calyce hirtis). Бакинск. губ., Шемахинск. уѣздъ, близъ сел. Алты-агачъ, у г. Дибраръ въ лѣсу. 4100'. 25. VII. 00. Алекс.! (caule glabro, calyce parce minute hirtis). — **S. T.-N.** Крымъ. М. Бибер. Новороссійскъ. 25. VI. 93. Радде и Кёнигъ! (caule et calyce glabris). — **S. P.** Ущелье р. Клычъ. 5600'. VII. Альб.! (caule et calyce glabris). Переваль Ачавчара. 4500'. X. Альб.! (caule et calyce

glabris). Калдахвара, ущелье р. Бзыби. VI. Альб.! (caule glabro, calyce hirtio). Сухумъ. XII. Прянишниковъ! (caule glabrescente, calyce glabro). Тамъ-же. 4. IV. Прянишн.! (caule pubescente, calyce glabro). Тамъ-же. VI. 88. Ивановъ! (caule et calyce glabris). 9—12. V. 88. Татаринновъ! (caule parce pubescente, calyce glabro). 20. XI. Радде! (caule et calyce glabris). VII. Альб.! (caule et calyce glabris). Цебельда, при поднятіи на гору Апанча. 2500—3000'. 24. VII. 68. Шперкъ и Рейнгардтъ! (caule basi hirtio, calyce glabro). Лѣсъ по дорогѣ къ Маяку. VI. 68. Шперкъ и Рейнгардтъ! (caule parce pubescente calyce glabro). Цебельда близъ сел. Юрьевского. 14. VI. 01. Вороновъ! (caule glabro, calyce minute hirtio). Сванетія, сел. Чолуръ. 31. VII. 90. Соммъ и Левье. (п. v.). Кутанская губ. между Кутансомъ и ст. Ріонъ Закавк. жел. дор., кустарный дубнякъ. 11. VI. 95. Бушъ! (caule et calyce glabris). Имеретія, Тола близъ р. Ріона. VI. 77. Бротерусъ! (caule parce pubescente, calyce glabro). Сел. Меквена. VI. 77. Бротерусъ. (п. v.) Цесн, у Ріона. VI. 77. Бротерусъ. (п. v.). Низовья р. Джихвели. 4. VI. Ломакинъ! (caule pubescente, calyce minute hirtio) Аргвети. 4. VI. Ломак.! (caule parce pubesc., calyce minute hirtio). Ущелье Годоры въ срединѣ чащи. 9. X. Ломак.! (caule et calyce glabris). Сахлари. 27. VI. Ломак.! (caule glabro, calyce minute hirtio). Кнцхи. 28. V. Ломак.! (caule et calyce glabris). Батумская обл., Арвинъ. 1882. Петерсонъ! (caule glabro, calyce hirtio). Тамъ-же. 13. V. 93. Радде и Кёнигъ! (caule et calyce hirtis). Тамъ-же. 31. VI. и 9. VII. 04. Михайловскій! (caule parce hirtio, calyce dense hirtio). — **S. lb.** Карталинія, Гори. VII. 81. Бротерусъ! (№ 584 caule et calyce glabris). Грузія, Пассанауръ. 3300'. 12. IX. 60. Оверинъ! (caule parce pubescente, tubo calyceino hirtio, sepalis hirsutis). Тамъ-же, южный склонъ горъ среди мелкаго дубняка. 25. VI. 90. Кзнц.! (caule et calyce glabris). Буковый лѣсъ на восточн. и сѣверо-восточн. склонахъ у устья р. Чурты. 10. VII. 90. Кзнц.! (caule et calyce glabris). Тифлисск. губ., въ хлѣбахъ близъ аула Лекуани между Лафо и Кеаномъ. 15. VII. 90. Кзнц.! (caule glabro, calyce parce hirtio). Рѣка Кеанъ у монастыря, дубовый лѣсъ. 13. VII. 90. Кзнц.! (caule et calyce glabris) Тіонетскій уѣздъ, Земо-Тіонети, окраина поля. 26. VI. 03. Бушъ! (caule parce hirtio, calyce hirsuto). Мцхстъ. 4. VII. 94. Б. Федченко! (с. fruct., capsula glabra). Монастырь св. Антонія въ 25 верстахъ отъ Тифлиса. 29. VII. 03. Роопъ! (∞ var. *trachelioides* DC., caule parce setoso, calyce hirtio). Тамъ-же. 29. VII. 03. Роопъ! (caule glabro, calyce hirtio). 7. VIII. 00. Роопъ! (caule et calyce glabris). Тамъ-же. 7. VIII. 00. Роопъ! [∞ var. *cordifolia* (C. Koch) m., caule et calyce glabris]. Тифлисъ, гора Св. Давида. 30. V. 63. Оверинъ! (caule glabro, calyce minute hirtio) Тамъ-же. Вильгельмсъ! (caule et calyce glabris, floribus longe pedicellatis). Тамъ-же. 17. VI. 89. Липск.! (caule et calyce glabris, foliis caulinis subcordatis). Буковый лѣсъ въ ущельѣ р. Чельти, путь отъ перевала Ниникосъ-цихе въ сел. Шильди. 14. VII. 04. Бушъ! (specim. caule et calyce glabris vel calyce hirtio). Кахетія, Чіаури. 4. VII. 94. Романовскій! (caule glabro, calyce hirtio). Кахетія, Лагодехи, лѣсъ. VI. 98. Том.! (caule et calyce glabris). Тамъ-же въ лѣсу. 5. VII. 00. Гриневъ! (caule parce hirtio, calyce glabro). Бакинск. губ., Геокчайскій уѣздъ, у истоковъ р. Геокчай въ тѣнистыхъ буковыхъ лѣсахъ. 5500'. 22. VIII. 00. Алекс.! (caule glabro, calyce hirtio). Бакинск. губ., Шемахинск. уѣздъ, на сѣверномъ

склонъ ущелья выше сел. Мюджи въ лѣсу. 3900'. 30. VII. 00. Алекс.! (caule et calyce glabris). Тамъ-же на известковыхъ скалахъ южнаго склона близъ сел. Мюджи. 4100'. 30. VII. 00. Алекс.! (с. fruct. et flor., caule glabro, calyce parce hirtio). На склонахъ горы Ниятъ выше сел. Царнова, на лугахъ у границы лѣса. 5900'. 31. VII. 00. Алекс.! (caule glabro, calyce hirtio). — **St. Tr.** Эльдарская степь Тифлесской губернии. 11. VIII. 94. Пурингъ! (caule et calyce glabris). Елисаветполь. Гогенаккеръ! (caule pubescente, calyce hirtio, sepalis hirsutis). — **S. L.** Талышъ, ущелье Тенгъ. 25. VI. 80. Радде! (caule pubescente, calyce hirtio; in herb. Trautvetteri sub var. *trachelioides*). Близъ сел. Орандъ между посѣвами. 5500'. 5. VIII. 97. Алекс.! (с. fruct., caule et capsula glabris). Среди посѣвовъ пшеницы между с. Орандъ и г. Мара-юртъ. 6000'. 24. VI. 94. Ломак.! (caule et calyce hirtis). Нагорная степь между сс. Амурать и Дыгы. 4000'. 12. VI. 94. Ломак.! (caule glabro, calyce glabro, sepalis margine interdum pilis longis obsitis). — **A. A.** Аджарія по склонамъ горъ близъ Лазистана. 15. VIII. 85. Масальскій! (caule glabro, calyce parce hirtio). Хула. 24. VI. 90. Соммье и Левье. (n. v.) (calyce parce pubescente). — **X. A.** У р. Уравель-су. VII. 72. Оверинъ! (specim. caule basi hirtio apice glabro, calyce hirtio; in herb. Trautvetteri sub var. *trachelioides*). Высоты надъ Карсомъ. 4. VII. 55. Лаговск.! (caule glabro, tubo calycino parce hirtio, sepalis glabris; in herb. Trautvetteri sub var. *glabrata* Trautv.). Каресская обл., ставка Мапра. 15. VI. Гораннъ! (caule glabro, calyce hirtio). Ольтинскій окр., Тамрутъ. 13. VII. 03. Кёнигъ! (caule glabrescente, calyce hirtio). Сакаль-Тутанъ. 13. VII. 03. Кёнигъ! (caule et calyce hirtis). Эржукъ. 13. VII. 03. Кёнигъ! (caule parce hirtio, calyce hirtio). Между Кяхъ и Олоръ. 16. VII. 03. Кёнигъ! (caule et calyce hirtis). Между Таускеръ и Кяхъ. 16. VII. 03. Кёнигъ! (caule et calyce hirtis). Агундиръ. 17. VII. 03. Кёнигъ! (caule glabro, calyce minute hirtio). Саракамышъ, около Саганлуга. 7000'. Масальск.! (caule et calyce glabris). Каргызманск. окр., Дигоръ-чай, на лугахъ. 8. VII. 86. Масальск.! (caule glabro, calyce hirtio). Алагезъ, ущелье Манташъ-дара. 23. VII. Хоцятовск.! (caule glabro, calyce minute hirtio). Башъ-Абаранъ. 31. VII. и 3. VIII. Хоцятовск.! (caule glabro, calyce hirtio). Ущелье Кабахлу. 10. VIII. Хоцятовск.! (caule glabro, calyce hirtio). Абаранъ, ущелье Каранлугъ. 5. VIII. Хоцятовск.! (caule glabro, calyce hirtio). Берегъ оз. Гокчи. VII. 75. Радде! (caule apice parce setis albis obsito, calyce hirtio ∞ var. *trachelioides* DC.). Тамъ-же. VII. 75. Радде! (caule pubescente, calyce glabro). Берегъ Гокчи, Еленовка. 23. VII. 56. Оверинъ! (caule parce pubescente, calyce hirtio). Беченагъ. VI. 71. Радде! (caule parce pubescente, calyce hirtio). Усугупи. 9. VI. 90. Радде! (caule parce pubescente, calyce hirtio). — **S. S.-K.** Табицхурское озеро. 6700'. 9. VII. 88. Акинф.! (caule pubescente, calyce minute hirtio). Бакурьяни. 6000'. 15. VII. 87. Акинф.! (∞ var. *trachelioides* DC., caule glabro, calyce minute hirtio et setis albis parce obsito). Тамъ-же. 7. VII. 88. Акинф.! (caule glabro, calyce minute hirtio). 15. VII. 03. Акинф.! (caule pubescente, calyce hirtio). 14. VII. 01. Мищенко! (caule apice glabro, calyce glabro). Боржомъ. VI. 65. Радде! (caule et calyce glabris). Тамъ-же. 13. VI. 65. Радде! (caule parce pubescente, tubo calycino minute hirtio, sepalis hirsutis). 17. VI. 65. Радде! (caule et calyce glabris; in herb. Trautvetteri sub var. *glabrata* Trautv.). Тамъ-же. 13. VI. 65. Радде! [∞ var. *cordifolia* (C. Koch) m., caule et calyce glabris, foliis

caulinis subcordatis; in herb. Trautvetteri sub var. *glabrata* Trautv.]. Тамъ-же. VII. 88. Акинф.! (caule et calyce glabris). 22. VII. 94. Б. Федченко! (caule et calyce glabris). Тамъ-же. 25. VI. 00. Роопъ! (∞ var. *trachelioides* DC., caule glabro, calyce minute hirto et parce setis albis obsito). Окрестности Боржома, Малая Митарба, лѣсъ. 14. VII. 01. Мищенко! (caule glabro, calyce hirto). Тамъ-же, деревня Гомна. 31. VII. 01. Мищенко! (caule et calyce glabris). Черная рѣчка, лѣвый берегъ на скалахъ. 16. VII. 01. Мищенко! (caule glabro, calyce hirto). Ликани. 15. VII. 87 и 28. VII. 88. Акинф.! (caule glabro, calyce minute hirto). Тамъ-же. 10. VII. 01. Мищенко! (specim. caule glabro, calyce hirto vel glabro). Манглисъ, Тифлесск. губ., правый берегъ р. Алгети, 23. VII. 00? Herb. Hort. Jurjev.! (caule et calyce glabris). Коджоры. 1878. Смирновъ! (caule et calyce glabris; in herb. Trautvetteri sub var. *glabrata* Trautv.). Тамъ-же. 1878. Смирновъ! (∞ var. *cordifolia* (C. Koch) m., caule glabro calyce minute hirto; in herb. Trautvetteri sub var. *trachelioides*). Тамъ-же. 17. VI. 89. Липск.! [caule et calyce glabris, foliis caulinis subcordatis ∞ *cordifolia* (C. Koch) m.]. Еленендорфъ. № 1337. Гогенаккеръ! (caule et calyce hirtis). Гора Сариаль. 29. VII. 44. Коленати! (caule parce pubescente, tubo calycino minute hirto, sepalis hirsutis). Деревня Ташкентъ. Гогенаккеръ! (caule parce pubescente, calyce minute hirto). Шуша. Гогенаккеръ! (caule glabro, calyce parce hirto). Карабахъ, субальп. дуга горы Кымбилъ. 7000'. 2. VII. 03. Гриневецкій! (caule pubescente, calyce hirto). На опушкѣ лѣса близъ Тативъ. 5000'. 4. VII. 03. Гриневъ! (caule parce pubescente, calyce minute hirto). — Кавказъ. Ганзенъ! (caule glabro, calyce hirto).

Ar. Geogr. Europa borealis! et media usque ad Hispaniam et Italiam medias, Rossia media et australis!, Sibiria uralensis.

Примѣч. *C. rapunculoides* L. на Кавказѣ чрезвычайно варьируетъ въ своихъ признакахъ, на что еще раньше обратилъ вниманіе Рупрехтъ (см. Bull. de l'Acad. d. sc. de St. Petersburg. XI. p. 196—197.). Эти индивидуальныя варіаціи объясняются тѣмъ, что *C. rapunculoides* L., представляя собою сорное растеніе, попадаетъ на Кавказъ въ различныхъ условіяхъ какъ климатическихъ, такъ и почвенныхъ, что, конечно, влечетъ за собою различныя измѣненія. Между всѣхъ формъ этого вида рѣзко выдѣляются два варьетета, признаки которыхъ всегда постоянны — это var. *trachelioides* DC. и var. *cordifolia* (C. Koch) m. Первый варьететъ свойственъ главнымъ образомъ степямъ, второй встрѣчается преимущественно въ Западномъ Закавказьѣ и въ мѣстностяхъ съ климатомъ переходнымъ отъ климата Западнаго Закавказья къ климату Восточнаго Закавказья, какъ напр. Боржомъ или западная часть Кахетіи. Варьированіе (variatio) у типичной формы сказывается главнымъ образомъ въ опушеніи стебля и чашечки, въ вѣтвленіи цвѣточной кисти, большемъ или меньшемъ количествѣ цвѣтовъ на стеблѣ, въ большей или меньшей длинѣ черешковъ у стеблевыхъ листьевъ. Эти варіаціи весьма часто стоятъ въ ближайшей зависимости отъ экспозиціи растенія: отъ произрастанія на солнечныхъ мѣстахъ или въ тѣни, на жирныхъ почвахъ или на сухихъ скалахъ и каменистыхъ участкахъ и т. д. Траутфеттеръ различалъ два варьетета: var. *glabrata* съ голой трубкой чашечки и var. *trachelioides* съ болѣе или менѣе опушенной трубкой чашечки. Къ этому послѣднему варьетету Траутфеттеръ относилъ не только форму, описанную М. Биберштейномъ подъ видомъ *C. trachelioides*, но и всѣ другія формы *C. rapunculoides* L. съ болѣе или меньшимъ опушеніемъ трубки чашечки, не обращая при этомъ вниманія на прочіе признаки, какъ напр. форму среднихъ стеблевыхъ листьевъ, длину ихъ черешка. Очевидно Траутфеттеръ имѣлъ слишкомъ мало матеріала съ Кавказа для своихъ наблюденій. Дѣло въ томъ, что тѣмъ больше имѣешь предъ собою матеріала, больше производишь наблюденій

надъ произрастаніемъ вида въ природѣ, тѣмъ яснѣе дѣлается разница между простой варіаціей особи (*variatio*) и настоящимъ варьететомъ (*varietas*) какъ вырабатывающейся расой; тогда-то легко улавливаются предѣлы, въ которыхъ происходятъ колебанія видовыхъ признаковъ. Типичная *C. rapunculoides* L. имѣетъ чашечку или голую, или покрытую короткими прижатыми волосками. Между этими двумя крайними формами встрѣчаются безчисленные переходы, т. е. формы, у которыхъ напр. трубка чашечки бываетъ голая, а чашелистики покрыты маленькими прижатыми волосками или же наоборотъ чашелистики голые, а трубка чашечки покрыта волосками. Опушеніе это можетъ быть или очень густымъ или же очень рѣдкимъ, гдѣ упомянутые маленькіе волоски разбросаны въ разныхъ мѣстахъ чашечки. Помимо этого опушенія у *var. trachelioides* DC. существуетъ еще другое, состоящее изъ длинныхъ бѣлыхъ щетинокъ, которыя покрываютъ какъ верхушку стебля, такъ и чашечку. Присутствіе этого послѣдняго опушенія, конечно, не имѣло бы важнаго значенія, если бы не сопровождалось измѣненіемъ другихъ признаковъ, касающихся формы стеблевыхъ листьевъ и длины ихъ черешка. Что касается соцвѣтія, то у типичной формы оно обыкновенно представляетъ одностороннюю кисть, но случается также, что у экземпляровъ на мѣстахъ сильно освѣщенныхъ солнцемъ и на болѣе плодородной почвѣ соцвѣтіе является въ видѣ развѣтвленной кисти или же цвѣточная кисть получается густая съ большимъ количествомъ цвѣтовъ, которые подъ вліяніемъ солнечнаго освѣщенія располагаются на ней двусторонне. Средніе стеблевые листья продолговатопластинчатые и всегда снабжены черешкомъ, хотя бы и короткимъ. Ширина пластинки листа, ея консистенція находятся опять таки въ зависимости отъ освѣщенія и почвы. У тѣневой формы листовая пластинка болѣе широкая и пѣжной консистенціи, количество цвѣтовъ на стеблѣ небольшое или же часто всего одинъ цвѣтокъ. Экземпляры на известково-каменной почвѣ развиваютъ также небольшое количество цвѣтовъ, но листовая пластинка у нихъ толще и твердой консистенціи. Таковы напр. большая часть экземпляровъ изъ Тифлиса. Вообще такіа формы какъ *C. rapunculoides* L., *C. bononiensis* L. и *C. sibirica* L., благодаря своей большой способности приспосабливаться, являются чрезвычайно интересными и удобными объектами наблюдений надъ измѣненіями, вызываемыми въ нихъ вліяніемъ климата и почвы. Отъ сосѣдняго вида, *C. bononiensis* L., описываемый видъ отличается болѣе крупными цвѣтами, отношеніемъ чашелистиковъ къ трубкѣ чашечки, ихъ формой и въ особенности тѣмъ, что у *C. rapunculoides* L. листья никогда не бываютъ стебле-обхватывающими, какъ это типично для *C. bononiensis* L.

var. trachelioides DC. caule apice *setis rigidis albis longis plus minus dense obsito*, calyce pilis brevibus adpresse hirtis praeterea *setis rigidis albis longis obtecto*, foliis caulinis *subsessilibus* vel potius *sessilibus* oblongo-lanceolatis acuminatis. 24. v. v. et s. in h. A. P. M. J. Th. Tm.

A. D. C. Monogr. Camp. p. 269. — D. C. Prodr. VII. p. 469. — C. A. Meyer, Verzeichn. d. Pflanz. d. Cauc. p. 84. — Ledeb. II. p. 883. — Rupr. Bull. de l'Acad. d. sc. de St. Petersb. XI. p. 197. отд. отр. — Boiss III. p. 923. — Trautv. in A. H. P. VI. p. 75. (partim). Шмальг. II. стр. 177. — Липск. Фл. К. стр. 379. — Sommerl. in A. H. P. XVI. p. 326. — Бушъ. По горамъ и ущ. Хевс. и Тум. стр. 38.

Syn. *C. trachelioides* M. B. Fl. taur.-cauc. I. p. 150; III. p. 142. — *C. setosa* Fisch. (sec. A. D. C. loc. cit.).

Hab. in lapidosis et pratis siccis regionis inferioris et montanae usque ad 7000' Caucasi septentr., orient. et australis. — S. T.-N. Крымъ. М. Биберштейнъ! — S. K. Кубанск. обл., луга по р. Марѣ ниже Маринскаго аула. 8. VI. 89. Кзнц.! Умпырь, сухой лугъ. 18. VII. 89. Кзнц.! Кардтжуртъ. 8. VII. 90. Липск.! (floribus magnis). Долина р. Уллукама между устьемъ рр. Кичкине-кола и Черю-кола, сорныя растенія. 8. VIII. 97. Бушъ! —

S. T. Сѣверн. Кавказъ. 1816. Стевень! Вештау. М. Биб.! К. А. Мейеръ. Каррасъ. VIII. Гогенаккеръ! Кисловодскъ. VII. 86. Акинф.! Тамъ-же. 18. VII. 90. Липск.! Тамъ-же, „Зеленяя горы“. 3500'. 25. VI. 92. Акинф.! Близъ Кисловодска, гора Гусчаджа. 5600'. 29. VI. 92. Акинф.! Лугъ въ долинь р. Череха между ауломъ Кашкатау и озеромъ. 28. VII. 89. Кзнц.! Долина р. Череха между ауломъ Догужоково и Кашкатау. 27. VII. 89. Кзнц.! Осетія, въ садахъ бл. сел. Алагиръ. 24. VII. 98. Марковичъ! Владикавказъ. VIII. 81. № 582. Бротерусъ! Близъ Владикавказа. VII. 01. Н. Зейдлицъ! Терская обл., Хуламъ. 4000'. 24. VII. 92. Акинф.! Хасавъ-юртскій окр., Салатау выше сел. Чиркей. 2000—3000'. 28. VI. 97. Алекс.! Шара-Аргунъ, Дай-Кири. 20. VII. 94. Радде и Кёнигъ! Грозный. 11. VII. 91. Липск.! — **A. M.** Центральный Кавказъ. К. А. Мейеръ! Стевень! Вильгельмъ! 1877. Вдовьевъ! Цейскій ледникъ. 1893. Флеровъ! Осетія, Крупшенскіе покосы. 24. VII. 96. Марков.! Сурхъ. 2. VIII. 95. Марков.! Бл. сел. Казбекъ. 5400'. 7. VII. 43. Коленати! Коби. Гогенаккеръ! Тамъ-же, на скалахъ. IX. Гогенаккеръ! Кайшауръ. Вильгельмъ! Крестовый переваль. 1879. Смирновъ! — **A. O.** Пшавія, на подъемѣ къ горѣ Борбало. 6000'. 13. IX. 60. Рупр.! Субальп. луга близъ сел. Парсма. 16. VII. 03. Бушъ! Тушетія, субальп. луга близъ сел. Чонтю. 15. VII. 03. Бушъ! (*floribus magnis*). Андійскій окр. Дагестана, Сагитльское ущелье между с. Сагитль и р. Андійскимъ Койсу. 4. VII. 04. Бушъ! Дагестанъ, Салты. 15. VII. 94. Пурингъ! Казикумухск. окр., близъ сел. Кумухъ, на осыпяхъ. 5000'. 7. VII. 97. Алекс.! — **X. D.** Дагестанъ, Хунзахъ. 29. VII. 85. Радде! — **S. D.-K.** Дагестанъ, Даргинскій окр., близъ сел. Хуркила-ша (Хураки), между посѣвами. 3600'. 6. VII. 98. Алекс.! Кубинск. у., Бакинск. губ., Касумъ-кентъ. 1872. Беккеръ! (*in herb. Trautvetteri sub var. trachelioides*). — **S. Ib.** Иберія. Вильгельмъ! (*herb. Fisch.*). Ауль Кобсантъ близъ Пассанаура, въ хлѣбахъ. 27. VI. 90. Кзнц.! Карталинія, у. р. Диди-Ляхва, Зкое. 17. VII. 81. fl. fr. № 583. Бротерусъ. (п. v.). Близъ Гарцикарской ст. въ 20 верст. отъ Тифлиса, въ перелѣскѣ. 5. VII. 54. Поморцевъ! — **X. A.** Еленовка близъ оз. Гокчи. 8. VII. 94. Б. Федченко! Окрестности оз. Гокчи. 6. VII. Теръ-Казаровъ! Тамъ-же. VII. 00. Ом.! — **S. S.-K.** Боржомъ. VII. 88. Акинф.! Ликаны. 10. VII. 01. Мищенко! — **S. L.** Талышъ, среди пшеницы между с. Орандъ и г. Мара-юртъ. 6000'. 24. VI. 94. Ломакъ!

Ar. Geogr. *Rossia australis, Caucasus, Tauria!*

Примѣч. Отъ типа этотъ варьететъ отличается сидячими или почти сидячими средними стеблевыми листьями и присутствіемъ жесткаго опушенія, какъ на листьяхъ, такъ въ особенности на стеблѣ, прицѣтникахъ и чашечкѣ. Опушеніе это состоитъ изъ длинныхъ бѣлыхъ щетиннокъ, которыя на чашечкѣ чередуются еще съ маленькими прижатými волосками. Между типомъ и этимъ варьететомъ встрѣчаются иногда формы какъ бы среднія, у которыхъ жесткими длинными щетинками опушены или только чашелистики или одни прицѣтники; у этихъ формъ средніе стеблевые листья имѣютъ короткіе черешки. Всѣ такія формы я отнесъ къ типу, но переходную ихъ стадію обозначилъ знакомъ ∞. *C. rapunculoides* L. var. *trachelioides* D C. встрѣчается въ Крыму, на Кавказѣ и еще въ южныхъ степныхъ губерніяхъ Россіи, какъ напр. въ Саратовской и Полтавской губ. Въ горностенныхъ областяхъ Кавказа этотъ варьететъ поднимается до высоты 7000' надъ ур. моря. На сухихъ мѣстахъ въ степи случается, что цвѣты у этого варьетета бываютъ небольшіе, а вслѣдствіе густоты цвѣточной кисти и доступа со всѣхъ сторонъ солнечному освѣщенію, цвѣточная кисть дѣлается двусторонней. Такія формы Рупрехтъ (*Bull. de l'Acad. de sc.*

de St. Petersburg. XI. p. 197 отд. отт.) считать за переходный между *C. bononiensis* L. и *C. rapunculoides* L.

* **var. cordifolia** (C. Koch.) m. foliis etiam caulinis mediis *cordatis* petiolatis, caule glabro vel parce pubescente, calyce glabro. **2.** v. v. et s. in h. A. P. J. Th.

Syn. *C. cordifolia* C. Koch, in Linnaea. XIX. p. 29. — *C. rapunculoides* Boiss. III. p. 922. (partim). — *C. rapunculoides* L. f. *cordifolia* Albow, in Prodr. Fl. Colch. p. 160. — *C. rapunculoides* L. var. *glabrata* Trautv. (partim) in A. H. P. VI. p. 75.

Hab. in regione silvatica Caucasi occidentalis ubique in Kachetia. — **S. K.** Кубанск. обл., спускъ съ долины Джалпакъ-кола, сосновый лѣсъ. 25. VII. 97. Бушъ! — **A. W.** Гора Фиштъ. Альбовъ. (п. v.). Бзыбскій хреб. Альбовъ (п. v.). Абхазія, верховья р. Мзымты, главн. хреб. VII. Альб.! (l. cit. sub *C. rapunculoides* γ. *cordifolia*). — **A. M.** Осетія отъ сел. Бизъ до Св. Николая. 1893. Флеровъ! — **S. P.** Черкесія, Кучукъ-дере у опушки лѣса. 24. VI. 01. Гриневецкій! (f. *ramosa*). Тамъ-же. 1. VIII. 00. Гринев.! Абхазія. 1842. Раджицкій! (Rupr. in herb. sub var. *abchassica*). Батумъ. 1. VIII. 87. Акинф.! Самурзаканъ, долина р. Окумъ. 600 m. (№№ 457 и 458). 1893. Альбовъ. (п. v.). Мингрелія. К. Кохъ! По р. Ингуру, между Зугдиди и Анаклия. Лаговскій! (in herb. Trautvetteri sub var. *glabrata* Trautv.) Имеретія. 1838. К. Кохъ! Кутанская губ., лѣса Багдадекаго лѣсничества, поясъ широколиственныхъ лѣсовъ. 15. VI. 95. Бушъ! Намахвани у р. Ріона. 23. VII. 90. fl. Соммъ и Левъе. (folia etiam caulina media, late ovata cordata) (п. v.). Рачинскій уѣздъ, Кутанской губ., между Они и Хатевн. 1920—2040'. 8. IX. 61. Рупр.! На-керала. 1800—3600'. 12. IX. 61. Рупр.! Гелаты близъ Кутанса. 13. XI. 61. Рупр.! Около Кутанса, за Красной рѣчкой. 13. VI. Бушъ! Квирилы. 5. VI. Ломак.! Абастуманъ. 5000'. 22. VIII. 94. Пурингъ! — **A. A.** Ад-жарія и Лазистанъ. 15. VIII. 85. Масальскій! — **S. Ib.** Въ лѣсу близъ Коджоры. Вильгельмъ! Тамъ-же. 1878. Сирновъ! Кахетія, Телавскій у., въ лѣсу близъ сел. Шакріани. 12. VII. 98. Ом.! Переваль Гомборы. Вильгельмъ! Кахетія, Карданахъ въ лѣсу. 24 и 27. VI. 00. Гринев.! — **S. S.-K.** Боржомъ. 17. VI. 65. Радде! Тамъ-же. VII. 87. Акинф.! Тамъ-же. Воронцовскій паркъ. 29. VI. 01. Мищенко! У р. Уравель-су. VII. 72. Оверинъ!

Примѣч. Отъ типа отличается овальными у основанія сердцевидными средними стеблевыми листьями. Стебель и чашечка почти всегда голые или же съ очень рѣдкими маленькими волосками, которые разбросаны по чашечкѣ тамъ и сямъ. Этотъ варьететъ встрѣчается, повидимому, только на Кавказѣ и главнымъ образомъ въ западной его части, гдѣ климатъ болѣе влажный. Изрѣдка впрочемъ этотъ варьететъ попадаетъ въ западной части Кахетіи, гдѣ климатъ напоминаетъ Западное Закавказье. Весьма страннымъ кажется нахожденіе этого варьетета въ Коджорахъ, такъ какъ нигдѣ въ сосѣднихъ мѣстахъ съ Тифлисомъ онъ не найденъ. Возможно, что онъ и занесенъ въ Коджоры.

42. C. bononiensis L. crispule pubescens vel canescens radice brevi incrassata, caule tereti elato crebre folioso in racemum longum spiciformem saepius simplicem rarius subpaniculatum abeunti, foliis subtus *canescentibus* vel *dense cano-pubescentibus*, inferioribus cordato-oblongis petiolatis intermediis caulinis *ovato-cordatis amplexicaulibus* acuminatis supremis

et floralibus lanceolatis minutis *amplexicaulibus*, floribus 2—3-nis solitariisque pedunculis brevissimis cernuis suffultis, calycis laciniis patentibus breviter et anguste triangulari-lanceolatis obtusiusculis basi interdum denticulatis tubo obconico glabro vel minute hirtio *vix longioribus*, corolla infundibuliformi ore *non barbata* laciniis calycinis 5—6-plo longiore, stylo subexserto, capsula ovata, seminibus nitidis fuscis subcomplanatis *anguste marginatis*. 2^l. v. v. et s. in h. A. P. J. S. M. Tm. Th. Fenn.

L Sp. I. p. 234. — A. D. C. Monogr. Camp. p. 270. — D. C. Prodr., VII. p. 469. — M. B. Fl. taur.-cauc. I. p. 150; III. p. 142. — C. A. Mey. Verzeichn. d. Pflanz. des Cauc. p. 84. — Hohenack. Enum. Elisabethpol. p. 221. — C. Koch, in Linnaea. XVII. p. 280. — Ledeb II. p. 884. — Rupr. Bull. de l'Acad. de sc. de St. Petersb. XI. p. 197 отд. отд. — Boiss. III. p. 923. — Trautv. in A. H. P. II. p. 565; VI. p. 76. — Шмалъг. II. стр. 177. — Ломак. Фл. Караб. стр. 57. — Липск. Фл. К. стр. 379. — Somm. et Lev. in A. H. P. XVI. p. 326. — Radde, Mus. Cauc. II. p. 122; Grundz. p. 65, 295.

Syn. *C. rapunculoides* Pall. Phys. top. Gemälde v. Taur. p. 99. (sec. M. B. loc. cit.). — *C. ruthenica* M. B. Fl. taur.-cauc. I. p. 151; III. p. 152. — Eichw. Casp. cauc. p. 26. — *C. simplex* Lam. non Stev. (sec. Boiss. l. cit.).

Icon. Rechb. Ic. Fl. Germ. tab. 237.!

Exsicc. C. Richter. Fl. exsic Austro-Hung. № 2986! — Herb. Fl. Ross Acad. Petrop. № 466!

Hab. in siccis et apricis Tauriae et Caucasi. — **S. T.-N.** Крымъ. М. Бибер.! (caule pubescente, foliis subtus pubescentibus). Тамъ-же. Левейе! (f. umbrosa caule parce pubescente, foliis teneris subtus canescentibus, tubo calyc. glabro). Симферополь. VII. 42. Траутфеттеръ! (caule pubescente, foliis subtus dense cano-pubescentibus, calyce glabro.). Тамъ-же, близъ р. Салгиръ. 26. VII. 52. Траутфетт.! (caulibus pubescentibus, foliis subtus pubescentibus, calyce pubescente). Симферополь, между кустарниками. 18. VI. 94. Алексѣенко! (caulibus parce pilosis, foliis subtus pubescentibus, tubo calyc. glabro). Крымъ, колонія Нейзацъ. 22. VI. 1837. Траутфетт.! (caulibus pubesc., foliis subtus cano-pubesc., calyce glabro). Около Чатыр-дага, на опушкѣ буковаго лѣса. 8. VII. 97. Гольде! (caulibus cano-pubesc., foliis subtus dense cano-pubesc., calyce glabro). Гора Демерджи. 25. VII. 94. Алекс.! (caule parce piloso, foliis subtus pubescentibus, calyce glabro). Кусты около Балаклавы. 3. VII. 96. С. Θεодосѣвъ! (caulibus pubesc., foliis subtus pubescentibus). Θεодосія, на склонѣ горы Тете-оба. 18. VI. 97. Гольде! (caulibus pubesc., foliis subtus pubescentibus). Окрестности Судакъ. 27. VI. 37. Траутфетт.! (caulib. pubescentibus, foliis subtus cano-pubescentibus, calyce glabro). По дорогѣ отъ Алушты до Туманъ-базара. 8. IX. 44. Графъфъ! (caule pubescente, foliis subtus cano-pubescentibus, calyce pubescente). Г. Касель близъ Алушты. VIII. 94. Алекс.! (f. umbrosa, caulibus parce pubescentibus, foliis teneris subtus pubescentibus). Ялта, на сухомъ склонѣ. 21. VI. 97. Гольде! (caulibus canescentibus, foliis subtus dense cano-pubescentibus). Тамъ-же. 30. VI. 00. Гольде! (caule pubescente, foliis subtus cano-pubescentibus). Ливадія, близъ Ялты. 28. VI. 52. Чугаевичъ! (caulibus pubescentibus, foliis subtus dense cano-pubescentibus, calyce glabro). Между Ялтой и Алушкой. 1. VII. 37. Траутфетт.! (caulibus parce pubescentibus, foliis subtus cano-pubescentibus, calyce glabro). Крымъ. Форось. 20. VI. 98. Гольде! (caule pubescente, foliis subtus cano-pubescentibus). Коккусъ. 3900'. въ лѣсахъ. 13. VII. 00. Гольде! (caule glabres-

cente, foliis subtus pubescentibus). Новороссійскъ. 17. VI. 90. Липск.! (caule glabrescente, calyce glabro, foliis subtus canescentibus). Тамъ-же. 11. VI. 91. Липск.! (caulibus canescentibus, foliis subtus dense cano-pubescentibus). — **S. K.** Кубанск. обл., ст. Переяславская. 10. VII. 84. Полторацкій! (caule ramoso pubescente, calyce pubescente, foliis subtus dense pubescentibus). Долина р. Теберды, близъ Тебердинскаго аула. 11. VII. 97. Бушъ! (caule pubescente, calyce pubescente, foliis subtus cano-pubescentibus). Около Тебердинскаго аула, подножіе хребта Бруштъ, ксерофильныя формы лѣсныхъ луговъ. 17. VIII. 97. Бушъ! (caule canescente, foliis subtus dense cano-pubescentibus, calyce glabro). Хумаринское укрѣпленіе. 9. VII. 89. Кзнецъ! (caule dense pubescente, foliis subtus cano-pubescentibus, calyce pubescente). — **St. A.** Кубанск. обл., ст. Кисляковка Владикавк. жел. дер. 7. VII. 95. Бушъ! (caule pubescente, foliis subtus cano-pubescentibus, calyce minute hirta). Ставрополь. Норманнъ! (In herb. Mus. Cauc. caule pubescente, foliis subtus cano-pubescentibus, calycis laciniis obtusiusculis, tubo calyc. subglabro). — **S. T.** Ставропольская губ., Круглолѣсская. 1600'. 29. VI. 89. Акинфъ! (caule canescente, foliis subtus cano-pubescentibus, tubo calyc. minute hirta). Кубанск. обл., Невинномысская. 24. VI. 90. Липск.! (caule canescente, foliis subtus dense cano-pubescentibus, tubo calyc. minute hirta). На сухихъ мѣстахъ предгорій сѣв. Кавказа. 13. VI. 30. К. А. Мейеръ! (caule pubescente, foliis subtus canescentibus, tubo calyc. parce minute hirta). Сѣв. Кавказъ. Стевенъ! (caule pubescente, foliis subtus canescentibus, tubo calyc. glabro). Вештау. 600—3000'. К. А. Мейеръ! Тамъ-же. Патерсонъ! (cum. fruct., caule canescente, foliis subtus dense cano-pubescentibus, capsula glabra). 2400'. 31. VII. 89. Акинфъ! (caule pubescente, foliis subtus cano-pubescentibus, tubo calyc. glabro). Мапшукъ, вост. скл. 28. VII. 66. Байернъ! (f. subramosa, caule canescente, foliis subtus cano-pubescentibus, calyce glabro). Пятигорскъ. Вильгельмъ! (caulibus pubescentibus, foliis subtus canescentibus, tubo calycino glabro vel minute hirta). Каппасъ. Гогенаккеръ! (caule pubescente, foliis subtus canescentibus, calyce glabro). Кисловодскъ. 20. VIII. 66. Байернъ! (f. umbrosa, caule parce pubescente, foliis subtus pubescentibus, calyce pubescente). Тамъ-же. VII. 89. Акинфъ! (caule pubescente, foliis subtus cano-pubescentibus, tubo calyc. minute hirta). Кабардинка. Байернъ! (caule canescente, foliis subtus dense cano-pubescentibus, calyce glabro). Терская обл. на горахъ близъ Тарки. Эйхвальдъ! (caule pubescente, foliis subtus canescentibus, calyce glabro). Тамъ-же. Байернъ! (caule canescente, foliis subtus cano-pubescentibus, calyce glabro). 1825. Поморцевъ! (caule pubescente, foliis subtus canescentibus, calyce glabro). 21. VI. 94. Б. Федчъ! (caule pubescente, foliis subtus canescentibus). Алагиръ по теченію р. Ардона. Лаговскій! (caule pubescente, foliis subtus cano-pubescentibus, tubo calycino glabro). Тамъ-же. Лаговецъ! (caule parce pubescente, foliis subtus dense pubescentibus, tubo calyc. glabro). На стени близъ Грознаго. 27. IV. 89. Кзнецъ! (caule pubescente, foliis subtus pubescentibus, tubo calyc. glabro). Грозный. 10. VII. 91. Липск.! (caule pubescente, foliis subtus canescentibus, tubo calycino dense pubescente). Хасавъ-юртъ. 6. VII. 91. Липск.! (caule apice ramoso pubescente, foliis subtus canescentibus, tubo calycino minute hirta). — **S. D.-K.** Дагестанъ, Темиръ-Ханъ-Шура, между кустарниками. VII. 95. Десулавъ! (caule pubescente, foliis subtus pubescentibus,

tubo calyc. minute hirta). Близъ Темиръ-Ханъ-Шуры къ юго-востоку отъ города между кустарниками. 1700'. 16. VII. 97. Алексѣенко! (caule pubescente, foliis subtus dense pubescentibus, calyce glabro) Петровскъ. 1. VII. 91. Липск.! (caule pubescente, foliis subtus canescentibus, tubo calyc. glabro). Бакинск. губ., Кубинскій уѣздъ, у р. Ата-чай выше „Гейна-Киштагъ“, у красвѣ лѣсныхъ дорогъ. 2000'. 24. VII. 00. Алекс.! (cum fruct., caule parce pubescente, foliis subtus cano-pubescentibus, capsula glabra). На сухихъ мѣстахъ выше сел. Гюмуръ. 5000'. 11. VII. 99. Алекс.! (caule apice cano-pubescente, foliis subtus densissime cano-pubescentibus, tubo calyc. glabro). — **S. P.** Мзымта. VI. 93. Радде и Кёнигъ! (caule glabro, foliis subtus dense pubescentibus, calycis laciniis remote denticulatis, tubo calyc. glabro). — **S. Ib.** Военно-Грузинск. дор. Анапуръ. Гогенаккеръ! (caule parce pubescente, foliis subtus pubescentibus, calyce glabro vel minute hirta). Иберія. Вильгельмъ! (caule pubescente, foliis subtus canescentibus, calyce parce minute hirta). Тифлисъ, на холмахъ къ западу отъ города. 8—9. VII. 90. Сомм. и Лев.! (caule pubescente, foliis subtus canescentibus, tubo calyc. minute hirta). Цилканы. 30. VI. 94. Федченко! (caulibus pubescentibus, foliis subtus canescentibus). Тифлисс. губ., Сигнахскій у., 1894. Пурингъ! (caule pubescente, foliis subtus pubescentibus, tubo calycino parce minute hirta). Бакинск. губ. Шемахинск. у., на сухихъ мѣстахъ близъ сел. Бинасты. 2000'. 2. VIII. 00. Алекс.! (cum fruct., caule pubescente, foliis subtus dense pubescentibus, capsula glabra). Шемахинск. у., близъ сел. Алты-агачъ въ направленіи горы Дибаръ, на опушкѣ лѣса. 4000'. 25. VII. 00. Алекс.! (caule parce pubescente, foliis subtus canescentibus, tubo calyc. glabro). — **St. Tr.** Эльдаръ, беретъ р. Юры у Мечетки. 27. VII. 94. Пурингъ! (caule pubescente, foliis subtus cano-pubescentibus, tubo calyc. glabro). — **X. A.** Карсск. обл., Ольгинск. окр., Эрюкъ. 13. VII. 03. Кёнигъ! (specim. tubo calycino parce pubescente vel glabro, caulibus canescentibus, foliis subtus dense cano-pubescentibus, calycis laciniis interdum denticulis remote obsitis). Эриванская губ., сел. Мерепанъ. 8. IX. Ходятовскій! (caule glabro, foliis subtus cano-pubescentibus, tubo calycino pubescente, capsula matura glabra). Эриванск. губ., Нахичеван. у., сел. Беченагъ. VI. 71. Радде! (caule pubescente, foliis subtus cano-pubescentibus, tubo calyc. pubescente). Тамъ-же, лѣсъ. 9. VII. 95. Ломак.! (caulibus parce pubescentibus, foliis margine crenato-crispis, subtus cano-pubescentibus, tubo calyc. glabro vel minute hirta). Корчеванскій постъ, пограничный съ Персіей, лѣсъ. 18. VII. 04. Кёнигъ! (caule pubescente, foliis subtus cano-pubescentibus, tubo calycino pubescente). — **S. S.-K.** Коджоры. 1878. Смирновъ! (caule glabrescente, foliis subtus pubescentibus, calyce glabro). Елисаветпольск. губ., Еленендорфъ. Гогенаккеръ! (caule parce pubescente, foliis subtus cano-pubescentibus, calycis glabri laciniis dentibus remotis obsitis, №№ 1371 и 1380). Елисаветполь. VII—VIII. Гогенак.! (caule pubescente, foliis subtus canescentibus, calyce glabro). Карабахъ, сел. Ташкентъ. Гогенаккеръ! (caule canescente, foliis subtus dense cano-pubescentibus, calyce glabro). На лугахъ близъ сел. Базаръ-чай. 18. VII. 03. Гриневецкій! (caule pubescente, foliis subtus

1) У одного изъ этихъ-же экземпляровъ у отдѣльных цвѣтковъ трубка чашечки то совершенно гладкая, то покрыта рѣдкими маленькими волосками, чашелистики по краямъ снабжены удаленными зубчиками.

cano-pubescentibus, tubo calyc. minute hirtio). Между кустарниками, близъ Тативъ. 5000'. 5. VII. 03. Гринев.! (caule parce pubescente, foliis subtus dense pubescentibus, specim. tubo calyc. glabro vel minute hirtio)¹⁾. Сел. Шернуха, лѣсъ. 21. VII. 95. Ломак.! (caule pubescente, foliis subtus dense pubescentibus margine crispis, tubo calyc. minute hirtio). Сел. Хараръ. 21. VI. 95. Ломак.! (caule parce pubescente, foliis subtus cano-pubescentibus, tubo calycino minute hirtio). — S. L. Горы Талыша. К. А. Мейеръ. (n. v.).

Ar. Geogr. Gallia austro-orientalis, Helvetia australis, Italia, Dalmatia, Germania australis, regio Danubialis, Rossia media et australis!

Примъч. *C. bononiensis* L. распространена въ степныхъ и горно-степныхъ областяхъ Крыма и Кавказа; въ западномъ Закавказьѣ она встрѣчается, повидному, очень рѣдко и до сихъ поръ была найдена только Радде на Мзымтѣ. Видъ этотъ сильно варьируетъ въ опушеніи стеблей, листьевъ и трубки чашечки, причѣмъ опушеніе послѣдней, повидному, не находится въ зависимости ни отъ климата, ни отъ условий мѣстонахожденія, тогда какъ между степенью опушенія листьевъ и стебля и климатическими условиями, или условиями мѣстонахождения существуетъ извѣстная аналогія. У экземпляровъ, росшихъ между кустами или на опушкѣ подъ защитой лѣса стебель бываетъ слабо опушенъ или почти гладкимъ, а нижняя сторона листьевъ тоже не густо опушена и характеръ такого опушенія можно выразить такъ: „caule parce pubescente vel glabrescente, foliis subtus pubescentibus.“ У экземпляровъ съ открытой степи опушеніе это болѣе густое и его можно формулировать такъ: „caule canescente, foliis subtus canescentibus vel dense cano-pubescentibus“. Что касается трубки чашечки, то опушеніе ея не бываетъ вообще очень густымъ и при различныхъ климатическихъ условіяхъ трубка чашечки бываетъ то болѣе или менѣе опушена, то совершенно голая. Замѣчается и еще нѣкоторая разница въ формѣ чашелистиковъ между экземплярами изъ Крыма и Сѣвернаго Кавказа и экземплярами изъ Закавказья. У послѣднихъ чашелистики нѣсколько уже и слегка пріострены, тогда какъ у первыхъ они шире и болѣе или менѣе притуплены

Series IX. Spicatae Boiss.

Flores sessiles spicati.

Boiss. III. p. 894.

43. *C. stricta* L. patule virens vel setulis basi plus minusve tuberculatis scabrida, caulibus et rhizomate ramoso saepe suffrutescenti numerosis ascendentibus rigidis *stricte* foliosis simplicibus vel parce ramosis, foliis rigidis inferioribus ovato-oblongis acutiusculis in petiolum sensim attenuatis integris vel denticulis ascendentibus obsitis, superioribus sessilibus interdum semiamplexicaulibus sensim diminutis lanceolatis et lineari-lanceolatis acuminatis, floribus *sessilibus* bracteolatis in axillis foliorum superiorum minimorum in *racemum laxum* vel *spicam dispositis* vel unico terminali, calycis tomentelli laciniis triangulari-oblongis vel sublineariibus *obtusis* corolla tubuloso-infundibuliformi 2—3-plo brevioribus, appendicibus demum valde *accretis inflatis* reticulatis *ovatis* obtusis capsulam rectam obtegentibus 2l. n. v.

L. Sp. 238. — A. D C. Monogr. Camp. p. 239. — D C. Prodr. VII. p. 463.

— Tchihatch. Asie Min. II. p. 394. — Boiss. III. p. 923.

Syn. *C. orientalis folio longo rigido aspero, flore sursum spectante* Tourn.

1) Имѣются переходы въ опушеніи трубки чашечки и даже на одномъ и томъ-же экземплярѣ у однихъ цвѣтовъ чашечка совершенно голая, у другихъ слегка пушистая или совсѣмъ пушистая.

Icon. Ic. Desf. Cor. tab. 28; Icon. Billard. (sec. A. D C. l. cit.)

Hab. in regione montana Armeniae. Tournef.

Примѣч. Турнефоромъ указывается для Арменіи, вѣроятно, турецкой?

var. libanotica Boiss. caules abbreviati decumbentes, folia angusta, calyx densius velutinus 4—5 lin. longus, corolla velutina. *Ź.* v. s. in h. J. Boiss III. p. 924.

Syn. *C. libanotica* D C. Prodr. VII. p. 463.

Icon. Ic. Labill. Dec. 5, tab. 4.

Exsicc. I. Bornmüller Iter Syriacum № 1088!

Hab. in regione alpina montium Asiae minoris.

Ar. Geogr. Asia minor!

Примѣч. Этотъ варьететъ найденъ пока только въ Малой Азій, но возможно, что онъ будетъ найдеть и въ предѣлахъ Кавказа, какъ напр. въ Ольгинскомъ окр. Карской обл., гдѣ въ послѣдніе три года найдено много мало-азіатскихъ растений.

var. muricata Trautv. caulibus parce *muricatis* et praeterea sub lente tenuissime puberulis; foliis linearibus *integrissimis* *integerrimis* *dense muricatis* caeterum glabris. *Ź.* v. s. in h. P. Tm.

Trautv. in A. H. P. II. 2. p. 563; VI. p. 63.

Exsicc. Radd. Armenia turcica, Palantöken!

Hab. in regione montana Armeniae rossicae. — **X. A.** Арменія, Казин-паранъ. 28. VII. 71. Радде!

Ar. Geogr. Asia minor!

Примѣч. Вѣнчикъ у этого варьетета даже въ молодомъ состояніи всегда голый; отъ типа и var. *libanotica* Boiss. описываемый варьететъ отличается опушеніемъ, состоящимъ изъ мягко-колючихъ короткихъ волосковъ, покрывающихъ какъ листья, такъ стебли и чашечку. У типа и var. *libanotica* опушеніе состоитъ изъ длинныхъ волосковъ, которые густо покрываютъ все растеніе, исключая вѣнчика, гдѣ опушеніе носитъ уже другой характеръ: оно болѣе тонкое, мягкое и короткое.

43'. **C. thyrsoides** L. hirsuta, radice simplici cylindrica carnosa verticali, caule unico simplici sulcato stricto folioso in spicam brevem densam pyramidalem abeunti, foliis radicalibus late lanceolatis integris obtusis pilosis, caulinis lineari-lanceolatis pilosis acutis, calycis laciniis ovatis acutiusculis subdentatis margine ciliatis tubo glabro sublongioribus, corolla obconica ochroleuca pubescente laciniis calycinis duplo longiore, stylo exserto, capsula sphaeroidea, seminibus ovatis planiusculis fuscis. *Ź.* v. s. in h. P.

L. Sp. I., p. 235. — A. D C. Monogr. Camp. p. 263. — D C. Prodr. VII. p. 468.

— Trautv. in A. H. P. VI. p. 72. — Липск. Фл. К. стр. 380.

Icon. Rehb. Icon. Fl. Germ. tab. 236!

Hab. in regione alpina Armeniae? — **X. A.** Карск. обл., по горамъ надъ оз. Арна-гѣль. 13. VIII. 54. Лаговск.!

Ar. Geogr. Europa media in alpinis!

Примѣч. Траутфеттеръ въ Acta Hort. Petrop. VI. p. 72. съ сомнѣніемъ приводитъ этотъ видъ для Карской области, гдѣ какъ будто-бы онъ былъ собранъ д-ромъ Лаговскимъ въ 54 году. Экскурсировавшіе въ тѣхъ-же мѣстахъ и окрестностяхъ д-ръ Г. И. Радде и другіе изслѣдователи этого вида не находили. Наконецъ въ 1903 году въ горахъ около озера Арна-гѣль экскурсировалъ С. И. Михайловскій, который усердно искалъ этотъ видъ и тоже не нашелъ. Я съ увѣренностью могу сказать, что *C. thyrsoides* на Кавказѣ совсѣмъ отсутствуетъ, иначе она попадалась бы и въ Малой Азій. Экземпляры, хранящіеся въ гербаріи Траутфеттера изъ коллекціи д-ра Лаговскаго по всей вѣроятности

происходить изъ альпъ Европы. Руководствуясь этими соображеніями, я исключилъ этотъ видъ изъ дихотомической таблицы для опредѣленія видовъ р. *Campanula* съ Кавказа.

Series X. Involucratae mihi.

Flores sessiles capitati, bracteis latis oblongis involucrati.

44. *C. macrochlamys* Boiss. et Huet. caulibus e radice *bienni dauciformi verticali* 1 vel paucis ascendentibus crassiusculis vel saepius crassis simplicibus *setosis*, foliis adpresse hirtis obtuse crenato-repandis, radicalibus *longe petiolatis late ovatis obtusis basi cordatis* vel *rotundatis* in petiolum subdecurrentibus, caulinis inferioribus oblongis obtusis in petiolum *decurrentibus*, mediis paucis sessilibus *late oblongo-linearibus medio constrictis* semiamplexicaulibus, capitulo terminali *unico magno* bracteis oblongis obtusis praeter basin *membranaceam* viridibus flores superantibus *late bracteato*, calycis laciniis longe lanceolatis *longe albo-ciliatis* tubo glabro obconico triplo longioribus, sinubus obscure *angulato-subreflexis*, corolla coerulea glabra tubuloso-infundibuliformi vel potius tubulosa laciniis calycis $2\frac{1}{2}$ -plo longiore, capsula obovata, seminibus compressis fuscis spongioso-tuberculatis. ☉. v. s. in h. P. Tm. Th.

Boiss. et Huet. Diagn. Ser. II., 3. p. 111. — Boiss. III. p. 927. — Albow, Prodr. Fl. Colch. p. 161. — Липск. Фл. К. стр. 379. — Radde, Mus. Cauc. II. p. 122.

Hab. in siccis regionis montanae Armeniae et Adshariae. — **S. P.** Аджарія, Борчхо. 1893. № 11. Радде. (п. в.). Артвинъ. 13. V. 93. Радде и Кёнигъ! — **X. A.** Карсеская обл., Ольты. 10. V. 04. Кёнигъ! Ольтинкій окр., сел. Герашкянъ, на осыпяхъ. 16. VI. 04. Михайловскій! Сел. Чермукъ. 16. VI. 04. Михайловскій! Поствъ Промежуточный недалеко отъ Бардуса. 18. VI. 04. Михайловскій! Поствъ Бабосъ близъ Бардуса. 19. VI. 04. Михайловскій! По р. Бардусъ-чай. 14. VIII. 86. Масальскій! (eum fruct.).

Ar. Geogr. Asia minor.

Примъч. *C. macrochlamys* Boiss. et Huet. на Кавказѣ распространена, повидимому, только въ юго-западной части русской Арменіи, по сосѣдству съ Малою Азіей. Длинные и широкіе внизу перепончатые прицѣтники и оригинальной формы стеблевые листья сразу отличаютъ этотъ видъ, какъ отъ *C. lingulata* W. K., такъ и отъ сосѣдняго вида *C. involucrata* Auct. Трубковидный чуть расширяющійся къверху вѣшчикъ раздѣленъ на доли, разрѣзы которыхъ доходятъ только до $\frac{1}{6}$ его части. Ясныхъ и хорошо развитыхъ придатковъ чашечки у этого вида, собственно говоря, нѣтъ; они представляютъ изъ себя только слегка нависшіе надъ трубкой чашечки углы вырѣзовъ между чашелистиками. Весьма характерны у этого вида сѣмена: сплюснутыя овальныя, покрытыя мелкими губчатыми бугорками.

45. *C. glomerata* L. hirta vel glabrata, radice brevi subrepente, caulibus erectis foliosis, foliis *minute crenatis* radicalibus longe petiolatis a basi cordata vel rotundata ovatis vel oblongis, caulinis superioribus sessilibus oblongis basi cordata amplexicaulibus, floribus sessilibus in fasciculos in axillis superioribus subsessiles et *capitulum* terminale bracteis oblongis vel ovatis acutiusculis suffultum *congestis*, calycis laciniis lanceolatis ciliatis vel strigulosis *acuminatis* tubo obconico 3—4-plo longioribus, corolla infundibuliformi *violacea* pubescente vel glabra calycis laciniis sesqui vel duplo longiore ad tertiam partem lobata. 2. v. v. et s. in h. A. P. S. M. J. Th. Tm.

L. Sp. 235. — A. D C. Monogr. Camp. p. 253. — D C. Prodr. VII. p. 467. — M. B. Fl. taur.-cauc. I, p. 152; III, p. 142. — C. A. Meyer, Verzeichn. d. Pflanz. d. Cauc. p. 84. — Eichw. Casp.-cauc. p. 29, 31. — Hohenack. Enum. Elisabethpol. p. 221; Enum. Talsch. p. 63. — C. Koch, in Linnaea. XVII. p. 280. — Bunge, Plant. Abich. p. 13. (591.) — Rupr. Bull. de l'Acad. d. sc. de St. Pétersb. XI. p. 197. отд. отд. — Boiss. III. p. 927. — Trautv. in A. H. P. IV. 1. p. 163; V. 2. p. 454; VI. p. 68; VII. p. 478. — Шмальг. II. стр. 175. — Albow, Prodr. Fl. Colch. p. 161. — Ломак. Тр. Тифл. Бот. Сада I. стр. 59; Фл. Караб. стр. 57. — Липск. Фл. К. стр. 379. — Radde, Grundz. p. 365. — Somm. et Lev. in A. H. P. XVI. p. 326. — Radde, Mus. Cauc. II. p. 122. (partim.) — Грипевецк. Резулт. двухъ ботан. путеш. на Кавк. въ 1900—01 гг. стр. 53 и 126. — Оом. Тр. Тифл. Бот. Сада, вып. VI. кн. 2. стр. 51. — Бушъ, По горамъ и ущелья Хевсур. и Тумет. стр. 13, 38.

Syn. *C. glomerata* var. *speciosa* Trautv. in A. H. P. IV. 2. p. 387; VI. p. 69. (partim.) — *C. glomerata* var. *elliptica* Trautv. in A. H. P. VI. p. 69.

Icon. Rechb. Ic. Fl. Germ. tab. 235!

Exsicc. Fl. exsicc. Austro-Hungar. № 2981! — Herb. Fl. Rossic. № 676! — Annenc. Fl. Mosq. exsicc.! — Herb. Fl. Ingr. Cent. III. № 384!

Hab. in regione silvatica et alpina totius Caucasi. — **S. K.** Кубанск. обл., субальп. луга на хребтѣ Гуама къ W отъ р. Курджинса. 24. VII. 99. Бушъ! (f. *grandiflora*). Между Сентами и Тебердинскимъ ауломъ, поясъ дубово-березовыхъ лѣсовъ. 24. VI. 96. Бушъ! Лугъ въ сосновомъ лѣсу около Тебердинскаго аула, подъемъ на хребетъ Брушъ. 26. VI. 96. Бушъ! Карачай. 27. V. 84. Сипягинъ! Тамъ-же. 2. VI. 87. Сипягинъ! — **S. T.** Верховья р. Подкумка въ Терск. обл., субальп. луга. 6. VII. 89. Кзич! Бештау. Байернъ! Тамъ-же, тѣнистыя мѣста. 22. VI. 84. Акинф! Гусчаджа. 5000'. 29. VI. 92. Акинф! Пятигорскъ, Машукъ. 3. VII. 96. Литвиновъ! Кисловодскъ, у Нарзана. 1844. Гёффт! Владикавказъ. 22. VI. 87. Акинф! По р. Тереку, выше Владикавказа. VII. 01. Н. Зейдлицъ! — **A. W.** Кубанская обл. поляны на хребтѣ къ N отъ г. Маркопиджа. 2. VII. 99. Бушъ! Черкесія, Гора Фиштъ. 5000'. 17. VII. 01. Гринев! Гора Хагъ. 17. VIII. № 264. Альб! Абхазія, гора Кошеймъ, альп. луга. 1894. Альбовъ. (п. v.). — **A. M.** Цейскій ледникъ. 1893. Флеровъ! Буслачирскій перевалъ, субальп. лугъ на южномъ склонѣ. 3. VII. 90. Кзич! Близъ Буслачирскаго перевала. 3. VII. 90. Кзич! (f. *grandiflora*). Латпарскій перев. 2100 m. 4. VIII. 90. fl. Соммъ и Левье. (п. v.). Гора Адай-хохъ. 17—29. VII. 00. Марковичъ! (f. *grandiflora*). Военно-Осетинск. дор., близъ сел. Бизъ. 26. VI. 00. Левитскій! Осетія, горные луга Кюна. 30. VI. 00. Левитск! (f. *grandiflora*). Сурхъ. 1. VIII. 95. Марков! (f. *grandiflora*). Около р. Цроу, луга. 2. VII. 95. Марков! Билагское ущелье. 4. VIII. 95. Марков! Около сел. Нгой на горныхъ лугахъ Дарчендукъ. 14. VII. 96. Марков! Горные луга, Ленскортъ. VII. 92. Марков! Пріютъ близъ Мамиссона, по Ардону. 8000'. 13. VII. 02. Акинф! Между Ларсомъ и Казбекомъ. 1843. Коленати! Между Коби и Гудауромъ. 1877. Вдовьевъ! Гуть-гора. 19. VII. 43. Коленати! Кайшауръ. Эйхвальдъ. Центральный Кавказъ, по р. Кистинкъ. 31. VI. 01. Куницкій! (f. *grandiflora*). Гора Бермамуть. 13. VII. 92. Липскій! — **A. O.** Хевсурія, Хевсурская Арагва. Байернъ! (f. *grandiflora rumila*). Между сс. Барисахо и Рошка, дно ущелья. 1. VII. 03. Бушъ! Между с.

Барисахо и уроч. Ори-цхали. 28.VI. 03. Бушъ! Тушетія, субальп. луга между с. Джваръ-босели и г. Самкурисъ-цвери. 23. VII. 03. Бушъ! (*f. grandiflora*). Междуг. Самкурисъ-цвери и уроч. Алазанисъ-тави, субальп. луга. 23. VII. 03. Бушъ! Тушетія, Диклосъ. Байернъ! (*f. grandiflora*). Близъ с. Дикло. 21. VII. 03. Бушъ! Тушетія между с. Дикло и-г. Диклосъ-мта. 20. VII. 03. Бушъ! Между с. Парема и переваломъ къ г. Комитосъ-цвери. 16. VII. 03. Бушъ! Между сс. Чонтіо и Парема, субальпійскіе луга. 15. VII. 03. Бушъ! (*f. grandiflora*). Ксерофиты между сс. Дартло и Чиго. 19. VII. 03. Бушъ! Массарскій хреб. между верховьями Кахетинской Алазани и Іоры, альп. ковры. 24. VII. 03. Бушъ! Между Ахвахомъ и Доносъ. 8000'. 24. VII. Байернъ! (*f. pumila*). Между Ахвахомъ и Богосомъ. 8000'. Байернъ! Богосъ. Байернъ! Дагестанъ, Андійскій окр., между сс. Сагада и Куайни, верхняя часть соснового пояса. 21. VII. 04. Бушъ! Андійскій окр., между Кодорскимъ переваломъ и с. Хупро, субальп. поясъ. 18.VII. 04. Бушъ! Андійск. округъ между г. Дпжинсха и переваломъ Ниникосъ-цихе, альп. поясъ. 13. VII. 04. Бушъ! Андійск. окр., субальп. луга между с. Шантль и переваломъ къ с. Хоннокъ. 9. VII. 04. Бушъ! Андійск. окр., с. Аквари, кладбище. 3. VII. 04. Бушъ! Кахетія, Телавскій у., Тифлисской губ., субальп. луга горы Андаразанъ. 9.VII. 98. Өм.!! (*f. grandiflora*). Гора Хочаль-дагъ надъ мѣст. Лагодехи въ Сигнахскомъ уѣздѣ, Тифл. губ. „Лысая гора“. 18.VII. 94. Пурингъ! Гора Хочаль-дагъ „Лезгинскій кутанъ“. 16. VII. 98. Өм.!! Тамъ-же, альп. луга. 17. VII. 98. Өм.!! (*f. grandiflora*). Тамъ-же, у границы лѣса. 7000'. 12. VII. 00. Гриневъ! Дагестанъ. Салты. 6500'. 15. VII. 94. Пурингъ! Закатальск. окр., субальп. луга выше аула Сарыбашъ. 20. VI. 99. Өм.!! Гора Базаръ-дюзи близъ Куруша. 1874. Беккеръ! (*f. grandiflora*). Курушъ. 1872. Фаустъ! (*f. grandiflora*). Крысъ. 1873. Беккеръ! Между Курушемъ и Кро. Беккеръ! Близъ с. Курушъ, на лугахъ. 7600'. 1. VIII. 98. Алекс.! Шальбузъ-дагъ. Радде! Шахъ-дагъ. Абихъ. — **X. D.** Дагестанъ, Аварскій окр., между станціями Карадагъ и Салта по дорогѣ въ Хунзахъ. 3. VII. 88. Анисимовъ! Шара-Аргунъ. 22.VII. 93. Радде и Кёнигъ! (*f. grandiflora*). Гунибекій окр., Верхній Гунибъ, путь къ вершинѣ Маякъ. 5.VIII. 04. Бушъ! Ахты. 1880. Беккеръ! — **S. D.-K.** Дагестанъ, Даргинск. окр., близъ сел. Левашы между посѣвами. 3700'. 2.VII. 98. Алекс.! — **S. Ib.** Верхняя Карталинія. Эйхвальдъ. Грузія, южн. склонъ г. Тахта. 9.VII. 90. Кзнц.! Луга въ верховьяхъ Содени. 9. VII. 90. Кзнц.! (*f. grandiflora*). Кахетія, Телавск. у., Тифл. губ., ст. Тетрисъ-цхали. 5.VII. 98. Өм.!! Кахетія, Карданахъ. 17.V. 01. Аверкинъ! Лагодехи, лѣсъ. 24.VI. 98. Өм.!! — **X. A.** Абаранъ, близъ Алагеза, ущелье Каранлугъ. 5. VIII. Ходятовскій! (*f. grandiflora*). Съенокъ на Башъ-Абаранъ. 3.VIII. Ходятъ! (*f. grandiflora*). Абаранъ, ущелье Кабахлу. 10. VIII. Ходятовъ! (*f. grandiflora*). Гора Шамбобель въ Ахалцыхскомъ уѣздѣ, Тифл. губ. VII. 75. Радде! (*f. grandiflora m.; in herb. Trautvetteri sub var. elliptica* Trautv.). Карсская обл., Угурлы. 7. VII. 03. Кёнигъ! Дали-чай. Абихъ. Даралагезъ. Абихъ. Между Большимъ и Малымъ Араратомъ. Абихъ. Сардаръ-Булагъ. Абихъ. — **S. S.-K.** Альпійская полоса Карталинескихъ горъ вблизи Манглиса. 7—10.VII. 87. Медвѣдевъ! Коджоры. 1878. Смирновъ! Г. Цхра-цхари. 18. VII. 87. Акинф.! Выше Бакуръяни, субальп. луга. 14. VII. 01. Мищенко! (*f.*

grandiflora). Тамъ-же ниже Бакурьяни, лѣсныя дужайки. 14. VII. 01. Мищенко! Тамъ-же. 8—12. VII. 88. Акинф.! (*f. grandiflora*). Боржомъ по лѣв. берегу р. Куры. 2700'. 13. VII. 87. Акинф.! Мамутлы. Байернъ! (*f. grandiflora*). Отроги г. Сары-кая въ Елисаветпольск. уѣздѣ. 6700'. 1. IX. 96. Медв.! (*f. grandiflora*). Гора Саріаль. Гогенаккеръ! (*f. grandiflora*). Истоки р. Тертеръ. Абихъ. Лысогорскъ. VI. 87. Камсараканъ! Тамъ-же. 3. VI. 95. Ломак.! Гора Саксаганъ. VII. 86. Камсараканъ! (*f. grandiflora*). Субальп. регионъ горы Кепестъ-дагъ. 26. VI. 44. Коленати! (*f. grandiflora*). Карабахъ, уроч. Чанлу-гель, Чоль-баиръ. 6500—8000'. 21—24. VI. 93. Скибицкій! (*f. grandiflora*). Карабахъ у опушки лѣса близъ сел. Липскъ. 24. VI. 03. Гринев.! (*f. grandiflora*). Альп. обл. бл. сел. Кирсъ. 8000'. 1. VII. 03. Гринев.! Закавказье, горы. 31. VII. 94. Романовскій! — **S. L.** Свантъ. Гогенаккеръ. (n. v.). Талышъ. Нагорная ст. выше сел. Тули. 18. VI. 94. Ломакинъ! Гермишъ. 30. VI. 80. Радде! — **S. T.-N.** Крымъ. Шмальгаузенъ!

Ar. Geogr. Europa omnis sept. et media! usque ad Hispaniam et Italiam centrales, Dalmatiam, Rossiam mediam et australem!, Sibiria omnis, Dahuria.

Примѣч. *C. glomerata* L. является видомъ сильно варьирующимъ не только въ такой горной странѣ какъ Кавказъ, но даже и на равнинахъ Россіи. Населяя въ Россіи какъ тѣнистыя лѣса изъ лиственныхъ породъ, такъ равно свѣтлыя сосновые боры и степные луга, этотъ видъ выработалъ и на равнинѣ такіе варьеты, какъ var. *oblongata* Trautv., var. *farinosa* DC. и var. *coriacea* m. Первая разновидность свойственна лѣсамъ западной части Россіи, вторая встрѣчается на востокъ Россіи, главнымъ образомъ на степныхъ лугахъ и опушкахъ сухихъ сосновыхъ лѣсовъ. Что касается третьей разновидности, то она, повидимому, свойственна лѣсо-степной полосѣ Европ. Россіи и происходитъ изъ Сибири. На Кавказѣ къ упомянутымъ разновидностямъ присоединяются еще формы чисто кавказскаго происхожденія, какъ напр. var. *hispida* m., var. *symphytifolia* Alb. и var. *caucasica* Trautv. Къ типу относится собственно форма, имѣющая наиболѣе широкое распространеніе какъ въ Западной Европѣ, такъ равно и въ Россіи, а также и горныхъ областяхъ Кавказа. Форма эта характеризуется широкими листьями, яйцевидными или продолговатыми, по краю мелко-городчатыми. Опушеніе у типичной формы всегда мягкое и не густое, вѣнчикъ голый или съ очень рѣдкими волосками средней величины, но въ высокогорныхъ областяхъ на альпійскихъ лугахъ чаще встрѣчаются формы съ крупными цвѣтами; выдѣлять однако эту форму въ разновидность нельзя, такъ какъ никакихъ другихъ отличій кромѣ величины вѣнчика у нея нѣтъ и если культивировать ее на низменности, то цвѣты получаются средней величины. Такая крупноцвѣтная форма была привезена съ Карталинскихъ горъ близъ Мангиса въ Тифлисскій Ботаническій Садъ, гдѣ была посажена въ Кавказскомъ отдѣлѣ и на другой же годъ стала развивать цвѣты средней величины.

var. oblongata Trautv. foliis radicalibus et caulinis anguste oblongis, basi cuneato angustatis. 4. v. s. in h. P.

Trautv. in A. H. P. VI. p. 69.

Hab. in regione silvatica et subalpina provinciae Kuban. — **S. K.** Кубанск. обл., субальп. луга въ верховьяхъ р. Мары. 7. V. 89. Кзниц.! Долина р. Загданъ на Большой Лабѣ. Поляны въ хвойномъ лѣсу. 10. VII. 99. Бушъ! Высоты Герпегемъ близъ Песбая. 11. VII. 88. Кзниц.! Кардтжуртъ. 5. VII. 90. Линск.!

Ar. Geogr. Rossia septentr. et occidentalis!

Примѣч. Этотъ варететъ встрѣчается преимущественно въ сѣверной и западной Россіи и на Кавказѣ найденъ только въ Кубанской об-

ласть. Кавказскіе экземпляры вполне схожи съ экземплярами изъ Петербургской губ., изъ Пермск. губ. и Могилевской губ.

var. coriacea m. bracteis basi membranaceis, foliis omnibus *firmis coriaceis* omnibus ovatis vel ovato-oblongis acuminatis margine *crenato-serratis crispis*, inferioribus longe petiolatis basi saepe inaequalibus vel angustatis et in petiolum decurrentibus, omnibus glabris vel adpresse rigide pilosis. **4.** v. s. in h. P. A. J. M.

Exslcc. F. Karo, Pl. Dahur. № 271. (determ. I. Freyи sub *C. glomerata* L. a. *gemma* Herd.)!

Hab. in Caucaso septentrionali prov. Terek et in Transcaucasia centrali (?). — **S. T.** Бештау. Гогенаккеръ! Тамъ-же. 28.VI. 89. Кэнц.! 1890. Акинф.! Тамъ-же. 19. VII. 67. Оверинг! Гора Брыковая. 1800'. 26.VI. 89. Акинф.! Г. Джиналь. 4800'. 17.VII. 89. Акинф.! Кисловодскъ. 28. VIII. 66. Байеръ! Тамъ-же. 26. VII. 82. Акинф.! Тамъ-же, водопадъ. 3000'. 12.VII. 89. Акинф.! Кисловодскъ. 18.VII. 90. Липск.! Карпась. Гогенаккеръ! Терск. обл., у р. Баксана, близъ Корхужанъ. 4000'. 15.VII. 96. Алексѣенко! Турчи-дагъ. Лаговскій! — **A. M.** Центральный Кавказъ. 1877. Вдовъевъ! — **S. S.-K.** (?) Покося на востокъ отъ сел. Воронцовки. 5. VIII. 00. herb. Jurjew!

Arg. Geogr. Dahuria!, Sibiria baical., Rossia septentr. et orientalis!

Примѣч. Характерные кожистые, твердые листья по краю городчатопильчатые и курчавые хорошо отличаютъ этотъ варьететъ отъ всѣхъ формъ *C. glomerata* L. Варьететъ этотъ, повидному, болѣе широко распространенъ въ Сибири. Въ Россіи онъ попадаетъ въ Пермской губ., Уфимск. и Оренбургской губ. гораздо чаще и тѣмъ дальше на югъ, тѣмъ рѣже. Въ гербаріи Траутфеттера имѣются экземпляры var. *coriacea* m. изъ Черниговской губ., Городнянск. уѣзда; эти экземпляры собраны Роговичемъ. Сибирскіе и русскіе экземпляры чаще имѣютъ листья голые, наоборотъ экземпляры кавказскіе имѣютъ всегда на листьяхъ опушеніе изъ короткихъ прижатыхъ волосковъ. Сибирскіе экземпляры и видѣлъ въ гербаріяхъ Лѣсного Института и Юрьевск. Ботан. Сада. (F. Karo. Plantae Dahuricae. № 271.). На Кавказѣ var. *coriacea* весьма часто встрѣчается въ Терской области. Въ присланныхъ мнѣ въ прошломъ году *Campanulaceae* изъ Юрьевск. Ботан. Сада находятся экземпляры *C. glomerata* L. var. *coriacea* m. изъ Воронцовки съ датой „5. VIII. 00“ —, повидному, изъ Борчалинскаго уѣзда Тифлиск. губ.? На этикеткѣ не обозначено, кѣмъ собраны эти экземпляры.

* **var. hispida** m. caulibus et praecipue foliis *hispidis*, foliis radicalibus et caulinis ovatis, floribus *terminalibus capitatis*. **4.** v. s. in h. A. P. J. M. K.

Syn. *C. glomerata* var. *speciosa* Trautv. in herbariis (partim). — *C. glomerata* var. *typica* Trautv. in herb. (partim).

Hab. in pratis siccis et silvaticis Caucasi septentrionalis ubique in Transcaucasia. — **St. A.** Ставропольск. губ., Бурлацкое. 9.VI. 90. Липск.! Близъ Ставрополи. 1867. Беккеръ! — **S. T.-N.** Новороссійскъ. 1.VII. 93. Радде и Кёнигъ! — **S. K.** Кубанск. обл., Крымская. 8.VI. 91. Липск.! Ст. Полтавская. 19. VI. 90. Полторацкій! Екатеринодаръ. 7. VI. 91. Липск.! Между Абадзехской и Дагестанской, поляны и дубнякъ. 21.V. 99. Бушъ! Между Хадзыгинской и ст. Навагинской, дубовые лѣса. 22. V. 99. Бушъ! Между Апшеронской и Суходольской, дубовый поясъ. 28. V. 99. Бушъ! Майкопъ. 4. VI. 91. Липскій! Невинномыская. 13. VI. 90. Липск.! Армавиръ. 19. VI. 90. Липск.! Кубанская область. Въ Крас-

помѣ лѣсу, по лугамъ и на опушкѣ. 14. VIII. 81. Полторацкій! — **S. T.** Сѣверный Кавказъ. Гёффтъ! Мар. Биб.! Сѣверный Кавказъ. Норд-маннъ! (In herb. Hort. Bot. Jurjew. sub *C. desertorum* Weinm.). Бештау. Патерсонъ! Тамъ-же. Гогенаккеръ! Пятигорскъ, вершина Машука. 2. VII. 98. Шумовъ! Тамъ-же, у подножія Машука. VI. 98. Шумовъ! Терская обл. Шелкозаводская. 30. V. 90. Липск.! Кисловодскъ. 2200'. VI. 89. Акниф.! Ессентуки. VI. 67. Оверинъ! Тамъ-же. 10. VII. 66. Байернъ! Озеро близъ Владикавказа. Б. Федченко! Владикавказъ. 15. VI. 67. Оверинъ! Между Владикавказомъ и Ларсомъ. 9. VII. 43. Коленати! Осетія, Мокаевская поляна. 20. VI. 92. Марковичъ! Къ западу отъ Буртуная. 11. VI. 94. Радде и Кенигъ! — **A. W.** Верховья Лабы, субальп. поясъ. 24. VII. 88. Кзнци.! — **A. M.** Центральный Кавказъ. 1877. Вдовьевъ! — **S. P.** Карталинія — Имеретія — Мингрелія. Лаговскій!

Примѣч. Стебли и въ особенности листья у var. *hispida* m. покрыты жесткими щетинистыми волосками, отходящими отъ основанія толстаго бугорка и такимъ образомъ по опушенію напоминаютъ листья какого-либо представителя сем. *Borraginaceae*. Форма листьевъ у этого варьетета всегда овальная; цвѣты собраны въ большую конечную головку. Прицвѣтники опушены такими же волосками, какъ и листья. Варьететъ этотъ, повидному, свойственъ одному Кавказу.

* **var. symphytifolia** Alb. superne cano-pubescent foliis caulinis inferioribus et mediis plus minus petiolatis *ovatis obtusissimis*, supremis *ellipticis ovatisve* sessilibus aplexicaulis obtusiusculis, floribus parvis capitatis *late bracteatis*. *Th. v. s. in h. P. Th.*

Alb. w., in Prodr. Fl. Colch. p. 161. — Липск. Фл. К. стр. 379.

Syn. *C. glomerata* var. *latibractea* Som m. & Lev. in A. H. P. XVI. p. 326.

Hab. in regione alpina et silvatica Transcaucasiae occidentalis ubique in angustis profundis Caucasi orientalis. — **A. W.** Абхазія, гора Мамдышка, альп. луга. 31. VIII. 94. Альб.! — **S. P.** На холмахъ близъ Трапезунда. 14. VI. 90. Сомм. и Лев.! (in herb. Hort. Petrop. sub var. *latibractea* Som m. et Lev.). — **A. O.** Горы и ущелья Нухинскаго уѣзда, Елисаветпольск. губ. Камсаракавъ! Нухинск. у., Елисаветпольск. губ., у истоковъ р. Дашагиль-чай, луга. 9000'. 14. VIII. 00. Алексѣенко! Курушъ. 1876. Беккеръ!

Примѣч. Болѣе мелкіе цвѣты и широкіе верхушечные листья, придвинутые къ самой головкѣ соцвѣтія, хорошо отличаютъ этотъ варьететъ отъ всѣхъ другихъ формъ *C. glomerata* L. Опушеніе у этого варьетета мягкое сѣроватое, состоящее изъ длинныхъ тонкихъ волосковъ. Форма эта свойственна влажному климату и на востокѣ Кавказа сохранилась въ глубокихъ ущельяхъ и затѣненныхъ лугахъ.

var. cervicarioides A. D C. caule *flexuoso hirsuto*, metri altitudine et ultra, foliis inferioribus longe petiolatis, floribus *terminalibus et axillaribus*, corolla plus minus *pubescente*. *Th. v. s. in h. A. P. Tm. M.*

A. D C. Monogr. Camp. p. 255. — D C. Prodr. VII. p. 468. — Traut v. in A. H. P. II. 2. p. 564; VI. p. 69.

Syn. *C. glomerata* var. *farinosa* Traut v. in herbariis (partim).

Hab. in graminosis siccis regionis montanae Transcaucasiae, usque ad 6500'. — **S. T.-N.** Крымъ, между Орлово и Молочной. VIII. 56. Ходскій! — **S. Ib.** Мцхетъ, Нина-цминда. 8. VII. 73. Ситовскій! Тамъ-же. 11. VII.

73. Оверинъ! Тифлисъ. Ситовск.! — **X. A.** Кареская обл., Ольтинек. окр., Эрюкъ. 13. VII. 03. Кёнигъ! (*f. parviflora*). Сарыкамышъ, у подошвы Саганлуга по дерновинамъ. 27. VII. 86. Масальскій! Кагызманъ-дара, на глинистой почвѣ, часто. 13. VI. 86. Масальск.! Берегъ озера Гокчи въ Эриванск. губ., Еленовка. 3. VIII. 56. Оверинъ! Берегъ оз. Гокчи. VII. 87. Медвѣдевъ! Тамъ-же. 9. VII. 94. Б. Федченко! Дарачичагъ. 1837. К. Кохъ! Въ лѣсу близъ Дарачичага. 30. VII. 03. Гриневецкій! Близъ Дарачичага, гора Алибекъ, лѣсъ. 24. VII. Теръ-Казаровъ! Гёзель-дара. Фриккъ! VI. 71. Радде! — **S. S.-K.** На лугахъ близъ сел. Базаръ-чай. 18. VII. 03. Гриневецкій! — **S. L.** Тальишъ, Свантъ. Гогенаккеръ!

Ar. Geogr. *Rossia australis* (?), *Tauria*!, *Caucasus*!

Примѣч. Этотъ варьететъ отличается высокимъ пзвилистымъ стеблемъ, опушеннымъ жесткими короткими волосками, отчего стебель кажется шершавымъ, цвѣты въ пазушныхъ пучкахъ и конечной головкѣ. Вѣичикъ болѣе или менѣе густо опушенъ. Листья шершавые отъ прижатыхъ жесткихъ волосковъ, прикорневые обыкновенно книзу сужены или слегка закруглены съ длинными черешками, по краю пильчато-городчатые и твердой консистенціи. Въ гербаріяхъ я видѣлъ этотъ варьететъ только изъ Крыма и Закавказья.

var. farinosa A. D C. foliis subtus *incanis*, floribus in capitulum terminalem et alia axillaria sessilia *minora* dispositi, bracteis parvis obtusiusculis vel obtusis. 24. v. v. et s. in h. P.

A. D C. Monogr. Camp. p. 255. — D C. Prodr. VII. p. 469. — Trautv. in A. H. P. VI. p. 69. (sub var. *farinosa* Rochel.).

Hab. in pratis siccis *Tauriae*. — **S. T.-N.** Крымъ. VIII. 56. Ходскій! Крымъ, между Алуштой и Симферополемъ. 29. VI. 1837. Траутфеттеръ!

Ar. Geogr. *Tauria*, *Rossia australis*!

Примѣч. Отъ всѣхъ прочихъ разновидностей отличается мягкимъ короткимъ сѣрымъ опушеніемъ стебля и нижней стороны листьевъ. Такииъ-же опушеніемъ покрыты и короткіе, тупые прицѣтники. Вѣичикъ болѣе или менѣе густо опушенъ. Пазушные и конечныя головки цвѣтовъ небольшія темнопцѣтковые. Разновидность эта встрѣчается весьма часто на югъ Россіи и въ восточныхъ губерніяхъ, какъ напр. въ Самарской и Саратовской. Съ Кавказа этой разновидности я не видѣлъ. Разновидность *canescens* Maxim. Fl. anur. p. 185. отъ var. *farinosa* отличается только болѣе длиннымъ опушеніемъ.

* **var. caucasica** Trautv. caulibus pumilis paucifoliatis, capitulo solitario *terminali paucifloro* floribus sat magnis, bracteis basi membranaceis oblongis *abrupte acuminatis*, foliis margine obtuse serratis. 24. v. s. in h. A. P. Tm.

Trautv. in A. H. P. II. 2. p. 564.

Syn. *C. glomerata* var. *speciosa* Trautv. in A. H. P. VI. p. 69. (partim).

Hab. in rupestribus regionis alpinae et silvaticae *Caucasi*. — **S. T.** Хасавъ-юртекій окр., Салатау, выше Амиръ-ханъ-ресса. 28. VI. 97. Алеке.! — **X. D.** Дагестанъ, Эйзенъ-амъ, около дороги. 7000'. VI. 95. Десулавъ! — **X. A.** Семеновка. 7. VII. 94. Б. Федченко! Алагезъ, ущелье Кабахлу. 10. VIII. Хоцятовъ! Гёзель-дара. 2. VII. 71. Радде! Кареская обл., стан. Мапра. Горанинъ! Кырхъ-килнесса. 6. VII. 03. Кёнигъ! — **S. S.-K.** Карабахъ, Лысогоorskъ. V. 87. Камсараканъ! Эшекъ-мейданъ. 8400'. 1868. Оверинъ! Коджоры. 4. VI. 72. Ситовскій! Тамъ-же, подъ Керъ-оглы. 11. VI. 67. Оверинъ!

Примѣч. Отъ крупноцвѣтной формы *C. glomerata* L. главнымъ образомъ отличается меньшимъ количествомъ цвѣтовъ въ головкѣ и сильно заостренными прицвѣтниками. Листья на стеблѣ немногочисленные, нижніе и стеблевые при основаніи закругленные, по краю притупленно-пильчатые. Форма эта, какъ то можно судить по характеру корня, т. е. его длинѣ, присутствію у основанія стебля отмершихъ и не перегнившихъ остатковъ листовыхъ влагалищъ, произрастаетъ на скалахъ въ сухихъ мѣстностяхъ Кавказа.

* **var. artwinensis** O. Ktze. subacaulis vix bipollicaris incano-villosa. Inflorescentia glomerata unica magna multi-(10—15)flora, floribus normalibus involucro minoribus, foliis involucrantibus maximis acuminatis. *У. п. v.*

O. Ktze. Plantae Orientali-Rossicae. p. 206.

Hab. In prov. Transcaucasiae occid. — **S. P.** Артингъ. О. Кунтце.

Примѣч. По описанію этотъ варьететъ О. Кунтце приближается къ *C. macrochlamys* Boiss. et Huet. Не будетъ ли это маленькій экземпляръ *C. macrochlamys* Boiss.?

Sect. II. *Rapunculus* Boiss.

Capsula poris vel valvulis lateraliter prope apicem, rarius versus medium dehiscens.

Boiss. Flor. Orient. III. p. 895. — Engl.-Prnt. IV. 5. p. 51. --

Syn. *Encodon* A. D C. Monogr. p. 214. (partim).

46. **C. fastigiata** Dufour carnosula grisea scabra nana erecta a collo *dichotome et stricte ramosissima fastigiata*, foliis minutis puberulis vel glabris radicalibus ovatis integris subpetiolatis, rameis oblongo-cuneatis *grosse 3—5-dentatis*, supremis lineari-oblongis, floribus subsessilibus ad dichotomias et oppositifoliis minimis, calycis laciniis lineari-lanceolatis obtusiusculis *rectis* tubo longe obconico *subaequilongis* corolla minima obconica ad $\frac{2}{3}$ lobata *duplo longioribus*, capsula longe obconica profunde sulcata et quinquecostata poris prope apicem dehiscente. ☉. v. s. in h. P. Tm. J.

Duf. in Alph. D C. Monogr. Camp. p. 340. — D C. Prodr. VII. p. 483. — Hohenack. in Enum. Talysh. p. 293; Enum. Elisabethpol. p. 221. — Ledeb. II. p. 891. — C. Koch, in Linnaea. XXIII. p. 645. — Trautv. in A. H. P. VI. p. 91. — Boiss. III. p. 944. — Липск. Фл. К. стр. 380. — Radde. Mus. Cauc. II. p. 122.

Syn. *Campanula* sp. *C. fastigiatae affinis* Hohen. in Bull. de Mosc. 1833. p. 221.

Icon. A. D C. Monogr. Camp. tab. 12.

Hab. in agris incultis Transcaucasiae orientalis. — **S. Ib.** Около Нухи надъ р. Кншъ-чай при впаденіи ея въ Айры-чай. Лаговскій! — **S. S.-K.** Между Елисаветполемъ и колоніей Еленендорфъ. Гогенакерь!

Примѣч. Распространеніе этого вида на Кавказъ изслѣдовано плохо, такъ какъ оно указано пока только изъ двухъ мѣстъ; въ виду того, что растеніе это почти сорное и свойственно сухимъ солоповатымъ мѣстамъ, оно должно бы встрѣчаться и въ южномъ Закавказьѣ напр. Арменіи, которая представляетъ продолженіе Малой Азіи, гдѣ видъ этотъ, повидимому, встрѣчается часто.

Ar. Geogr. Hispania centralis, Africa borealis interior, Asia minor.

47. **C. Rapunculus** L. pubescens asperula rarius glabra radice *fusiformi carnosa*, caule erecto inferne foliato simplici vel stricte paniculato,

ramis virgatis longe racemosis, foliis obtuse crenatis radicalibus oblongis sensim attenuatis subpetiolatis, superioribus lanceolatis vel lineari-lanceolatis acutis sessilibus, floribus solitariis rarius subternis flore intermedio longius pedunculato, calycis laciniis *lineari-subulatis* basi plus minus *denticulatis erecto-patulis*, tubo obconico plus minus *spongioso-tuberculato* 2—3-plo longioribus, corolla coerulea infundibuliformi ad tertiam partem in lobos oblongo-lanceolatos fissa. ☉. v. v. et s. in h. A. P. J. M. Th. Tm.

L. Sp. 232. — A. D. C. Monogr. Camp. p. 325. — D. C. Prodr. VII. p. 480. — M. B. Fl. taur.-cauc. III. p. 138. — C. A. Mey. Verzeichn. d. Pflanz. d. Cauc. p. 85. — Hohenack. Enum. Elisabethpol. p. 221; Enum. Talysch. p. 63. — C. Koch, in Linnaea. XVII. p. 280. — Ledeb. II. p. 887. — Buhse, Aufzähl. etc. p. 143. — Boiss. III. p. 939. — Trautv. in A. H. P. VI. p. 89; VII. 2. p. 479. — Шмалъг. II. стр. 176. — Albow. Prodr. Fl. Colch. p. 162. — Липск. Фл. К. стр. 380. — Somm. & Lev. in A. H. P. XVI. p. 327. (partim?). — Radde, Mus. Cauc. II. p. 122.

Syn. *C. Lambertiana* A. D. C. Monogr. Camp. p. 327. — D. C. Prodr. VII. p. 480. — *C. verruculosa* Lk. (sec. A. D. C. l. cit.). — *C. fastigiata* Gmel. Reise etc. I. tab. (sec. A. D. C. l. cit.). — *C. Rapunculus* L. var. *Lambertiana* Boiss. III. p. 940. — Ломак. Тр. Тифл. Ботан. Сада, вып. I. стр. 60; Фл. Карабах. стр. 58.

Icon. Ic. Fl. Dan. tab. 1326. — Rehb. Ic. Fl. Germ. tab. 252!

Exsicc. Louis Keller. Ungarn! — Dr. Weihe. Westphalen. № 322!

Нab. in pratis siccis regionis inferioris et montanae Caucasi. — **S. T.-N.** Крымск. Herb. Trautv.! — **S. K.** Кубанск. обл. Крымская. 14. VI. 90. и 8. VI. 91. Липск.! Кубанск. обл., между Ширванской и Аншеронской, въ узкой полосѣ кустарниковъ между дубовымъ лѣсомъ и полемъ. 21. V. 99. Бушъ! — **S. T.** Предкавказье. К. Кохъ (п. v.). Кубанск. обл. около Невинномысской. 15. VI. 96. Бушъ! Бештау. 1867. Беккеръ! Пятигорскъ. Гогенаккеръ! Желѣзноводскъ. 12. VI. 94. Б. Федченко! — **S. P.** Абхазія, Доухья. 700 м. №№ 65, 71, 72. Альбовъ (п. v.). — **S. Ib.** При сліяніи р. Арагвы съ р. Курой. Лаговскій! — **A. A.** Ханлы, перевалъ между Аджаріей и Ахалцхскимъ уѣздомъ, субальп. луга. 23. VI. 90. ff. Соммъ и Левъ (п. v.)¹⁾? — **S. S.-K.** Коджоры. 3. VI. 89. Зейдлицъ. (п. v.). Карабахъ, лѣсъ у сел. Саркисашенъ. 9. VI. 95. Ломак.! Шуша. Гогенаккеръ! — **S. L.** Талышъ, Свантъ. VII. Гогенаккеръ! У сел. Астара и Ашевларъ. VIII. 1847. Бузе. (п. v.). Ленкоранъ. Беккеръ! Вл. Ленкорани. 1/2. VI. 80. Радде! Лѣсъ у Ленкорани. 27. V. 94. Ломак.! Ущелье Тенгъ. 25. VI. 80. Радде! Лѣсъ у сел. Джонн. 5000'. 14. VI. 94. Ломак.! Лѣсъ у сел. Геллимовъ. 2500'. 9. VI. 94. Ломак.! — Кавказъ. 1825. Поморцевъ!

Примѣч. Типичная форма *C. Rapunculus* L. съ длинными растопыренными вѣточками и удлиненными цвѣтоножками на Кавказѣ встрѣчается рѣдко; болѣе часто встрѣчается var. *spiciformis* Boiss. съ укороченными вѣточками и цвѣтоножками. Что касается var. *Lambertiana* Boiss., то Траутфеттеръ вполне основательно причислил ее къ типу, такъ какъ всѣ формы *C. Rapunculus* L. имѣютъ по краю чашелистиковъ зубчики. Зубчики эти бываютъ то очень короткими, то, наоборотъ, сильно удлиненными, вслѣдствіе чего чашелистикъ представляется какъ бы перисто-

¹⁾ Экземпляръ, собранный Соммъ и Левъ между Хула и Данаисъ-Параулъ № 887 и опредѣленный ими какъ *C. Rapunculus* L. (in herb. H. Bot. Petrop.) оказался *C. hemschinica* C. Koch (см. ниже примѣч. къ *C. hemschinica* C. Koch, стр. 117.).

раздѣльнымъ. Весьма характерно у *C. Rapunculus* L. опушеніе трубки чашечки, которое состоитъ изъ бѣлыхъ мелкихъ губчатыхъ бугорковъ.

Ar. Geogr. Europa omnis a Dania et Gothia ad Rossiam mediam, Sibira uralensis, Africa borealis.

* **var. spiciformis** Boiss. pedunculi calyce breviores saepe brevissimi et racemi ideo anguste spiciformes. ☉. v. v. et s. in h. A. P. J. Tm. Th.

Boiss. III. p. 940.

Syn. *Campanula virgata* A. D C. Prodr. VII. p. 483 et herb. (non Labill.)

Hab. in pratis siccis Cis-et Transcaucasiae. — **S. K.** Кубанск. обл., между Ключевой и Кутанеской, поля дубовыхъ лѣсовъ. 27. V. 99. Бушъ! Стан. Кутанеская. 13. VII. 88. Кзнц.! Кубанск. обл. Майкопъ. 4. VI. 91. Липск.! — **S. T.** Кубанск. обл. Невинномыская. 26. VI. 90. Липск.! Бештау на лугахъ. 1813. М. Виб.! Беккеръ! Терская обл. Минеральные Воды. 6. VI. 92. Липск.! Каррасъ. 1840. Гогенаккеръ! Тарки. К. А. Мейеръ! — **S. D.-K.** Дербентъ. Беккеръ! Петровскъ. 26. V. 90. Липск.! Между Петровскомъ и Темиръ-Ханъ-Шурай близъ Кумъ-теръ-кале, на горахъ Уллу-тикъ. 2082'. 5. VI. 61. Рупрехтъ! Близъ Дербента, между кустарниками. 23. VIII. 99. и 15. V. 01. Алекс.! Бакинск. губ., Кубинск. у., близъ ст. Дивичи, на холмѣ между кустарниками. 500'. 28. VI. 99. Алекс.! — **S. Ib.** Бакинск. губ., близъ Шемахи, въ ущельѣ Пиръ-дареки. 2600'. 4. VIII. 00. Алекс.! (с. fruct.). Тамъ-же, на камняхъ между кустарниками. 2800'. 28. VII. 00. Алекс.! Бакинск. губ., Шемахинск. уѣздъ, близъ сел. Аку. 17. V. 04. Родионовъ! — **S. L.** Талышъ. Ленкорань. VI. Гогенаккеръ! К. А. Мейеръ! Тамъ-же. V. 70. Радде! 1872. Беккеръ! Талышъ, лѣсъ у сел. Асакуджа. 1. VII. 94. Ломак.! На лугахъ и между кустарниками, между сел. Кизилъ-агачъ и Ленкоранью. 16. V. 1830. К. А. Мейеръ! Въ кустарникахъ и лѣсахъ близъ сел. Перимбалъ. 6. VI. 1830. К. А. Мейеръ! Островъ Сары въ Каспійскомъ морѣ. 22. V. 80. Радде!

48. *C. lactiflora* M. B. pubescens vel glabrata, caulibus erectis crassiusculis foliosis, foliis radicalibus ovatis vel ovato-oblongis acutis breviter petiolatis, caulinis ovato-oblongis vel oblongis sessilibus, omnibus margine biserratis, serraturis glanduligeris, floribus mediocribus in paniculam latam dispositis, calycis laciniis ovato-lanceolatis margine denticulatis denticulis glanduligeris corolla alba vel coerulescente late campanulata usque ad medium fissâ 2—2¹/₂-plo brevioribus, tubo calycino obconico glabro vel setis albis obsito. 24. v. v. et s. in h. A. P. J. M. S. Th. Tm.

M. B. Fl. taur.-cauc. I. p. 153.; III. p. 143. — A. D C. Monogr. Camp. p. 311. — D C. Prodr. VII. p. 477. — C. A. Mey. Verzeichn. d. Pflanz. des Caucas. p. 85. — C. Koch, in Linnaea. XVII. p. 280. — Rupr. Bull. de l'Acad. de sc. de St. Pétersb. XI. p. 198. отд. отд. — Tchihatch. Asie Min. II. p. 399. — Ledeb. II. p. 890. — Boiss. III. p. 935. — Trautv. in A. H. P. IV. 2. p. 390; VI. p. 88. — Шмальг. II. стр. 176. — Albow, Prodr. Fl. Colch. p. 161. — Липск. Фл. К. стр. 379. — Somm. & Lev. in A. H. P. XVI. p. 326.

Syn. *C. cellidifolia* Boiss. Diagn. Ser. II. 3. p. 111. — Tchihatch. l. cit. p. 398. — *C. biserrata* C. Koch, Linn. XIX. p. 29.

Icon. M. B. Cent. tab. 10. — A. D C. Monogr. Camp. tab. 7! — Bot. Mag. 1973.

Exsicc. Sintenis. Iter Orientale. 1894. № 7079!

Hab. in regione silvatica et subalpina totius Caucas. 3000—8000'. — **S. K.** Кубанск. обл. Хамышк. 2. VII. 88. Кзнц.! (perianth. glabro). Пильня въ Шахъ-Гиреевскомъ ущельѣ. 13. VII. 88. Кзнц.! (perianth. piloso). Кубанск. обл., ущелье р. Умпыря, хвойный поясъ. 11. VII. 99. Бушъ! (perianth. glabro). Долина р. Теберды отъ устья Аманауза до Тебердинскаго аула, пихтово-еловый поясъ. 30. VII. 96. Бушъ! (perianth. piloso). — **S. T.** Терская обл., верховья р. Нальчика. 4000'. 24. VII. 92. Липск.! (perianth. piloso). Терск. обл. Кара-Су (Нальчикъ). 4000'. 24. VII. 92. Акнф.! (perianth. piloso). Бурьянъ на полянѣ въ лѣсу между Кашкатау и Каспарты. 28. VII. 89. Кзнц.! (perianth. piloso). Между Нальчикомъ и Кашкатау. 28. VII. 89. Кзнц.! (perianth. piloso). На лѣсныхъ лугахъ близъ сел. Алагиръ. 14. VI. 97. В. Цингеръ! (perianth. piloso). Алагиръ. 24. VI. Марков.! (perianth. piloso). Тамъ-же. 24. VI. 00. Левитск.! Алагиръ по Ардону. 2100'. 26. VI. и 1. VII. 91. Акнф.! (perianth. piloso). Близъ Владикавказа. 19. V. 73. Н. Зейдлицъ! (perianth. piloso). Владикавказъ. Габе! (perianth. piloso). Балта, въ лѣсу. 25. VII. 95. Десулави! (perianth. piloso). Салатау, внизу среди фруктовыхъ деревьевъ. 1889. Кзнц.! (perianth. glabro). — **X. D.** Дагестанъ, Турчи-дагъ. Лаговск.! (perianth. piloso). — **A. W.** Верховья Лабы, субальп. обл. 27. VII. 88. Кзнц.! (perianth. piloso). Оштень, субальп. луга. 25. VI. 88. Кзнц.! (perianth. piloso). Черкесія, хребетъ Ахача, альп. луга. 1894. Альбовъ. (п. в.). Абхазія, мѣст. Пшица. Альбовъ. (п. в.). Гора Чедымъ, субальп. луга. Альбовъ! (perianth. piloso). Хребетъ Ачирассера, субальп. луга. 1889—92. Альбовъ. (п. в.). Субальп. луга въ верховьяхъ р. Чхалты. 24. VIII. 97. Бушъ! (perianth. glabro). Тамъ-же. 24. VIII. 97. Бушъ! (perianth. piloso). Абхазія, заросли рододендрона и субальп. луга на южн. склонѣ хребта Теймасъ и на г. Уламбъ. 27. VIII. 97. Бушъ! (perianth. glabro). На хребтѣ Клычъ. 26. VIII. 90. Соммъ и Левъе. (capsula obovato-conica albo-setosa). Клухорскій перевалъ, южн. склонъ 2300 m. fl. Соммъ и Левъе. Субальп. луга Бамбакаскаго хребта между верховьями Чегса и г. Варынугомъ. 9. VIII. 99. Бушъ! (perianth. glabro). Заросли кустарнаго бука на подъемѣ къ Бѣлорѣченскому перевалу (Шнтлибъ) въ верховьяхъ р. Бѣлой. 25. VII. 99. Бушъ! (perianth. piloso). Луга въ верховьяхъ главнаго истока р. Бѣлой подъ Бѣлорѣченскимъ переваломъ. 25. VII. 99. Бушъ! (perianth. glabro). Кубанск. обл., долина р. Теберды близъ дороги въ пихтовомъ лѣсу, версты на 4 выше подъема въ верховья Уллу-Муртчу. 16. VII. 97. Бушъ! (perianth. piloso). Субальп. полоса около праваго I разр. Тебердинскаго ледника. 18. VII. 97. Бушъ! (perianth. glabro). Теберды. 11. VII. 90. Липск.! (perianth. glabro). — **A. M.** Сванетія, между Лентехи и Чолуръ. 30. VII. 90. fl. Сомм. и Лев.! (specim. perianth. piloso et glabro). Близъ Чолура. 930 m. 31. VII. 90. fl. Сомм. и Левъе! (perianth. piloso). Гора Тетенаръ въ лѣсу на высотахъ. 1. VIII. 90. и на подъемѣ Утбри. 18. VIII. 90. Сомм. и Левъе. Ушугатъ, fl. Лойка. (perianth. glabro). Мингрелія, на границѣ съ Сванетіей, хребетъ, отдѣляющій верховья Магана отъ Цхеннсъ-цхали, кустарники. 17. VIII. 90. Кзнц.! (perianth. piloso). Гора Кыра. 1950—2000 m. № 262. 28. VII. 1894. Альбовъ. (perianth. piloso). Гора Джвари, альп. луга. 1893. Альбовъ. (п. в.). Латаль. 5000'. 5. VII. 90. Акнф.! (perianth. piloso). Бечосск. перевалъ. 9. VII. 90. Акнф.! (perianth. glabro). Балкарія, Кара-Су. 3000'.

14. VII. 92. Акинф.! (perianth. glabro). Осетія. Ленскортъ. VII. 92. Марков.! (perianth. piloso). Горн. луга Чермой-ламя. VI. 92. Марков.! (perianth. piloso). Даргендукская военная лѣсная тропа около сел. Улуст-кортъ. 14. VII. 96. Кассіевъ! (perianth. glabro). Заводскія луга по р. Цроу. 2—18. VII. 95. Марков.! (specim. perianth. glabro et piloso). Сурхъ, буковый лѣсъ. 1. VIII. 95. Марков.! (perianth. piloso). Цуканъ-су. 3000'. 15. VII. 91. Акинф.! (perianth. piloso). Казбекъ. Лаговскій! (perianth. glabro). Гуть-гора. 6462'. 6. VIII. 44. Коленати! (folia). Кайшауръ. М. Биб. Гогенаккеръ! Крестовый переваль. 1879. Смирновъ! (perianth. piloso). Млеты. 24. VII. 88. Акинф.! (perianth. piloso). Центральный Кавказъ. 1877. Вдовъевъ! (perianth. piloso). — **A. O.** Хевсурія, близъ Борбало. Байернъ! (perianth. piloso). Пшавія, буковый лѣсъ въ верховьяхъ р. Іоры, спускъ къ Хиліани. 24. VII. 03. Бушъ! (perianth. piloso). Правый склонъ ущелья Кахетинской Алазани, субальп. заросли березы и *Acer Trautvetteri*. 24. VII. 03. Бушъ! (perianth. piloso). Кахетія, гора Хочалдагъ надъ мѣст. Лагодехи. 7000'. 24. VII. 98. Өом.!! (perianth. piloso). Тамъ-же. „Лысая гора“. 18. VII. 94. Пурингъ! (perianth. piloso). Зака-талъск. окр., въ субальп. лугахъ. 7. VII. 99. А. Сележнинская! (perianth. piloso). Елисаветпольск. губ., Нухинскій уѣздъ, у р. Яшукъ-чай (Бумъ-чай) въ тѣнистыхъ мѣстахъ. 6700'. 28. VII. 99. Алексе.! (с. fruct. et flor., perianth. piloso). — **S. P.** Абхазія, ущелье р. Кодора на пути отъ Сухума до уроч. Ажары. (Арѣ-чарѣ) 1. VII. 95. Бушъ! (perianth. parce piloso). Пихтовый лѣсъ по Чхалтѣ ниже урочища Ачирепса. 25. VIII. 97. Бушъ! (с. fruct., capsula glabra). Буковый лѣсъ въ верховьяхъ Чхалты. 24. VIII. 97. Бушъ! (perianth. glabro). Буковый лѣсъ въ верховьяхъ Джемшиль-амткеля. 29. VIII. 97. Бушъ! (perianth. piloso). Батумъ. 1. VIII. 87. Акинф.! (с. fruct., capsula glabra). Турча, лугъ. 7. VIII. 90. Кзпц.! (perianth. piloso). Рача. 1867. Байернъ! (perianth. piloso). Имеретія. К. Кохъ (п. v.). Кутаисск. губ., высоты Накерала. 4500'. VI. 64. Радде! (perianth. piloso). Гурійская гран., Абастуманъ. VII. 75. Радде! (perianth. glabro). Абастуманъ. 7000'. 24. VIII. 94. Пурингъ! (specim. perianth. glabro et piloso). Тамъ-же. 4800'. 19. VII. 03. Акинф.! (perianth. glabro). Бывшая турецкая граница. VIII. 67. Радде! (perianth. glabro). — **S. Ib.** Карталинія близъ оз. Эрцо, луга на южномъ склонѣ. 18. VII. 90. Кзпц.! (perianth. piloso). На полянѣ въ лѣсу, въ маленькомъ ущельѣ противъ устья р. Чурты недалеко отъ Пассанаура. 11. VII. 90. Кзпц.! (perianth. piloso). Лѣсъ выше Тюнети. 6. VIII. Байернъ! (perianth. piloso). Теченіе Ляхвы. 5. VIII. 97.?! (in herb. Jurjew.) (perianth. piloso). Кахетія. Лагодехи, лѣсъ. 3500'. 17. VI. 98. Өом.!! (perianth. piloso). Тамъ-же, близъ ручья въ лѣсу. 9. VII. 00. Гриневецкій! (perianth. piloso). Иберія. Вильгельмъ! (perianth. piloso). — **A. A.** Зекарскій перев. 7000'. 20. VII. 03. Акинф.! (specim. perianth. glabro). Гурія. Нордманъ! (perianth. glabro). Аджарія, близъ Артвина, гора Мерсуанъ. $\frac{1}{2}$. VIII. 85. Масальск.! (perianth. glabro). Долина Чороха, не часто. $\frac{1}{2}$. VIII. 85. Масальск.! (perianth. glabro). Бывшая турецкая граница. VIII. 67. Радде! (perianth. glabro). — **X. A.** Богутлы. Лаговскій! (perianth. piloso). Араратъ. Ходзько. (п. v.). — **S. S.-K.** Бакуръяни. 6500'. 12. VII. 80. Акинф.! (perianth. piloso). Тамъ-же. 5200'. 13. VII. 03. Акинф.! (perianth. piloso). Тамъ-же, лѣсъ. 25. VII. 00. Өом.!! (perianth. piloso). Боржомъ. VIII. 76. Радде! (perianth. piloso).

Тамъ-же. VII. 1880. Смирновъ! (perianth. piloso). На опушкѣ лѣса по рѣкѣ Недзвуркѣ близъ Боржома. 20. VII. 01. Мищенко! (perianth. glabro). Боржомъ. 2700'. 8. VII. 87. Акинф.! (perianth. glabro). Тамъ-же. 3200'. 28. VII. Акинф.! (perianth. piloso). Ликани близъ Боржома. 28. VII. 87. Акинф.! (perianth. glabro). Субальп. луга г. Цхра-цхара. 6500'. 12. VII. 88. Акинф.! (perianth. glabro). Опушка лѣса у горы Шукна-мта. 20. VI. 01. Мищенко! (perianth. piloso). Квсихети. Байернъ! (perianth. piloso). Закавказье, субальп. полоса. 31. VII. 94. Романовскій! (perianth. piloso). — Кавказъ. Мусинъ-Пушкинъ! (с. fruct., capsula pilosa). Нордманнъ! (perianth. glabro).

Ar. Geogr. Caucasus, Asia minor!

Примѣч. Въ лѣсномъ регионѣ цвѣтъ вѣничка чаще всего бываетъ бѣлый, въ субальпійскомъ же регионѣ вѣничикъ почти всегда окрашенъ въ блѣдно-голубой цвѣтъ.

* 49. **C. pontica** Alb. glaberrima, e radice repente caulibus crassis vel crassiusculis propter folia decurrentia lineatis, foliis radicalibus *ovato-oblongis* in petiolum eis aequilongum vel sublongiorem anguste alatum *abrupte attenuatis* margine crispulis crenatis, crenis glanduligeris et praeterea setis parvis rigidis subspinulosis hamatis obsitis, caulinis inferioribus oblongis breviter petiolatis superioribus oblongo-lanceolatis *sessilibus amplexicaulibus*, racemo laxo pedunculis axillaribus elongatis bracteolatis, bracteolis lineari-lanceolatis margine denticulatis, calycis laciniis a *basi ovata lanceolatis* acuminatis margine *hamato-denticulatis* denticulis glanduligeris corolla *late* campanulata intense coerulea ad tertiam partem lobata duplo brevioribus, tubo calyceino breviter obconico *papillis* et *tuberculis spongiosis albis obsito*, stylo usque ad medium fisso. 24. v. s. in h. P. Tm.

Albrow, Camp. nov. Cauc., in Bull. de l'Herb. Boiss. t. II. (1894) p. 116; Prodr. Fl. Colch. p. 162. — Липск. Фл. К. стр. 379. — Somm. et Lev. in A. H. P. XVI. p. 326. — Radde, Mus. Cauc. II. p. 122.

Hab. in Transcaucasia occidentali. — S. P. Имеретія, Мури. VI. 77.

Соммье и Левье. (п. v.). Батумская обл., Борчхо. 10—13. V. 93. Радде и Кёнигъ! Батумск. обл., дорога изъ Хода въ Гурджанъ (Тонъ-юль), у родника Кегеранъ-су. 20. VIII. 85. Масальскій! (с. flor.). Близъ Артвина. 1882. Петерсонъ! (in herb. Trautvetteri). У Лазистана. Каневскій!

Примѣч. Отъ близкаго вида *C. phytidocalyx* Boiss. отличается формой низовыхъ и стеблевыхъ листьевъ, болѣе широкими зубчатыми чашелистиками и болѣе толстыми стеблями.

50. **C. persicifolia** L. glabra rarius breviter pubescens, radice repente, caule elato gracili erecto substriato racemose paucifloro rarius unifloro, foliis firmis generaliter lucidis minute et remote crenulato-denticulatis radicalibus *anguste spathulato-oblongis* in petiolum longum attenuatis, caulinis inferioribus *oblongis* vel *lanceolatis* subsessilibus, superioribus *linearilanceolatis* vel *linearibus* acuminatis sessilibus strictis, calycis laciniis *lanceolatis* acuminatis tubo obovato glabro vel pellucido-piloso triplo longioribus, corolla *late campanulata* pallide *coerulea* ad *quartam partem* lobata calyce duplo longiore, stylo longitudine corollae ad medium 3-fido, capsula erecta ovoidea. 24. v. v. et s. in h. P.

L. Sp. 164. — A. D. C. Monogr. Camp. p. 322. — D. C. Prodr. VII. p. 479. — Stev. in Bull. de Mosc. 1856. p. 416. — G. v. d. St. Reise I. p. 190. — Ledeb. II. p. 885. — Norman. Florul. Stavropol.

Открыта подписка на 1906 годъ

на

ТРУДЫ БОТАНИЧЕСКАГО САДА

ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевского Университета

подъ редакціей Директора Сада Проф. Н. И. Кузнецова

выходить отдѣльными выпусками (4 выпуска въ годъ) по мѣрѣ накопленія матеріала. Стоимость каждаго выпуска опредѣляется особо.

Главная задача изданія — способствовать изученію Флоры Россіи.

Программа изданія:

1) Оригинальныя статьи, касающіяся гл. обр. флоры и ботанической географіи Россіи и сопредѣльныхъ странъ. 2) Примѣчанія къ издаваемымъ Бот. Садамъ Юр. Унив. каталогамъ сухихъ обмѣнныхъ растений. 3) Замѣтки читателей. 4) Рефераты работъ, касающихся гл. обр. флоры и ботанической географіи Россіи и сопредѣльныхъ странъ, а также вообще ботаническихъ работъ русскихъ ученыхъ. 5) Личныя извѣстія. 6) Ботаническія учрежденія и общества. 7) Гербаріи и обмѣнныя учрежденія. 8) Ботаническія путешествія. 9) Библиографія. 10) Публикаціи.

Лица и учрежденія, желающія получать постоянно „Труды“, по мѣрѣ выхода ихъ въ свѣтъ, благоволятъ обращаться къ Дирекціи Ботаническаго Сада Юрьевского Университета, высылая при этомъ ежегодно 3 руб. (Стоимость каждаго тома изданія, по подпискѣ, черезъ Ботаническій Садъ Юрьевского Университета). Для гг. студентовъ выше-учебныхъ заведеній цѣна 2 р. (по подпискѣ, черезъ Ботаническій Садъ Юрьевского Универ.). Стоимость каждаго тома (кроме 1-го) по окончаніи года, равно какъ стоимость подписки черезъ книжные магазины, равна 3 р. 50 к. Стоимость 1-го тома равна нынѣ 3 рублямъ (безъ 1-го выпуска, первый вып. весь разошелся). Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ М. Эггерса и Ко (С.-Петербургъ, Мойка, 42), К. Л. Риккера (С.-Петербургъ, Невскій пр. 14), И. Андерсона, бывш. Э. Ю. Карова (Юрьевъ, Лифл.), І. Г. Крюгера (Юрьевъ, Лифл.), А. С. Суворина (Новое Время, Н. В. Петрова (Харьковъ, Рыбная ул. д. 32), R. Friedländer & Soh. (Berlin, N.W., Carlstrasse. 11), Oswald Weigel (Leipzig, Königstrasse, 1) и другіе.

Публикаціи помѣщаются или въ обмѣнъ на публикацію о „Трудахъ“, или по слѣдующей цѣнѣ: цѣлая страница 10 руб., $\frac{1}{2}$ стр. 8 руб., $\frac{1}{4}$ стр. 5 руб., $\frac{1}{8}$ стр. 3 руб., $\frac{1}{16}$ стр. 2 руб. — за одинъ разъ. При повтореніи публикаціи до 3-хъ разъ дѣлается скидка въ 25 %.

Отдѣльные оттиски изготовляются по желанію авторовъ лишь на ихъ счетъ.

Даромъ или въ обмѣнъ „Труды“ не высылаются.

Подписная цѣна въ годъ — 3 рубля,

которые высылаются переводомъ по почтѣ на имя „Дирекціи Ботаническаго Сада Императорскаго Юрьевского Университета“.

Юрьевъ. Лифл. губ.

Н. Кузнецовъ, Н. Бушъ, А. Оминъ.

Flora caucasica critica.

Матеріалы для Флоры Кавказа.

- Вып. 1-й. *Pirolaceae, Ericaceae, Primulaceae* — обработалъ Н. Кузнецовъ.
Вып. 2-й. *Primulaceae* — обработалъ Н. Кузнецовъ, *Nymphaeaceae, Ceratophyllaceae, Ranunculaceae* — обработалъ Н. Бушъ.
Вып. 3-й. *Primulaceae, Plumbaginaceae* — обработалъ Н. Кузнецовъ, *Ranunculaceae* — обработалъ Н. Бушъ.
Вып. 4-й. *Plumbaginaceae* — обработалъ Н. Кузнецовъ, *Ranunculaceae* — обработалъ Н. Бушъ.
Вып. 5-й. *Plumbaginaceae, Ebenaceae, Styracaceae, Oleaceae* — обработалъ Н. Кузнецовъ, *Ranunculaceae* — обработалъ Н. Бушъ.
Вып. 6-й. *Oleaceae, Gentianaceae* — обработалъ Н. Кузнецовъ, *Ranunculaceae, Berberidaceae* — обработалъ Н. Бушъ.
Вып. 7-й. *Gentianaceae* — обработалъ Н. Кузнецовъ, *Berberidaceae, Magnoliaceae, Lauraceae, Addenda et corrigenda* — обработалъ Н. Бушъ.
Вып. 8-й. *Gentianaceae* — обработалъ Н. Кузнецовъ, *Ranunculus: Boodenue. Index nominum et synonymorum* — обработалъ Н. Бушъ, *Cuscutaceae, Campanulaceae* — обработалъ А. Оминъ.
Вып. 9-й. *Gentianaceae* — обработалъ Н. Кузнецовъ, *Ranunculaceae* — обработалъ Н. Бушъ, *Campanulaceae* — обработалъ А. Оминъ.
Вып. 10-й. *Gentianaceae, Arosynaceae* — обработалъ Н. Кузнецовъ, *Ranunculaceae* — обработалъ Н. Бушъ.
Вып. 11-й. *Arosynaceae, Asclepiadaceae* — обработалъ Н. Кузнецовъ, *Campanulaceae* — обработалъ А. Оминъ.
Вып. 12-й. *Campanulaceae* — обработалъ А. Оминъ, *Fumicaceae* — обработалъ П. Мищенко.
Вып. 13-й. *Asclepiadaceae, Addenda et corrigenda* — обработалъ Н. Кузнецовъ, *Fumicaceae* — обработалъ П. Мищенко — находится въ печати.

Цѣна вышедшихъ и послѣдующихъ выпусковъ 50 коп. каждый безъ пересылки (по подпискѣ), съ пересылкой 65 к. каждый.

Выписывать можно черезъ Ботаническій Садъ Императорскаго Юрьевскаго Университета.

Отъ Ботаническаго Сада Императорскаго Юрьевскаго Университета.

Ввиду того, что въ настоящее время обрабатываются и приготавливаются къ печати дальнѣйшіе выпуски

„Матеріаловъ для Флоры Кавказа“,

Дирекція Ботаническаго Сада обращается съ усерднѣйшею просьбою ко всѣмъ лицамъ и учрежденіямъ, имѣющимъ

гербаріи Кавказской Флоры

о присылкѣ на имя Юрьевскаго Ботаническаго Сада для временнаго пользованія (на просмотръ и обработку) слѣдующихъ семействъ кавказскихъ растений: *Convolvulaceae, Saxifragaceae, Gramineae, Violaceae, Umbelliferae, Liliaceae, Cruciferae, Urticaceae, Typhaceae, Sparganiaceae, Najadaceae, Fumicaginaceae, Alismaceae, Butomaceae, Potamogetonaceae, Salicaceae, Hypericaceae, Cyperaceae, Crassulaceae, Frankeniaceae, Cistaceae, Coniferae, Orobanchaceae, Tamaricaceae, Solanaceae, Scrophulariaceae, Cupuliferae, Filicineae*, а также всѣхъ семействъ, уже обработанныхъ. Всѣ растенія будутъ опредѣлены или проверены ихъ опредѣленія и возвращены въ полной цѣлости съ благодарностью.

N. Kusnezow, N. Busch, A. Fomin.

Flora caucasica critica.

Fasc. 14.

Campanulaceae, Addenda et
corrigenda - A. Fomin.

Vol. 4, pt. 6.

Sig. 8-9.

Jurjew.
1906.

p. 27. — Tchihatch. Asie Min. II. p. 400. — Шмальт. II, стр. 176. — Липск. Фл. К. стр. 379.

Icon. Fl. Graec. tab. 205. — Rchb. le. Fl. Germ. tab. 252!

Exsicc. Fl. exsicc. Austr.-Hung. № 2992! — Herb. Fl. Ross. Acad. Petrop. № 884!

Hab. in pratis et ad marginem silvarum Caucasi septentrionalis; e Transcaucasia non vidi. — **St. A.** Ставрополь. Норманъ! — **S. T. - N.** Крымъ, Алушта. Стевень.

Ar. Geogr. Europa sept. et media a Scandinavia ad Rossiam mediam et Hispania sept. ad Dalmatiam, Sibiria!

Примѣч. Видъ этотъ встрѣчается на Кавказѣ крайне рѣдко. До сихъ поръ онъ былъ найденъ Норманомъ близъ Ставрополя на сѣверномъ Кавказѣ. Что касается Закавказья, то показанія авторовъ основываются только на ссылкѣ Ледебуръ (Ledeb. II. p. 885.), и никто изъ позднѣйшихъ путешественниковъ не находилъ этого вида въ указываемомъ Ледебуромъ мѣстѣ: „versus fines turcicas (Norman, pl. exs.)“. Повидимому и на сѣв. Кавказѣ *C. persicifolia* L. встрѣчается не часто; Гюльденштедтъ (sec. Ledeb. l. cit.) указываетъ ее у р. Терека. Что касается показанія Radde — Mus. Cauc. II. p. 122. „Schatoi“, то подъ этимъ видомъ въ его гербаріи, принадлежащемъ Кавказскому Музею, лежить *C. hemischinica* C. Koch.

51. C. Steveni M. B. radice repente stolonifera, caule erecto folioso *uni* — vel *corymbose pauci-floro*, foliis radicalibus oblongo-spathulatis in petiolum attenuatis, caulinis inferioribus oblongo-lanceolatis longe petiolatis, superioribus sessilibus lineari-lanceolatis vel linearibus, omnibus margine *obtusely serratis* serraturis glanduligeris, calycis laciniis lanceolato-linearibus tubo *elongato cylindrico subaequilongis* vel *aequilongis*; corolla *purpureo-violacea late* infundibuliformi fere *rotata* usque ad medium in lobos ovatos fissis laciniis calycinis duplolongiore, stylo coeruleo *ad medium* fisso, capsula elongata oblonga. 24. v. v. ets. in h. A. P. M. K. J. Th. Tm. Fenn.

M. B. Fl. taur.-cauc. III. p. 138. — A. D. C. Monogr. Camp. p. 321. — D. C. Prodr. VII. p. 479. — C. A. Meyer, Verzeichn. der Pflanz. d. Cauc. p. 85. — Eichw. Casp.-cauc. p. 26. — Hohenack. Enum. Elisabethpol. p. 221; Enum. Talysch. p. 63. — Ledeb. II. p. 886. — Boiss. III. 936. — Томак. Фл. Караб. стр. 58; Труд. Тифл. Бот. Сада, вып. I. стр. 59. — Липск. Фл. К. стр. 379. — Radde, Mus. Cauc. II. p. 122. (partim.).

Syn. *C. simplex* Stev. in Mem. de la soc. des Natural. de Moscou. III. p. 225. — Rupr. Bull. de l'Acad. de Sc. de St. Petersburg. XI. p. 197. — *C. Steveniana* R. et Sch. Syst. veg. V. p. 91.

Icon. Rchb. le. Fl. Germ. XIX. tab. 253!

Exsicc. Radde, Sawalan! — Persia. Szovits! — P. Sintenis Iter. Orient. 1894. № 5647. Arm. turc. Szandsch. Gümüşchane. Stadodopi, in pratis!

Hab. in regione subalpina et alpina Caucasi. 3500—10000'. — **S. K.** Верховья р. Кубани, Уллукамъ. 7000—8000'. 1892. Акинф.! Верховья р. Кубани, Учкуланъ, субальп. луга около 8000'. VII. 00. Десулави! Тамъ-же, сухіе склоны. 5000'. VI. 00. Десулави! Кубанск. обл. Карачай, на лугахъ. 25. V. 84. Сипягинъ! — **S. T.** Вершина Бештау. Гогенаккеръ! Тамъ-же. 1. VI. и 3. VII. 86. Акинфіевъ! Тамъ-же. 29. VI. 96. Литвиновъ! Терская обл., на холмъ Адырь-су близъ Уруебиево, около р. Баксанъ. 5500—8000'. 22. VII. 96. Алекс.! Баксанъ. 6700'. 21. VII. 96. Акинф.! Гора Эльбрусъ, у Донгузъ-орунъ. 8000'. 18. VII. 96. Алекс.! Осетія, выгоны за сел. Луаръ. 17. V. 97. Марков.! Владикавказъ. 22. VI. 87. Акинф.! Форманія кустарниковъ по каменистому склону къ аулу

Чиркей. 16.V. 89. Кзнц.! — **X. D.** Дагестанъ, сел. Рутулъ на р. Самуръ. 5180'. Лаговск.! Дагестанъ, Мухе (Muche). 1862. Байернъ! — **S. D.-K.** Дагестанъ, Даргинскій окр., на юго-востокъ отъ сел. Левашин, мѣстность Джанга, на сѣверн. склонѣ. 3800'. 30.V. 01. Алексѣенко! — **A. O.** Хевсурія, Хидатани, истоки Перикительской Алазани. Байернъ! Субальп. луга въ верховьяхъ Перикительск. Алазани. 14. VII. 03. Бушъ! Тушетія, между сел. Парема и переваломъ къ г. Комитосъ-цвери, альп. ковры. 16. VII. 03. Бушъ! Гора Дикло. 7800'. 29. VII. 61. Рупрехтъ! Тамъ-же, у ледника горы Дикло. 8800—9240'. 31. VII. 61. Рупр.! Дагестанъ, Андійскій окр. между сс. Аквари и Саситль, альп. ковры и осыпи. 3. VII. 04. Бушъ! Альпійскіе ковры перевала между Китури и Кидеро. 10. VII. 04. Бушъ! Южный Дагестанъ, въ направленіи къ р. Самуру. 10. VII. 60. Рупр.! Самурск. окр., на склонахъ горы Ернеи (Яруссувъ) у с. Фія, на скалахъ. 10000'. 18. VIII. 00. Алекс.! У истоковъ р. Самура, на холмѣ Хутунъ, между зарослями *Rhododendron caucasicum*. 8300'. 11. VII. 97. Алекс.! Нухинскій уѣздъ, Елисаветпольск. губ., подъемъ на гору Ханъ-эйлагъ, выше города Нухи. 9. VI. 99. Ө. м.!! Нухинск. у., Елисаветпольск. губ., на скалистыхъ пастбищахъ Яръ-сыртъ, у истоковъ р. Вандамъ-чай. 8700'. 23. VIII. 00. Алекс.! Бакинск. губ., Кубинск. у., на лугахъ ущелья Вугунъ-дере у сел. Хиналугъ. 9200'. 21. VIII. 00. Алекс.! Хиналугъ. М. Бибер.! Шахъ-дагъ, верш. Туфанъ-дагъ. 30—31. VII. 1830. К. А. Мейеръ! Гора Шахъ-дагъ. 1873. Беккеръ! Гора Шальбузъ-дагъ. 1874. Беккеръ! Курушъ. 1876. Беккеръ! Гора Бешбармакъ? Карелинъ! — **S. P.** Абастуманъ. VII. Смирновъ! Тамъ-же. 9. VI. 81. № 588. Бротерусъ! — **A. A.** Бывшая Турецко-Аджарск. гран. 9. VII. 74. Радде! — **X. A.** Каресская обл., ставка Мацра. 15. VI. Горанинъ! Каресская обл., Ольтинск. окр., Кырхъ-Килисса. 6. VII. 03. Кёнигъ! Агундиръ. 8. VII. 03. Кёнигъ! Сакаль-Тутанъ. 13. VII. 03. Кёнигъ! У озера Чалдыръ, близъ сел. Мередисъ, на лугахъ. 20. VI. 03. Михайловскій! У оз. Арпагель, на лугахъ и скалахъ. 22. VI. 03. Михайловскій! Гора Сурбъ-хачъ. 8000'. 1885. Масальскій! Окрестности Сарыкамыша. 1885. Медвѣдевъ! Саганлугъ, гора Ага-юртъ. 2. VIII. 85. Масальскій! Гора Куртлю близъ Кагызмана. 7000'. 3. VI. 04. Михайловскій! Окрестности оз. Гокчи, Дарачигагъ, гора Алибекъ, альп. луга. 31. VII. Теръ-Казаровъ! Тамъ-же. 7. VII. 00. Кзнц.! Близъ перевала у Семеновки и отъ Семеновки до оз. Гокчи, луга. 4. VII. 00. Кзнц.! Тамъ-же. 7. VII. 94. Б. Федч.! 5. VII. 00. Ө. м.!! Ахты. 29. V. 75. Радде! Алагезъ, Кара-дагъ. 16. VIII. Хоцятовск.! Башабаранъ, сѣнокосъ. 3. VIII. Хоцятовъ! Тамъ-же, ущелье Кабахлу. 10. VIII. Хоцятовск.! Монастырь Кипчагъ на Алагезѣ. VI. 75. Радде! (*calycis laciniis basi denticulatis*). Арменія, Чабанъ-гель. 8000'. 5. VII. 72. Оверинъ! (*calycis laciniis basi denticulatis*). Арменія, горы Нахичеванскаго уѣзда, Эриванск. губ. 28. V. Шовницъ! Большой Араратъ. 19. V. 00. Ө. м.!! Тамъ-же, выше 9000'. 18. VIII. 03. Гриневецкій! — **S. Ib.** Иберія. М. Биб.! — **S. S.-K.** Коджоры, Керъ-оглы. 14. V. 72. Ситовскій! Тамъ-же. 1878. Смирновъ! 11. VII. 67. Оверинъ! Манглиск., Тифлисск. губ., верхняя часть восточн. склона Желтой горы. 14. VII. **Herb. Jurjew.!** Карталиния, гора на сѣв. отъ Манглиса. VI. 00. **Herb. Jurjew.!** Озеро Табисцхури. VI. 75. Радде! Тамъ-же. 10. VII. 88. Акинф.! Гора Цхра-Цхаро. 7000'. 13. VII. 03. Акинф.! Тамъ-же. 25. VII. 00. Ө. м.!!

Бакуръяни. 6000'. 5. VII. 87. Акинф.! Тамъ-же. 15. VII. 88. Акинф.! (с. fruct.). 5. VII. 01. Мищенко! Близъ Боржома. 10. VII. 88. Акинф.! Мамутлы. Байернъ! Нижняя Карталиня. Александропольск. у., Эрив. губ. 15. V. 00. Өм.! Гора Саріаль въ Елисаветпольск. губ. Гогенаккеръ! Карабахъ, Шушинск. у., уроч. Сары-баба. 7500'. Медв.! Лысогорекъ. VII. 87. Камсараканъ! Тамъ-же, настбиша. 3. VI. 95. Ломак.! Гора Большой Кирсъ. 8000'. V. Камсар.! Гора Кечаль-дагъ. 10000'. 27. VI. 95. Ломак.! На альп. лугахъ хребта у сел. Лишкъ. 25. VI. 03. Гриневецкій! На альп. лугахъ между сел. Лишкъ и Гедженанъ. 4. VIII. 03. Гриневецкій! Капуджихъ. 15. VI. 71. Радде! На альп. лугахъ горы Капуджихъ, около 7000'. 28. VI. 03. Гринев.! На альп. лугахъ у хребта между сел. Нусъ-Нусъ и Бузакъяръ, около 9000'. 21. VI. 03. Гринев.! Закавказье, Башъ-Кягъля. 6. VI. 56. Оверинъ! Катериненфельдъ. V. 1844. Коленати! — **S. L.** Талышъ, нагорная степь выше Тули. 6000'. 18. VI. 94. Ломак.! Гора Кызь-юрды. 8000'. 20. VI. 94. Ломак.! — Кавказъ. Вильгельмсъ!

Arg. Geogr. Caucasus, Asia minor!, Persia!. In Sibiria et Rossia Europea var. *sibirica* m. crescit.

Примѣч. За исключеніемъ западнаго Закавказья *C. Steveni* M. B. распространена по всему Кавказу; она селится на сухихъ горныхъ лугахъ или задерненныхъ скалахъ и, повидимому, принадлежитъ къ горно-степной растительности. Это послѣднее обстоятельство и служить вѣроятной причиной ея отсутствія въ горахъ западнаго Закавказья. Видъ этотъ очень характеренъ по формѣ своего почти колесовиднаго вѣчника, разрѣзы котораго доходятъ до $\frac{1}{2}$ его, а также по цилиндрическо-конической формѣ трубки чашечки, длина которой равняется чашелистикамъ. Цвѣтъ вѣчника пурпурово-лиловый, голубой столбикъ до $\frac{1}{2}$ раздѣленъ на три рыльца. Всѣ экземпляры съ Кавказа имѣютъ трубку чашечки сильно удлинненную и узкую, между тѣмъ какъ всѣ экземпляры изъ Сибири и Европ. Россіи имѣютъ трубку чашечки укороченную и болѣе широкую, приближающуюся по формѣ къ конической. Послѣ цвѣтенія капсула у кавказскихъ, равно какъ у сибирскихъ и русскихъ, экземпляровъ сильно увеличивается и удлиняется, поэтому разница въ формѣ трубки чашечки характерна лишь въ періодъ цвѣтенія. Въ виду этого различія форму изъ Сибири и Европ. Россіи я выдѣляю въ особую разновидность var. *sibirica* m.

52. **C. patula** L. glabra vel parce hirsutiuscula, radice tenui fibrosa, caule *debili flexuoso ramoso*, foliis radicalibus lanceolato-spathulatis in petiolum attenuatis, caulinis lanceolatis sessilibus, summis lineari-lanceolatis omnibus margine crenatis, floribus mediocribus *longe pedicellatis* in paniculam *distantem* dispositis, calycis laciniis lanceolato-linearibus basi parce denticulatis tubo calyceino 3—4-plo *longioribus*, fructiferis accretis, corolla *pallide purpureo-violacea venosa* venis intensius coloratis in lobos oblongos ad *tertiam partem* fissa *fauce pallide colorata*, stylo ad *sextam partem* fisso, capsula conica. 2. v. v. et s. in herbariis Rossiae et Europae.

L. Sp. 232. — A. D. C. Monogr. Camp. p. 329. — D. C. Prodr. VII. p. 480. — G. u. d. s. t. Reise. I. p. 190. — L. e. d. e. b. II. p. 886. — Шмалъг. II. стр. 176. — Липск. Фл. К. стр. 380.

Syn. *C. decurrens* G. u. d. s. t. Reise. I. p. 108.

Icon. R. e. h. b. Ic. Fl. Germ. tab. 253!

Exsicc. Fl. exsicc. Austro-Hungar. № 2994! — Herb. Fl. Ingr. Cent. III. № 390!

Hab. in pratis silvaticis Caucasi septentrionalis. — **S. T.** У р. Терекъ. Гюльденштедтъ (sec. Ledeb. l. cit.).

Ar. Geogr. Europa septentrionalis et media ad Hispaniam et Italiam!, Bulgaria, Sibiria occidentalis.

Примѣч. Ни одного экземпляра этого вида съ Кавказа я не видѣлъ. Все, что Траутфеттеръ въ своемъ гербаріи съ Кавказа обозначалъ *C. patula* var. *typica* Trautv., есть уродливая форма (обвѣденная скотомъ) *C. hemschinica* C. Koch, у которой развилось много боковыхъ длинныхъ и тонкихъ вѣточекъ, заканчивающихся цвѣтками и образовавшихъ такимъ образомъ широкую метелку на подобіе соцвѣтія настоящей *C. patula* L. Такія уродливыя формы по той-же самой причинѣ встрѣчаются и у другихъ видовъ *Campanula*, какъ напр. у *C. imeretina* Rupr. (см. Труд. Тифл. Бот. Сада вып. VI. кн. 2. стр. 9.). На Кавказѣ *C. patula* L. указывается Гюльденштедтомъ въ Терекской области, позднѣйшіе ботаники этого вида не находили, и такимъ образомъ все, приводимое позднѣйшими авторами съ Кавказа подъ видомъ *C. patula* L., есть *C. hemschinica* C. Koch, въ чемъ я убѣдился, изучая гербарный матеріалъ съ Кавказа. Утверждать полнѣйшее отсутствіе *C. patula* L. на Кавказѣ я не рѣшаюсь, такъ какъ видъ этотъ встрѣчается на югѣ Россіи, напр. въ обл. Войска Донск., откуда легко можетъ быть занесенъ на сѣв. Кавказъ.

C. patula L. образуетъ широкую раскидистую метелку, что служить хорошимъ отличительнымъ признакомъ, чашелистики узко-ланцетно-шиловидные, при цвѣтеніи и послѣ цвѣтенія *оттопыренные*, у основанія имѣютъ удаленные зубчики. Цвѣты на длинныхъ цвѣтоножкахъ; вѣнички *свѣтло-фиолетовый* съ *прямыми желтками*, которые окрашены болѣе интенсивно и на живомъ вѣничкѣ образуютъ какъ бы прямые штрихи; зѣвъ вѣничка окрашенъ очень слабо и въ живомъ состояніи образуетъ бѣловатый глазокъ, какъ напр. у *C. propinqua* Fisch. et Mey.

53. *C. hemschinica* C. Koch radice brevi fillosa obliqua vel verticali, caulibus 1—3 crassiusculis foliorum decurrentia acute angulatis strictis superne vel ad medio *conferte paniculatis* vel *subcorymbosis*, foliis inferioribus obovato-oblongis vel oblongis in petiolum brevem attenuatis, caulinis oblongo-lanceolatis sessilibus *strictis* basi semiamplexicaulibus acutiusculis, omnibus margine obtuse crenatis, floribus *paucis approximatis* terminalibus breviter et *stricte pedunculatis*, calycis laciniis *anguste lanceolatis erectis* corolla intense *coerulea anguste obconico-infundibuliformi* in lobos oblongos acutos ad $\frac{1}{3}$ fissa 3—4-plo brevioribus, tubo calycino obconico interdum papillis spongiosis parce obsito, capsula obconica laciniis erectis aequilongis superata, seminibus parvis turgidis nitidis ovato-oblongis. ☉ — 2? v. s. in h. P. J. Tm. Th.

C. Koch, Linnaea. XXIII, p. 644. (1850). — Boiss. III. p. 940. — Липск. Фл. К. стр. 380.

Syn. *C. patula* var. *confertiflora* Trautv. in A. H. P. IV. 1. p. 165; VI. p. 88. — *C. Rapunculus* Somm. & Lev. in A. H. P. XVI. p. 327 (an partim?). — *C. persicifolia* Radde, Mus. Cauc. II. p. 122.

Exsicc. Sintenis. Iter Orient. 1894. № 7081! — Szovits. Persia bor.!

Hab. in regione silvatica et subalpina Caucasi. — S. T. Шатоу? 20. VII. 94. Радде и Кёнигъ! — S. P. Постъ Хинзартъ, Артв. окр., Батумск. обл. 8. VII. 04. Михайловскій! Абастуманъ. 1872. Оверинъ! VII. 85. Смирновъ! — A. A. Гурія, хреб. Сакорне. 28. VII. 88. Медвѣдевъ! Тамъ-же. 12. VIII. Медв. VII. 87. Медв.! Гурія, Нодманъ! Бывш. Турецко-Аджарск. граница, Ахалцыхск. у. 9. VII. 74. Радде! Аджарія, по скаламъ. VII. 1885. Масальскій! Аджарія, между Хула и Данансъ-Параулъ, горн. лѣса. 22. VI. 90. Сомм. и Лев.! (№ 887. in A. H. P. XVI. pro *C. Rapunculus* L.). — X. A. Ахалцыхск. уѣздъ, гора Шамбобель. 9. VII. 65. Радде! — S. S.-K. Бакуръяни. 6000'. 17. VII. 03. Акинф.!

Ar. Geogr. Persia borealis, Asia minor!

Примѣч. Видъ этотъ отличается отъ *C. patula* L. болѣе крупнымъ и стуженнымъ трубчато-воронковиднымъ вѣйчикомъ, цвѣтъ котораго *сѣйи*, болѣе широкими узко-линейными чашелистниками, формой соцвѣтія, представляющей узкую *сближенную метелку* или *сближенный щитокъ*. У *C. patula* L. вѣйчикъ короче и шире, чѣмъ у *C. hemschinica* C. Koch и чашелистики *линейно-шпоровидные* въ 3—4 раза короче вѣйчика, а соцвѣтіе — раскидистая метелка. Слѣдуетъ замѣтить, что экземпляры *C. hemschinica* изъ затѣненныхъ мѣстъ, обильные вначалѣ скогомъ, развиваютъ впоследствии тонкія длинныя вѣточки, заканчивающіяся цвѣтами, вслѣдствіе чего характеръ соцвѣтія сильно мѣняется. Таковы напр. экзempl. № 588 (Herb. Ledeb.) изъ Абастумана, собранный Смирновымъ, а также экземпляры № 207 (Herb. Ledeb.), собранные Радде 9 VII. 74. на бывшей Турецко-Аджарской границѣ, съ того-же самаго мѣста, гдѣ были собраны и нормальные экземпляры. Траутфеттеръ ошибочно отнесъ ихъ къ *C. patula*, обозначивъ ихъ въ своемъ гербаріи *C. patula* L. var. *typica* Trautv.

Въ гербаріи Кавказскаго Музея имѣется одинъ экземпляръ *C. hemschinica* изъ Шатой, который лежитъ тамъ подъ видомъ *C. persicifolia*, а въ Гербаріи Имп. Ботан. Сада имѣется экземпляръ Соммье и Левье, собранный ими между Хула и Данапъ-Параулъ и неправильно опредѣленный ими какъ *C. Rapuncululus* L. Такъ какъ *C. hemschinica* C. Koch распространена въ юго-западномъ Закавказьѣ, граничащемъ съ Малой Азіей, то нахождение ея въ Терской области (Шатой — Радде и Кёнигъ) возбуждаетъ сильное сомнѣніе. Вѣрнѣе всего, что и этотъ экземпляръ происходитъ изъ Аджаріи, а въ гербаріи произошла путаница въ этикеткахъ.

Gen. 2. Symphyandra A. DC.

Calyx quinquefidus. Corolla alba, albida vel caeruleo-violacea campanulata vel tubuloso-campanulata quinqueloba. Stamina a corolla libera, filamentis basi dilatatis liberis, *antheris in tubum longum commatis*. Stylus pilosus, stigmata tria. Capsula trilocularis poris lateralibus basiliaribus dehiscens. — Plantae perennes facie *Campanulae*. Folia lata saepius cordata, dentata interdum oblonga basi attenuata, radicalia saepius longe pedunculata, caulina alterna pauca vel parva. Flores saepius nutantes, majusculi, racemosi vel laxe paniculati.

A. D C. Monogr. Camp. p. 365. — D C. Prodr. VII. p. 494. — Endl. Gen. p. 518. — Benth. et Hook. II. 2. p. 563. — Ledeb. II. p. 896. — Boiss. III. p. 888. — Rupr. Bull. de l'Acad. d. Sc. de St. Petersb. XI. p. 221. — Trautv. in A. H. P. VI. p. 94. — Schönl. and, in Engl.-Prnt. IV. 5. p. 51. — Syn. *Campanulae spec.* M. B. Fl. taur.-cauc. I. p. 154; II. p. 144—145.

Species 10 regionis mediterraneae et montium Caucasi incolae.

1. Выемки чашечки безъ придатковъ, чашелистики короткіе широкіе звѣздчато-распростертыя, вѣйчикъ бѣловатый.

S. lazica Boiss. et Bal. (1).

2. Выемки чашечки снабжены придатками 2.
2. Цвѣтъ вѣйчика бѣлый, или пѣжелта-бѣлый, или голубовато-бѣлый 3.
2. Цвѣтъ вѣйчика сине-лиловый 4.
3. Вѣйчикъ большой колокольчатый, доли чашечки широко-ланцетныя въ 2—2½ раза короче вѣйчика. Прикорневые листья довольно крупныя, крупно-городчато-зубчатыя.

S. pendula A. DC. (2).

- Вѣйчикъ средней величины или небольшой трубчато-колокольчатый, доли чашечки широко-треугольныя острыя, оттопыренныя, въ 4 раза короче вѣйчика. Прикорн. листья небольшіе над-рѣзно-широко-зубчатыя *S. armena* A. DC. (4).

4. Выпичик широко-колокольчатый, почти колесовидный, раздѣленъ до середины или ниже середины на продолговатыя или ланцетныя доли 5.
- Выпичик трубчато-колокольчатый съ короткими долями, широко-ланцетныя доли чашечки равно какъ и крупныя овальныя или продолговато-овальныя и острые листья усажены по краю жесткими бѣлыми рѣсницами *S. ossetica* A. D. C. (3).
5. Прикорн. листья съ длинными черешками въ очертаніи 5-угольныя, у основанія съ сердцевидной выемкой, глубоко-разсѣченныя съ ромбическими или продолговатыми сегментами (гераневидныя), стеблевые постепенно уменьшающіеся.

S. zangezura Lipsky (5).

Прикорн. листья небольшіе, продолговатыя или продолговато-ланцетныя, постепенно суженныя въ очень короткій черешокъ, по краю городчато-зубчатые, стеблевые почти сидячіе, такой-же формы *S. lezgina* Alexeenko (6).

Примѣч. Родъ *Symphyanandra* раздѣляется Alph. De Candolle'емъ на двѣ секціи: 1) *Anotocalyx* A. D. C. и 2) *Otocalyx* A. D. C. Первая секція характеризуется отсутствіемъ придатковъ у чашечки. Къ ней принадлежатъ 5 видовъ: *S. cretica* A. D. C., встрѣчающаяся на островѣ Критѣ, *S. sporadum* Hal., найденная на островѣ Юръ (Гіаросъ) въ Эгейскомъ морѣ, *S. Wanneri* Neuff. и *S. Hofmanni* Pant., встрѣчающіяся на Балканскомъ полуостровѣ, и наконецъ *S. lazica* Boiss. et Bal., которая найдена пока только въ Турецкомъ Лазистанѣ.

Вторая секція характеризуется присутствіемъ у чашечки придатковъ; въ эту секцію входятъ также 5 видовъ, населяющихъ исключительно Кавказскій край. Въ своемъ географическомъ распространеніи виды эти распределяются слѣдующимъ образомъ: *S. pendula* A. D. C. встрѣчается въ центральномъ Кавказѣ и Дагестанѣ, а var. *transcaucasica* Som m. & Lev. населяетъ западное Закавказье; *S. ossetica* A. D. C. распространена исключительно въ центральномъ Кавказѣ, остальные три вида встрѣчаются въ восточномъ и южномъ Закавказьѣ: *S. lezgina* Alexeenko населяетъ южныя отроги горъ Главнаго хребта въ восточномъ Закавказьѣ, *S. armena* A. D. C. населяетъ Арменію и Карабахъ (Траутфеттеръ приводитъ ее со словъ Карелина для сѣв. Туркестана?) и *S. zangezura* Lipsky найдена только въ южномъ Карабахѣ на границѣ съ Арменіей.

Въ третичную эпоху родъ *Symphyanandra* былъ, очевидно, широко распространенъ, какъ въ юго-восточной части Средиземноморской области, такъ равно и въ Малой Азіи, и на Кавказѣ. *S. cretica* A. D. C., *S. sporadum* Hal., а также и *S. lazica* Boiss. являются наиболѣе древними типами, сохранившимися со временъ третичной эпохи. Это согласуется вполне и съ геологическими показаніями, такъ какъ извѣстно, что въ третичную эпоху Эгейское море представляло собою материкъ, соединявшій Балканскій полуостровъ съ Малой Азіей. Въ эту эпоху обмѣтъ видами между Малой Азіей, Кавказомъ и восточной частью Средиземноморской области могъ происходить безпрепятственно. Съ конца третичной эпохи, а также и въ продолженіе ледниковыхъ періодовъ происходило обособленіе мѣстностей вслѣдствіе ледниковаго и морского покрововъ. Эти весьма важныя событія, безъ сомнѣнія, должны были вызвать измѣненіе экологическихъ условий, что въ связи съ другими факторами, дѣйствующими непрестанно и въ наше время, привело къ образованію новыхъ формъ, изъ которыхъ развились потомъ и новыя виды.

Кавказъ, судя по распредѣленію нынѣ населяющихъ его видовъ рода *Symphyanandra* и филогенетическому родству ихъ, очевидно, имѣлъ нѣсколько центровъ развитія формъ этого рода. Однимъ изъ такихъ центровъ возникновенія была прибрежная полоса у Чернаго Моря въ западномъ Закавказьѣ, гдѣ теперь распространена *S. pendula* A. D. C. var. *transcaucasica* Som m. & Lev. Благодаря устойчивости ея признаковъ именно эту форму приходится считать за типъ. Распространеніе этого вида въ центральномъ Кавказѣ и вдоль Главнаго хребта на востокъ

произошло, повидимому, въ промежутокъ одного изъ ледниковыхъ періодовъ, а можетъ быть и позже, такъ какъ формы изъ центральнаго Кавказа и восточнаго неустойчивы въ своихъ признакахъ. Формы, населяющія центральный Кавказъ, являются промежуточными между var. *transcaucasica* и формами изъ восточной части Главнаго хребта. Одинъ изъ центровъ возникновенія формъ существовать, вѣроятно, въ восточномъ Закавказьѣ, гдѣ въ широкихъ и глубокихъ ущельяхъ южнаго склона Главнаго хребта живетъ форма — *S. lezgina* Alex., не имѣющая никакого родства ни съ другими формами, населяющими теперь Кавказъ, ни съ формами Балканскаго полуострова. Всѣ упомянутыя формы являются представителями только лѣсной зоны.

Географическое распредѣленіе формъ, обитающихъ южное Закавказье, показываетъ, что и здѣсь развитіе формъ было островное. Развивавшіяся формы, повидимому, группировались вокругъ горъ южной Арменіи и южнаго Карабаха. Населяющіе эту область два вида — *S. armena* A. D. C. и *S. zangezura* Lipsky являются растениями скорѣе горно-степными, чѣмъ альпійскими. Формы *S. armena* на востокъ несутъ особый отпечатокъ

Sect. I. Anotocalyx Alph. D C.

Calycis sinubus nudis.

A. D C. Monogr. Camp. p. 366. — D C. Prodr. VII. p. 494. — Benth. et Hook. Gen. plant. vol. II., pars 2. p. 563.
Syn. *Melanocalyx* Endl. Gen. p. 518.

1. *S. lazica* Boiss. et Bal. pubescens, caulibus e rhizomate incrassato ramoso elongatis gracilibus pendulis apice laxissime paniculatis paucifloris, foliis cordatis ovatis vel oblongis argute subduplicatum serratis radicalibus longe superioribus brevius petiolatis, pedunculis longissimis bracteis 1—2 ellipticis dentatis obsitis, calycis breviter puberuli laciniis patentibus late triangulari-oblongis acuminatis elevatim reticulatis integris, corolla puberula tubuloso-campanulata calycis laciniis quarta parte longiore. 4. n. v.

Boiss. III. p. 888.

Hab. ad parietes rupium, speluncas Ponti Lazici infra Khabackhar 4800'. Fl. Aug. Bal.

Примѣч. На Кавказѣ до сихъ поръ еще не найденъ, но возможно, что видъ этотъ и произрастаетъ въ предѣлахъ Русскаго Лазистана.

Sect. II. Otocalyx Alph. D C.

Calycis sinubus reflexo-appendiculatis.

A. D C. Monogr. Camp. p. 366. — D C. Prodr. VII. p. 494. — Benth. et Hook. Gen. plant. vol. II., pars 2. p. 563.
Syn. *Sericodon* Endl. Gen. p. 518.

* 2. *S. pendula* A. D C. pilosula, caulibus e rhizomate carnoso plurimis pendulis foliosis et a basi stricte thyrsoides-paniculatis ramulis brevibus paucifloris foliosis, foliis *grosse crenato-dentatis* inferioribus ovatis cordatis longiuscule petiolatis, intermediis oblongis acutis cuneatis breviter petiolatis, rameis anguste elliptico-lanceolatis acuminatis, calycis *canescenti-tomentelli* laciniis late lanceolatis acuminatis margine integris vel interdum remote denticulatis tubo obconico multoties longioribus, appendicibus lanceolatis valde acuminatis tubo subbrevioribus, corolla *campanulata tomentella albid*a sicca *ochroleuca* breviter lobata ore barbata calyce duplo — $2\frac{1}{2}$ -plo longiore. 4. v. s. in h. A. P. M. Tm. Th.

A. D C. Monogr. Camp. p. 366. — D C. Prodr. VII. p. 494. — C. A. Meyer, Verzeichn. d. Pflanz. des Cauc. p. 85. — Ledeb. II. p. 896. — Boiss. III. p. 889. — Rupr. Bull. de l'Acad. d. Sc. de St. Petersb. XI. p. 221. — Trautv. in A. H. P. VI. p. 94. — Липск. Фл. К. стр. 376. — Somm. & Lev. in A. H. P. XVI. p. 313. — Radde, Mus. Cauc. II. p. 121.

Syn. *Campanula pendula* M. B. Fl. taur.-cauc. I. p. 154; III. p. 144. — Шмальг. II. стр. 179.

Icon. Sweet, Flow. Gard. Ser. II, tab. 66. (sec. Boiss. l. cit.).

Exsicc. Akinf. Herb. Fl. Rossic. № 467!

Hab. in fissuris rupium verticalium regionis montanae Caucasi magni.

— **S. K.** Кубанская область, между Псебаемъ и Умпыремъ, на известковыхъ скалахъ. 26. VII. 93. Радде Кёнигъ! — **S. T.** Пятигорекъ. Herb. H. Petrop! Тамъ-же. Байернъ! Тамъ-же. Рупрехтъ (п. v.). Нарзанъ. М. Виб! Стевень! Гёффтъ! Гогенаккерт! У Константиногорскихъ теплыхъ водъ. 1825. Зыковъ! (in herb. M. Bieb. Acad. Imper.). Тамъ-же нѣ окрестности Нарзана. К. А. Мейеръ (п. v.). Тамъ-же. Рупрехтъ (п. v.). Кисловодскъ 1840. Сергачевъ! Тамъ-же. 11. VIII. 67. Оверинъ! 24. VIII. 66. Байернъ! VII. 82. и VII. 84. Акинф! Тамъ-же, скалы. 7. VI. 96. Литвиновъ! Окрестности Кисловодска, на скалахъ. 19. VII. 01. Шираевскій! Тамъ-же, по Кабардинкѣ. 1. VIII. 82. и 1. VIII. 92. Акинф! Тѣнистыя мѣста на известковыхъ скалахъ близъ Кисловодска. VIII. 98. Акинф! Тамъ-же. 6. VIII. 96. Медвѣдевъ! Кара-су. 25. VII. 92. Акинф! Терская обл., по р. Баксану, на известковыхъ скалахъ. 3000'. 15. VII. 96. Алекс! Тамъ-же. 4000'. 25. VII. 96. Акинф! Близъ Алагира. 1980'. 4. IX. 61. Рупрехтъ! (in herb. Mus. Caucasic). Балта? 15. VI. Оверинъ! Чечня, Евдокимовское, известковыя скалы. 11. VII. 94. Радде и Кёнигъ! — **X. D.** Аварскій окр., близъ Гимры на скалахъ. 26. V. 01. Алексѣенко! (folia et caules vetusti). Аварскій окр., между станціями Харахи и Тлохъ. 2. VIII. 04. Бушъ! Ниже Гуниба. 1320—5160'. Рупрехтъ (п. v.). — **A. O.** Дагестанъ, Андійскій окр., между Саситлемъ и р. Андійскимъ Койсу, Саситльское ущелье. 4. VII. 04. Бушъ! Андійскій окр. между сс. Эчеда и Сумада. 22. VII. 04. Бушъ! Между Тинды и Акнада. Рупрехтъ (п. v.). Кушн! Рупрехтъ (п. v.). — **S. D.-K.** Дагестанъ. Гергебиль. Байернъ! Тамъ-же. Рупрехтъ (п. v.). Даргинскій окр. близъ сел. Бокни, въ ущельѣ р. Уллу-чай, на скалахъ и каменистыхъ осыпяхъ. 3800'. 21. VII. 98. Алекс! — Кавказъ. Асламбегъ. Лойка (sec. Somm. & Lev. l. cit., п. v.).

Примѣч. Всѣ экземпляры изъ Дагестана имѣютъ листья болѣе жесткіе по краю съ болѣе острыми и частыми зубцами, стебли короткіе, цвѣты крупныя, чашелистики съ ясными зубчиками и короче вѣнчика въ 3 раза. У экземпляровъ изъ центральнаго Кавказа чашелистики длиннѣе и только въ $1\frac{1}{2}$ —2 раза короче вѣнчика, зубчики по краю чашелистиковъ иногда бываютъ неясныя и болѣе удалены другъ отъ друга. Листья отличаются также болѣе нѣжной консистенціей. Различіе это, мнѣ кажется, вызывается тѣмъ, что въ центральномъ Кавказѣ видъ этого растенія въ болѣе влажной атмосферѣ и селится въ тѣнистыхъ мѣстахъ, тогда какъ въ Дагестанѣ при болѣе сухомъ климатѣ и на горно-степныхъ пространствахъ растеніе принуждено жить часто на очень сухихъ мѣстахъ и притомъ на солнечномъ припекѣ. Выдѣлять эти формы изъ Дагестана въ особую разновидность невозможно, такъ какъ и въ центральномъ Кавказѣ хотя и рѣдко встрѣчается форма, приближающаяся къ дагестанской. Въ гербаріи Я. С. Медвѣдева имѣется экземпляръ *S. pendula* A. D C. изъ Кисловодска съ сильно укороченными стеблями, съ жесткими листьями по

краю, съ такими же острыми зубцами, какъ и у дагестанскихъ экземпляровъ, и все растеніе не превышаетъ 3 вершковъ.

* **var. transcaucasica** Som m. & Lev. *cinerascens* omnis *molliter pilosa*, basi longe et diffuse, superne breviter ramosa *multi- et densiflora*; caulibus e radice crassa squamis dense vestita *elatis crassiusculis*, foliis radicalibus ovato-oblongis vel ovato-lanceolatis profunde cordatis sinu saepe clauso, caulinis late ovatis acutis. 2. v. s. in h. P. J.

Som m. & Lev. in A. H. P. XVI. p. 313. — Lipsky, Fl. Caucasi supplementum I. p. 68.

Hab. in fissuris rupium verticalium Transcausasiae occidentalis. —

S. P. На вертикальныхъ известковыхъ скалахъ въ долину р. Кодора, въ мѣстности Кваначкиръ. 27. VI. 02. Вороновъ! Абхазія, долина р. Кодора, на известковыхъ скалахъ близъ Багдада. 3. VI. 01. Вороновъ! Военно-Сухумск. дорога, Цебельда, на известковыхъ скалахъ. VII. 96. Десулави! Имеретія, вдоль р. Ріона, между Меквена и Альпана, на вертикальныхъ скалахъ. 25. VII. 90. Сомм. и Лев.! Въ ущельѣ р. Ладжанура. 25. VII. 90. Сомм. и Лев.! Тамъ-же, скалы по р. Ладжанура. VI. 96. Медвѣдев!

Примѣч. Отъ формъ изъ центральнаго Кавказа и Дагестана отличается сѣрымъ мягкимъ опушеніемъ всѣхъ частей растенія, болѣе толстыми стеблями и болѣе большимъ количествомъ цвѣтовъ на стеблѣ. Чашелистики столь же длинные, какъ и у экземпляровъ изъ центральнаго Кавказа.

*3. **S. ossetica** A. DC. *parce albo-setosa tandem glabra*, caulibus e rhizomate incrassato crassiusculis incurvo-pendulis crebre foliosis stricte et subsimpliciter racemosis, foliis *argute duplicato dentatis*, dentibus *glan- duligeris*, margine saepius *setis albis obsitis*, radicalibus longiuscule petiolatis subcordatis *ovatis vel oblongis acuminatis* intermediis *sessilibus*, pedunculis filiformibus ad vel supra medium latiuscule bracteatis calyce longioribus inferioribus interdum subbifloris, calycis *glabri laciniis latissime lanceolatis acuminatis* margine remote denticulatis et *rigide ciliatis* tubo obconico multoties longioribus fructiferis *auctis*, appendicibus *anguste lanceolatis* valde acuminatis tubum calycinum subaequantibus, corolla *violacea glabra tubuloso-campanulata* calycem parte dimidia excedente, capsula obconica, seminibus fuscis oblongis *acutis*. 2. v. v. ets. in h. A. P. M. Tm. Th.

A. DC. Monogr. Camp. p. 368. — DC. Prodr. VII. p. 495. — Ledeb. II. p. 896. — Boiss. III. p. 889. — Rupr. Pull. de l'Acad. des Sc. de St. Petersburg. XI. p. 221. — Trautv. in A. H. P. VI. p. 94. — Lipsky. Фл. К. стр. 376. — Som m. & Lev. in A. H. P. XVI. p. 313. — Radde, Grundz. p. 416; Mus. Cauc. II. p. 121.

Syn. *Campanula ossetica* M. B. Fl. taur.-cauc. III. p. 145.

Hab. in fissuris rupium Caucasi centralis, 2000—5000'. — **S. T.**

Алагиръ. 2280'. 4. IX. 61. Рупрехтъ! (v. in herb. Musei Caucasicum cum fruct.). Алагирское ущелье за сел. Бизъ. 9. VI. 96. Марковичъ! Тамъ-же, за Нахасомъ. 9. VI. 96. Марков.! У р. Ардона, на известковыхъ скалахъ. 2220—2280'. Рупрехтъ. (n. v.). Тамъ-же. 2700'. 15. VI. 90. и 15. VI. 91. Акинф.! (fruct. immat.) Тамъ-же. 4000'. 28. VI. 91. Акинф.! Въ долину р. Ардона. Лойка (sec. Som m. & Lev. loc. cit.). Известковые скалы по р. Гизель-донъ. 3000'. 22. VII. 94. Акинф.! На известковыхъ скалахъ у р. Терека. 2400—2580'. Рупрехтъ (n. v.). Садонъ. 16. VI. Арнольди! Военно-Груз. дор. 2500', близъ Владикавказа. 21. VI. 87.

Акинф.! 30. VI. 05. Θом!! Тамъ-же, по скаламъ. 16. VI. 00. Левитскій! Между Владикавказомъ и Балтой. 25. VI. 94. Б. Федченко! Балта. 14—15. VI. 67. Оверинт! Тамъ-же, на известковыхъ скалахъ. VI. 97. Десулави! Руслор. Терека на камняхъ противъ ст. Балта. 20. VII. 94. Акинф.! (с. fruct.). Между Ларсомъ и Балтой. 11. VII. 77. Вдовьевъ! — А. М. Между Коби и Кайшауромъ (?). Лаговск.! Крестовая гора (?). Лаговск.! Кайшауръ. М. Биб.! (comm. Fischer in herb. M. R. Acad. Imp.).

Примъч. Видъ этотъ, на мой взглядъ, слѣдовало бы скорѣе считать принадлежащимъ къ роду *Campanula*, чѣмъ къ роду *Symphyanandra*, такъ какъ у всѣхъ видѣнныхъ мною экземпляровъ пыльники во *всѣхъ цвѣткахъ* были свободные. Alph. D C. Monogr. I. cit. причисляетъ этотъ видъ къ роду *Symphyanandra* со знакомъ ? и Boissier in Fl. Or. III. p. 890 замѣчаетъ: „Antherae serius saltem in hac specie liberae fiunt quod characterem genericum valde infirmat.“ Alph. De Candolle (Monogr. I. cit.) дѣлаетъ описаніе этого вида со словъ M. Bieberstein'a и въ концѣ своего описанія говоритъ слѣдующее: „Ex habitu et affinitate cum *Camp. pendula* ad nostrum novum genus pertinere videtur, sed tamen character essentialis staminum adhuc videndus est.“

Большая часть растений въ имѣвшемся у меня матеріалѣ по этому виду была уже въ состояніи плодоношенія и, слѣдовательно, не столь удобна для наблюденія надъ тычинками. Такой же матеріалъ, очевидно, былъ въ рукахъ Рупрехта и Буассье. Что касается тѣхъ экземпляровъ матеріала, которые были въ состояніи цвѣтенія, то у нихъ у всѣхъ пыльники были совершенно свободные. Въ нынѣшнемъ 1905 году я собиралъ этотъ видъ въ началѣ цвѣтенія 30 июня между Владикавказомъ и ст. Балта Военно-Груз. дороги и также нашелъ, что во всѣхъ цвѣткахъ пыльники были свободные. Такимъ образомъ принадлежность этого вида къ роду *Symphyanandra* очень сомнительна. Чтобы лучше изслѣдовать этотъ видъ, я привезъ живыя растенія для культуры въ Тифлисскомъ Ботаническомъ Саду.

4. *S. armena* A. DC. pilosula vel plus minus pubescens, caulibus e rhizomate incrassato erectis et decumbentibus gracilibus flexuosis a parte inferiori vel dimidia ramulosis, ramulis strictis 1 vel subcorymbose 3—5-floris, foliis grosse et acutiuscule dentatis inferioribus longe petiolatis *cordato-ovatis*, superioribus minutis subsessilibus, pedunculis filiformibus calyce longioribus erecto-patulis sub apice minutissime bracteolatis, floribus nutantibus, calycis hirti vel canescenti laciniis patentibus *triangularibus* acutis, appendicibus brevissimis acutis, corolla *alba velutina anguste campanulata breviter lobata* laciniis calycinis calycinis *quadruplo* longiore, capsula obovato-turbinata, seminibus fuscis oblongis acutis. 4. v. v. et. s. in h. A. P. J. Tm. Th.

A. D C. Monogr. Camp. p. 367. — DC. Prodr. VII. p. 495. — C. A. Meyer, Verzeichn. d. Pflanz. des Caucas. p. 85. — Hohenack. Enum. Elisabethpol. p. 221; Enum. Talsch. p. 63. — Ledeb. II. p. 896. — Buhse, Aufzähl. p. 144. — Tchihatcheff, Asie Mineure. II. p. 403. — Boiss. III. p. 890. — Trautv. in A. H. P. II. 2. p. 565; VI. p. 95. — Ломак. Фл. Караб. стр. 56. — Липск. Фл. К. стр. 376. — Radde, Mus. Cauc. II. p. 121. — Θом. Труд. Тифл. Бот. Сада. вып. VI. кн. 3. стр. 26.

Syn. *Campanula armena* Stev. in Mém. de la Soc. des Nat. de Mosc. III. p. 256. — M. B. Fl. taur.-cauc. III. p. 145.

Exsicc. S. Fedossejew. Del. pl. exsicc. H. Bot. Jurjew. V. p. 63!

Hab. ad rupes Transcaucasiae austro-orientalis. 4000—10000'. — X. A. Алагезъ. Лаговскій! Тамъ-же, Су-токоюлянъ (Далу-чай). 19. VIII. Хочятовскій! Тамъ-же, ущелье Ампертъ, скалы. 30. VIII. Хочят.! (fl. et

fruct.). Арарать. Байернъ! Между Больш. и Малымъ Араратомъ, мѣстность Сардаръ-Булагъ. Ходзько! Больш. Арарать, на скалахъ около 10000'. 18. VIII. 03. Гринев.! (с. fruct.). Въ горахъ близъ Нахичевани у Сизіанъ и Тассакендъ. V. 47. Бузе! (vix florens). На скалахъ хребта близъ сел. Нусъ-Нусъ, недалеко отъ Ордубада, около 7000'. 21. VI. 03. Гринев.! — **S. S.-K.** Близъ Елисаветполя. Стевень (sec. Boiss. l. cit.). Гогенаккеръ (sec. Boiss. l. cit.). Восточный Кавказъ. 1811. Стевень! (v. in h. M. Bieb. Acad. Imper.) Шуминскій уѣздъ, Елисаветпольск. губ., на скалахъ близъ мѣстечка Ханъ-Кенды. VIII. 00. С. Ѳедосѣевъ! Шуша. Гогенаккеръ! Тамъ-же. Ломакинъ. Елисаветпольск. губ. и уѣздъ, отрогъ скалы Кяпазъ вблизи Гялинъ-кая. 7434'. 6. IX. 96. Скибицкій! Карабахъ, уроч. Эркекъ-кодъжъ, сѣверн. склонъ хребта. 7000'. 25. VIII. 96. Скибицкій! Карабагъ, Лысогорскъ. Камсараканъ! Западный Карабагъ, близъ деревни Каладере, Султанкендъ, Козноваръ, Ташкендъ. VIII. Гогенаккеръ! Славянка. Байернъ! Дашкессемъ. VII. 68. Байернъ! Джеванширскій уѣздъ Елисаветпольск. губ. 7500'. 1893. Скибицкій! Зангезурскій уѣздъ. VI. 86. Медвѣдевъ! Карабагъ, въ субальп. регионѣ горы Кепесъ-дагъ. 26. VI. 44. Коленати! На скалахъ близъ Баллохъ-гель. 26. VI. 44. Коленати! Уроч. Кечаль-дагъ, около 8000'. 16—20. VII. 93. Скиб.! Лишкъ. 12. VI. 71. Радде! На скалахъ близъ сел. Лишкъ. 25. VI. и 4. VII. 03. Гринев.! На скалахъ близъ сел. Тативъ, около 5000'. 4. VII. 03. Гринев.! Гора Капуджихъ. 12. VII. Левандовскій! Тамъ-же, на каменистыхъ мѣстахъ около 7000'. 29. VI. 03. Гринев.! Между Капуджихомъ и Саримсаглы. 29. VI. 03. Гринев.! Эшекъ-Мейданъ. 8400'. VII. 68. Оверинъ! — **S. L.** Талышъ, горы. К. А. Мейеръ! На скалѣ у ручья близъ с. Дыгя. 5000'. 14. VI. 94. Ломакинъ! Лѣсъ у сел. Джонн. 5000'. 14. VI. 94. Ломак.! Нагорная степь между сел. Кяльвязъ и Орантъ. 5500'. 22. VI. 94. Ломак.! Близъ сел. Орантъ у водопада Пъоло-су. 5700'. 5. VIII. 97. Алекс.! Тамъ-же въ ущельѣ. 5300'. 8. VIII. 97. Алекс.! (с. fruct.). Между сел. Люлья-кечанъ и Орантъ. 4700'—6000'. 4. VIII. 97. Алекс.! Между сел. Орантъ и Джангамиранъ, въ лѣсахъ. 5000—6000'. 9. VIII. 97. Алекс.! (с. fruct.). На холмѣ Сангада, недалеко отъ г. Болобандъ (Былю). 5200'. 3. VIII. 97. Алекс.! (с. fruct.). У персидской границы между Карабагъ-юртъ и Мара-юртъ. 7900—8200'. 7. VIII. 97. Алекс.! Высоты Давара. V. 70. Радде! (folia et alab.). Ущелье Тенгъ. 25. VI. 80. Радде!

Ar. Geogr. Persia borealis, Turcomania borealis? (sec. Trautv. in A. Н. Р. VI. p. 95.).

Примѣч. Формы *S. armena* изъ Карабаха и Талыша имѣютъ болѣе густое сѣроватое опушеніе какъ стеблей, такъ и въ особенности листьевъ и чашечки, между тѣмъ какъ экземпляры изъ Арменіи обыкновенно почти совсѣмъ голые. Цвѣтъ вѣнчика у экземпляровъ изъ нижнихъ регионѣвъ обыкновенно молочно-бѣлый, у экземпляровъ же изъ болѣе высокихъ регионѣвъ вѣнчикъ получаетъ слегка голубоватый оттѣнокъ.

* 5. *S. zangezura* Lipsky parte inferiore pilosula, caulibus a collo incrassato erectiusculis vel decumbentibus tenuibus parce ramulosis rarius simplicibus, ramulis erecto-patulis unifloris; foliis inferioribus longe petiolatis fere *geraniaceis*, profunde cordatis ambitu *pentagonis* et *palmatim ultra medium sectis*, segmentis subromboideis oblongo-triangularibus vel oblongis, grosse inciso dentatis vel integris, superioribus sensim diminuen-

tibus subsessilibusque, supremis sublanceolatis subintegris. Floribus pedunculatis nutantibus, pedunculis tenuibus fere filiformibus calyce multo longioribus, calycis parce hirtuli tandem pubescenti laciniis *patentibus linearilanceolatis*, appendicibus brevibus acutis apice hamatis; corolla *violacea* glabra ore parce ciliata *late aperta subrotata* fere *ad medium lobata*, calycis laciniis subduplo longiore; stylo longo piloso, stigmatibus tribus longis revolutis et contortis. *2l. v. s. in h. J. Th. Tm.*

Lipsky, Novit Fl. Cauc. in A. H. P. XIII. 2. p. 317; Фл. К. стр. 376.

— Ломак. Фл. Караб. стр. 56. — Radde, Mus. Cauc. II. p. 121.

— Гриневецкій, Тр. Ботан. Сада Юрьевск. универс. V, вып. 2. стр. 91.

Hab. in rupestribus regionis montanae prov. Karabach. — **S. S.-K.** Елисаветпольская губ., Зангезурскій уѣздъ, недалеко отъ селенія Пирдауданъ, въ трещинахъ между камнями. 23. VI. 93. Липскій. Карабахъ, скалы на г. Хуступъ. 6000'. 26. VII. 95. Ломак.! Сел. Охчи, скалы. 30. VII. 95. Ломак.! Сел. Геджананъ. Ломакинъ (п. v.). Сел. Лишкъ. 3. VIII. 95. Ломак.! Тамъ-же, на сухихъ холмахъ близъ сел. Лишкъ. 23. VII. 03. Гриневецкій! Пастбища на г. Капуджихъ. 8000'. 8—10. VII. 93. Скибинскій!

Примѣч. Растеніе это найдено только въ Карабахъ и такимъ образомъ является эндемичнымъ для этой области. Съ формами, населяющими Главный хребетъ видъ этотъ не имѣетъ родства и вѣсколько ближе стоитъ къ *S. armena*, съ которымъ имѣетъ почти одинаковые верхніе стеблевые листья, во всемъ же остальномъ и здѣсь наблюдается большая разница. Отъ *S. armena* онъ отличается формой и цвѣтомъ вѣнчика, а также формой шишкнхъ стеблевыхъ и прикорневыхъ листьевъ.

* 6. **S. lezgina** Alexeenko pilosa tandem glabrescens glaucescens, caulibus e rhizomate incrassato erectis et decumbentibus vel ascendentibus gracilibus flexuosis *crebre foliosis simplicibus* vel apice ramulosis, ramulis flexuosis unifloris, foliis omnibus parvis firmulis *oblongis vel oblongo-lanceolatis* crenato-dentatis, dentibus sursum porrectis, margine *crispe ciliatis* radicalibus in *petiolum brevem sensim angustatis* caulinis *subsessilibus*, floribus terminalibus solitariis breviter pedunculatis; calycis glabri laciniis a basi *late lanceolata linearibus acuminatis* remote denticulatis margine *crispule ciliatis*, appendicibus late triangularibus acutis tubum calycinum excedentibus, corolla *late campanulata* coeruleo-violacea glabra *ultra medium* in lobos *oblongos* vel *oblongo-lanceolatos* margine *barbatos* fissa laciniis calycinis sesquialongiore, stylo exserto. *2l. v. s. in h. P. Th.*

Alexeenko, Труд. Тифл. Ботан. Сада, вып. VI, кн. 1. (Lipsky Fl. Cauc. supplement. I.) стр. 68.

Hab. in fissuris rupium verticalium et abruptis lapidosis Caucasi orientalis. 2600—7200'. — **A. O.** Елисаветпольск. губ., Нухинск. уѣздъ, у истоковъ р. Вандамъ-чай, на каменистыхъ осыпяхъ. 7000—7200'. 23. VIII. 00. Алексѣенко! (с. flor.). Нухинск. уѣздъ, на затѣненныхъ скалахъ берега р. Ятухъ-чай (Бумъ-чай). 6900'. 28. VII. 99. Алекс.! (с. flor.). — **S. lb.** Елисаветпольск. губ., Нухинск. уѣздъ. Камсараханъ! (in herb. J. Medwedewi). Нухинск. у., на скалахъ изъ песчаника выше сел. Сумагаллы (Самаглу, у р. Гѣкъ-чай). 2600'. 25. VIII. 00. Алекс.! (с. flor.). Бакник. губ., Гѣкчайскій уѣздъ, на холмъ выше сел. Джульянъ Нижній, въ направленіи горы Кюночъ на каменистыхъ осыпяхъ. 4600'. 2. VIII. 99. Алекс.! (с. flor.). Шемахинскій уѣздъ, на вертикальныхъ скалахъ

ущелья выше сел. Мюджи. 4100'. 30. VII. 00. Алекс.! (с. flor.). Шемахинск. у., на склонахъ горы Ниятъ, выше сел. Зарнова, на каменистыхъ осыпяхъ. 6100'. 31. VII. 00. Алекс.! (с. flor.). — **S. D.-K.** Бакнинск. губ., Кубинск. уѣздъ, выше сел. Чичи въ направленіи горы Клитъ-дагъ, въ трещинахъ вертикальныхъ скалъ. 5400'. 9. VII. 99. Алекс.! (с. flor.). Кубинскій уѣздъ, у дороги возлѣ р. Кара-чай, ниже сел. Будугъ въ затѣненныхъ мѣстахъ на скалахъ. 5400' и 6100'. 15. VII. 99. Алекс.! (с. flor., foliis saepius teneris).

Примѣч. Весьма характерный видъ; отличается сильно открытымъ вѣнчикомъ, раздѣленнымъ ниже середины на продолговато-лапчатныя доли. Листья небольшіе отъ 1½—3 см. продолговатой или продолговато-лапчатной формы, у основанія сужены въ короткій черешекъ. Видъ этотъ въ системѣ стоитъ особнякомъ и ни съ однимъ изъ видовъ, населяющихъ Кавказъ или Балканскій полуостровъ, ничего общаго не имѣетъ.

Gen. 3. *Adenophora* Fisch.

Calyx quinquefidus. Corolla campanulata quinqueloba. Stamina 5 a corolla libera, filamentis inferne dilatatis ciliatis; antherae liberae. Discus epigynus crassus, cupularis vel tubulosus, styli basin cingens. Stylus superne pilosus saepius longe exsertus. Ovarium inferum 3-loculare, placentis multiovulatis; stigma 3-fidum, lobis linearibus. Capsula trilobularis vertice lato clausa, lateraliter inter costas operculis singulis dehiscens. — Herbae perennes facie *Campanulae*, floribus capsulaque nutantibus.

Adenophora Fisch. in Mém. de la Soc. Imp. des Natur. de Mosc. VI. p. 165. — A. D. C. Monogr. p. 354. — D. C. Prodr. VII. p. 491. — Endlich. Gen. p. 518. — Benth. et Hook. II. 2. p. 563. — Ledeb. II. p. 892. — Boiss. III. p. 892. — Schönland, in Engl.-Prntl. IV. 5. p. 51. — *Syn. Floerkea* Spreng anno 1818 et *Campanulae* spec. sect. *Floerkearum* ejusd. syst. I. p. 735. — *Campanulae* sp. auctor.

Species 10 Asiae temperatae et Europae mediae et orient. incolae.

Примѣч. Изъ 10 видовъ этого рода, распространенныхъ въ умѣренной части Азии и отчасти въ средней Европѣ, на Кавказѣ встрѣчается всего только одинъ видъ.

1. *A. liliifolia* Led. parce pubescens vel glabra, caule elato crebre folioso in paniculam nudam pyramidatam simplicem vel compositam abeunti, foliis radicalibus petiolatis ovatis vel subcordatis crenatis, caulinis inferioribus breviter petiolatis oblongis et lanceolatis acutis serratis, superioribus lanceolatis acutis sursum sensim diminutis sessilibus, calycis laciniis triangulari-lanceolatis glanduloso-denticulatis tubo aequilongis vel brevioribus, corolla campanulata pallide coerulea calyce quadruplo longiore, stylo exserto, capsula nutante basi dehiscente. **21.** v. v. et s.

Ledeb. Cat. Dorp. 1822. — D. C. Prodr. VII. p. 492. — Ledeb. II. p. 894. — Boiss. III. p. 893. — Шмалъг. II. стр. 179. — Липск. Фл. К. стр. 376.

Syn. *A. communis* Fisch. in Mém. de la Soc. des Natur. de Mosc. VI. p. 168. — *A. communis* Fisch. var. *denticulata* Trautv. in A. H. P. VI. p. 97. — *Campanula liliifolia* L. Sp. 233. — Gölldenst. It. I. p. 190. — M. B. Fl. taur.-cauc. III. p. 139. — *C. alpini* L. Sp. 1669. (Sec. Boiss. l. cit.).

Hab. in dumosis Caucasi septentrionalis et Tauriae. — **S. T.-N.** Крымъ. М. Биберштейнъ. Стевень. — **S. T.** У р. Терека. Гюльденштедтъ.

Ar. Geogr. Europa austr. et austr.-orient., Sibiria omnis.

Примъч. Для Кавказа указывается только Гюльденштедтомъ. Для Крыма указывается Стевеномъ и М. Виберштейномъ.

Gen. 4. *Specularia* Heist.

Calyx quinquefidus. Corolla *rotata* vel *late campanulata* quinqueloba. Stamina a corolla libera, filamentis planis basi *non dilatatis*; antherae liberae. Ovarium inferum triloculare. Stylus pilosus, stigma breviter trilobum. Capsula *linearis* vel *oblonga prismatica* valvulis minutis sub apice lateraliter dehiscens. — Herbae annuae.

Specularia Heist. Syst. Gen. p. 8. — A. D. C. Monogr. p. 344 — D. C. Prodr. VII. p. 489. — V a t k e, in Linnaea. XXXVIII. p. 713. — B n t h. et H o o k. II. 2. p. 562. — E n d l i c h Gen. p. 517. — L e d e b. II. p. 891. — B o i s s. III. p. 958. — S c h ö n l a n d, in Engl.-Prntl. IV. 5. p. 52. — Syn. *Legouzia* D u r a n d, Fl. Bourg. II. p. 26. (ex A. D. C. 1. cit.). — *Apenula* N e e k. Elem. 1. 234. — *Prismatocarpi species boreales* L h e r. Sert. Angl. 1. — *Campanulae* spec. auct. — *Triodanis* R a f. (ex S c h ö n l a n d, 1. cit.). — *Dysmicodon* N u t t. (ex S c h ö n l a n d, 1. cit.). — *Campylocera* N u t t. (S c h ö n l a n d, 1. cit.).

Species 10 regionis Mediterraneae et Americae borealis incolae.

1. Вѣнчикъ болѣе или менѣе крупный или средней величины при расцвѣтаніи равенъ по длинѣ чашелистикамъ или немного превышаетъ ихъ 2.
2. Вѣнчикъ маленький, въ два раза короче чашелистиковъ . . . 3.
3. Чашелистики ланцетные при расцвѣтаніи вѣнчика въ два раза короче трубки чашечки; вѣнчикъ болѣе или менѣе крупный (15—18 mm. величины); капсула у верхушки не сжатая.

S. pentagonia A. D. C. (2).

Чашелистики линейно-ланцетные или линейные, равны трубкѣ чашечки или чуть ея короче, въслѣдствіи оттопыренно-преломленные; капсула у верхушки сжатая.

S. Speculum A. D. C. (1).

3. Чашелистики продолговатые, прямо вверхъ стоящіе, острые, у основанія сужены, въ 3 или 4 раза короче трубки чашечки; капсула у верхушки сжатая **S. hybrida** A. D. C. (4).

Чашелистики отъ ланцетно-линейнаго основанія къверху оттянуто-длинно-заостренные, дугообразно отогнутые, чуть короче трубки чашечки; капсула у верхушки не сжатая. **S. falcata** A. D. C. (3).

Примъч. Изъ 10 видовъ рода *Specularia*, 6 распространены въ Средиземноморской области и 4 въ Сѣв. Америкѣ. Изъ первыхъ шести видовъ на Кавказѣ встрѣчаются только четыре — *Sp. Speculum* A. D. C., *Sp. pentagonia* A. D. C., *Sp. falcata* A. D. C. и *Sp. hybrida* A. D. C. Такъ какъ эти растенія представляютъ собою въ большинствѣ случаевъ сорный элементъ среди полевовъ, который при сборахъ часто игнорируется ботаниками, то данныхъ относительно распространенія видовъ р. *Specularia* на Кавказѣ имѣется очень мало.

Sect. I. Gerontogae A. D. C.

Calycis tubus longissimus angulosus. Capsula prope lobos calycis lateraliter dehiscens. Semina ovoidea. — Folia inferiora obovata integra, alia ovato-oblonga vel lanceolata subintegra non amplexicaulia.

A. D. C. Monogr. Camp. p. 344. — D. C. Prodr. VII. p. 489.

1. S. Speculum A. D C. annua, glabrescens, hirta vel canescens, simplex vel a collo ramosa, caulibus lateralibus ascendenti-diffusis centrali erecto omnibus paniculatis; foliis undulato-crenatis oblongis inferioribus basi attenuatis superioribus semiamplexicaulibus, floribus subsessilibus ad apicem caulis fasciculato-cymosis, ramulorum saepius solitariis, calycis laciniis lineari-lanceolatis sub anthesi tubo *aequilongis* vel *parum brevioribus*, *denuum patenti-refractis*, corolla *mediocri* violacea calycis laciniis aequante, capsula apice *constricta*. ☉. v. viva culta et s. in h. P.

A. D C. Monogr. Camp. p. 346. — D C. Prodr. VII. p. 490. — Ledeb. II. p. 892. — Boiss. III. p. 959. — Липск. Фл. К. стр. 380.

Syn. *Campanula speculum* L. Sp. 238. — Trautv. in A. H. P. VI. p. 91. — *Prismatocarpus speculum* L'Her. Sert. Angl. p. 2. — Icon. Ic. Fl. Graec. tab. 216. — Rechb. Ic. Fl. Germ. tab. 255!

Hab. in cultis, inter segetes regionis inferioris et montanae. — **S. T.** Въ верховьях Ардона. Лаговскій! — **S. Ib.** Иберія. Вильгельмъ? (sec. A. D C. I. cit.). — **X. A.** Близъ Карса. 4. VII. 55. Лаговскій! Карска обл., Бардусъ. 19. VII. 55. Лаговскій!

Ar. Geogr. Europa media et austr., Africa bor., Asia minor, Palestina.

2. S. pentagonia A. D C. annua, pubescens vel canescens, saepe pilosa, simplex vel a collo ramosa caulibus lateralibus ascendentibus, floribus sessilibus terminalibus 3—5 stricte corymbosis vel solitariis, foliis sessilibus inferioribus obovatis superioribus lineari-lanceolatis, calycis hispidulo-asperius glabrati laciniis *lanceolatis* sub anthesi tubo plerumque *duplo brevioribus*, corollae *majusculae* violaceae lobis obtusis mucronulatis laciniis calycinis sublongioribus, capsula apice *non constricta*. ☉. v. s. in h. P.

A. D C. Monogr. Camp. p. 344. — D C. Prodr. VII. p. 489. — Vатке, Not. in Camp. herb. reg. berol. in Linnaea. XXXVIII. p. 713. — Ledeb. II. p. 892. — Boiss. III. p. 959. — Липск. Фл. К. стр. 381.

Syn. *Campanula pentagonia* L. Sp. 239. — Trautv. in A. H. P. VI. p. 91. — *Prismatocarpus pentagonius* L'Her. Sert. Angl. p. 2.

Icon. Desf. Ic. Cor. tab. 33. — Rechb. Ic. Fl. Germ. tab. 256!

Exsicc. G. V. Aznavour, Fl. de Constantinople (ex herb. Dörfler)!

Hab. in aridis et graminosis siccis Transcaasias. — **S. P.** Батумъ. V. 85. Смирновъ! (in herb. Trautv.). — **X. A.** Закавказье, на границѣ съ Турціей. Нордманъ (sec. Ledeb. I. cit.).

Ar. Geogr. Penins. Balcan., Asia minor, Palestina; Gallia australis, sed ibi probab. introducta.

3. S. falcata A. D C. annua, parce pubescens, a collo ramosa vel simplex, caule erecto inferne saepe ramoso in spicam longam interruptam abeunte, foliis inferioribus obovatis subpetiolatis superioribus semiamplexicaulibus, floribus sessilibus ad axillas geminatis vel binis inferioribus remotis superioribus saepe approximatis, calycis laciniis a *basi lanceolato-lineari longe attenuato-acuminatis arcuato-reflexis* tubo subbrevioribus, corolla calycis laciniis *subtriplo* minore, capsula apice *non constricta*. ☉. v. s. in h. P.

A. D C. Monogr. Camp. p. 345. — D C. Prodr. VII. p. 489. — Boiss. III. p. 960. — Липск. Фл. К. стр. 381.

Syn. *Campanula falcata* Röm. et Schult. Syst. veg. V. p. 154. — *C. syriaca* Willd. Reliq. in R et Sch. Syst. V. p. 133. (ex Boiss. I. cit.). — *Prismatocarpus falcatus* Ten. Prodr. p. 16.

Icon. Ten. Ic. Fl. Nap. tab. 20. — Rchb. Ic. Fl. Germ. tab. 255!

Hab. in regione montana Ciscaucasiae. — **S. T.** Алагиръ по теченію Ардона. Лаговскій!

Ar. Geogr. Europa austr., Africa bor., Asia minor, Palestina, Persia.

4. **S. hybrida** A. DC. glabrescens vel puberula, caule erecto pumilo saepius unico et simplici apice corymbose paucifloro rarius superne ramulis paucis brevibus obsito, foliis sessilibus undulato-crenatis inferioribus obovatis caeteris oblongis, calycis laciniis *oblongis* acutis *basi angustatis erectis* tubo 3—4plo brevioribus, corolla coeruleo-violacea minuta vix aperta laciniis calycis duplo breviorе, capsula apice *constricta*. ☉. v. s. in h. P. Th. A.

A. DC. Monogr. Camp. p. 348. — DC. Prodr. VII. p. 490. — Ledeb. II. p. 892. — Boiss. III. p. 960. — Шмальг. II. стр. 180. — Lipsky, in A. H. P. XIII. p. 316. — Липск. Отъ Касп. къ Понту Зап. Киев. Общ. Ест. XII. стр. 360; Фл. К. стр. 381. — Radde. Mus. Cauc. II. p. 122.

Syn. *Campanula hybrida* L. Sp. 239. — M. B. Fl. taur-cauc. I. p. 156. — Trautv. in A. H. P. VI. p. 92. — *Prismatocarpus hybridus* L'Her. Sert. Angl. p. 2.

Icon. Rchb. Ic. Fl. Germ. tab. 255!

Hab. in agris et saxosis regionis inferioris et montanae Tauriae et Caucasii. — **S. T.-N.** Крымъ, Севастополь, на степи. 5.V. 96. Гольде! Крымъ, на каменистыхъ обсыпяхъ дер. Соколы у Судака. 15.V. 96. Калле! Симферополь. Траутф.! Крымъ, у истоковъ Салгира. Стевень. Крымъ. 1863. Проф. Козловскій! Ялта, на каменистомъ склонѣ. 18. V. 98. Гольде! Новороссійскъ. 6. V. 92. Липскій!

Ar. Geogr. Europa austr., Africa bor.

Gen. 5 Michauxia L'Her.

Calyx 8—10-fidus sinubus in appendices reflexas dilatatis, calycis tubo late turbatus vel hemisphaericus. Corolla 8—10-partita, lobis angustis patentibus recurvisve. Stamina 8—10 libera filamentis basi latissimis, antheris breviter cuspidatis. Ovarium inferum, 8—10-loculare, placentis bifidis multiovulatis; stylus crassus pilosus, stigmate 8—10-fido, lobis linearibus. Capsula hemisphaerica nutans basi 8 valvis dehiscens. — Herbae elatae, caule crasso, radice monocarpica.

Michauxia L'Her. Dissert. cum ic. ex A. DC. Monogr. Camp. p. 211. — DC. Prodr. VII. p. 457. — Benth. et Hook. II. 2. p. 561. — Ledeb. II. p. 874. — Boiss. III. p. 890. — Schönland, in Engl.-Prnt. IV. 5. p. 52. — **Syn.** *Mindium* Juss. Gen. p. 164. — A. DC. Monogr. Camp. I. cit. — DC. Prodr. VII. I. cit. — Benth. et Hook. I. c. — Schönland, I. cit.

Species 6 in Oriente. (Persia et Asia minor).

Примѣч. Изъ 6 видовъ этого рода на Кавказѣ встрѣчается всего только одинъ видъ, остальные виды этого рода распространены въ юго-западной Персїи и Малой Азїи, а также еще въ Месопотамїи.

1. **M. laevigata** Vent. caule crasso elato albido *glabro* simplici inferne folioso in spicam longissimam laxam abeunti, foliis superne tuberculatis subtus tuberculato-asperis duplicatim dentatis inferioribus *ovato-oblongis* petiolatis petiolo sub lamina interdum dentibus vel segmentis parvis oblon-

gis aucto, foliis superioribus valde diminutis oblongis sessilibus, floribus sessilibus vel brevissime pedunculatis, calycis strigosi laciniis appendicibusque triangulari-lanceolatis acutis subaequilongis, corollae *albae* ad nervos hirsutae *ultra medium* partitae laciniis ligulatis patulo-reflexis. ☉. v. v. et s. in h. P. Th. Tm. J.

Vent. Hort. Cels. p. et tab. 81. — A. D. C. Monogr. Camp. p. 212. — D. C. Prodr. VII. p. 457. — Hohenack. Enum. Talysch. p. 64. — Ledeb. II. p. 875. — Boiss. III. p. 891. — Trautv. in A. H. P. VI. p. 55. — Ломак. Фл. Караб. стр. 57. — Липск. Фл. К. стр. 376. — Radde Mus. Cauc. II. p. 121. — Оом. Addenda ad Herb. Cauc. viv. въ Труд. Тифл. Бот. Сада, вып. VI, кн. 3. стр. 26.

Hab. ad rupes et schistosis et in collibus aridis Transcaucasiae australis. — **X. A.** Гора Каракѣннакъ въ сосѣдствѣ съ Алагезомъ и р. Ашпертъчай. Лаговскій! По р. Араксу отъ впаденія р. Тутъ до впаденія р. Ахъчай. 21. VII. 86. Масальскій! Близъ сел. Джульфа на скалахъ у берега р. Аракса. 8. VI. 03. Гриневецкій! Ордубатъ. 11. VII. 98. Левановск.! Эриванск. губ. на востокъ отъ Ордубата. 9. VII. 04. Кѣнигъ! На с.-з. отъ Ордубата. 13. VII. 04. Кѣнигъ! Близъ сел. Нижн. Акулены. 26. VI. 01. Оом.!! Безоглыбанскій пость у персидской границы. 15. X. 02. Оом.!! (с. fruct.). Армения, Кошадора. Шовичъ. (п. v.). Сел. Арпа, средн. Арпа-чай въ Шаруро-Даралагезскомъ уч. 30. VII. 05. Шелковниковъ! — **S. S.-K.** Карабагъ. Herb. Mus. Cauc.! Карабагъ, сел. Шернуха. 21. VII. 95. Ломак.! Ньюады. 4. VI. 90. Радде! — **S. L.** Талышъ, Свантъ, на сухихъ склонахъ близъ сс. Гилледаре и Диге. с. а. 6000'. Гогенаккеръ!

Ar. Geogr. Persia.

Примѣч. Видъ этотъ встрѣчается исключительно въ южномъ Закавказьѣ и свойственъ сухимъ, каменистымъ, слегка солонцеватымъ склонамъ, гдѣ сразу бросается въ глаза своими высокими отъ 1 $\frac{1}{4}$ —2 арш. вышины стеблями.

Gen. 6. Podanthum Boiss.

Calyx quinquefidus. Corolla quinquepartita laciniis *linearibus semper liberis*. Antherae liberae. Stylus pilosus, stigma trifidum. Capsula trilocularis poris lateralibus apice, ad medium, vel basi dehiscens. — Herbae perennes vel monocarpicae, floribus subsessilibus vel pedunculatis fasciculatis vel solitariis subsessilibus vel pedicellatis in spicas laxas vel racemos dispositis.

Podanthum Boiss. Fl. Orient. III. p. 945. — **Syn.** *Phyteuma* Sect.

Podanthum Don, Gen. Syst. III. p. 748. — D. C. Prodr. VII. p. 454. — Ledeb. II. p. 873. — Benth. et Hook. II. 2. p. 561. — Schönland, in Engl.-Prntl. IV. 5. p. 54. — *Phyteuma* Sect. 3. A. D. C. Monogr. Camp. p. 201. — *Tracanthelium* Schum. (sec. Schönl. l. cit.) — *Asyneuma* Griesb. lt. Hung. p. 335.

Species ad 23 Europae australis, Caucasi et Asiae minoris incolae.

1. Листья расположены у корневой шейки или только на нижней части стеблей 2.
2. Листья густо расположены по всему стеблю 5.
2. Цвѣты сидячіе 3.
- Цвѣты на болѣе или менѣе длинныхъ цвѣтоножкахъ, равныхъ чашечкѣ, длиннѣе ея или короче 8.
3. Чашелистики овально-ланцетные тупые въ 5 разъ короче вѣнчика, прицвѣтники очень маленькіе овальные, острые; прикорневые листья эллиптическо-продолговатые, тупые, тупо-пильчатые.

P. leianthum Trautv. (3).

- Чашелистики широко-ланцетные или линейные 4.
4. Прикорневые листья продолговато-ланцетные, заостренные, зубчатые; прицветники выпуклые почковидно-округлые съ зубчиками, чашелистики широко-ланцетные. *P. pulchellum* Boiss. (2).
- Прикорневые листья продолговатые или продолговато-ланцетные, всегда тупые по краю неправильно-зубчатые, волнистые; прицветники маленькие овальные заостренные; чашелистики линейные или ланцетные . . . *P. cichoriforme* Boiss. (1).
5. Стеблевые листья сидячие овальные съ сердцевидно-стеблеобхватывающимъ основаніемъ или же у основанія только закруглены и сердцевидны 6.
- Стеблевые листья продолговатые, продолговато-ланцетные или ланцетные 7.
6. Чашелистики короткіе, треугольно-ланцетные послѣ цвѣтенія часто заворочены кнаружи въ завитокъ, чуть превышаютъ овальную трубку чашечки и въ 5 разъ короче вѣнчика; стеблевые листья у основанія сердцевидно-стеблеобъемлющіе. *P. amplexicaule* Boiss. (4).
- Чашелистики ланцетные заостренные превышаютъ удлинненную обратно-коническую трубку чашечки въ $1\frac{1}{2}$ —2 раза и въ 2—3 раза короче вѣнчика; стеблевые листья съ закругленнымъ или сердцевиднымъ основаніемъ. *P. campanuloides* Boiss. (5).
7. Цвѣты сидячіе, листья жесткіе ланцетные или узко-ланцетные, остропильчатые съ оттопыренными хрящеватыми зубчиками. *P. lanceolatum* Boiss. (7).
- Цвѣты на очень короткихъ цвѣтоножкахъ, равныхъ по длинѣ трубкѣ чашечки или короче ея; листья продолговатые или продолговато-ланцетные, городчатые или городчато-зубчатые. *P. canescens* Boiss. (6).
8. Прикорневые листья продолговато-ланцетные или узко-ланцетные, оттянутые съ обоихъ концовъ, по краю выемчато-зубчатые и волнистые, цвѣтоножки равняются по длинѣ чашечкѣ или превышаютъ ее; чашелистики линейно-ланцетные, острые. *P. lobelioides* Boiss. (9).
- Прикорневые листья продолговато-ланцетные, оттянутые въ короткій черешекъ, по краю слегка выемчатые; цвѣтоножки равняются по длинѣ трубкѣ чашечки; чашелистики толстоватые треугольно-ланцетные, тупые *P. Otites* Boiss. (8).

Примѣч. Буа с с е вполне основательно отдѣляетъ родъ *Podanthum* отъ *Phyteuma*, такъ какъ по характеру соцвѣтія и формѣ вѣнчика онъ ближе подходитъ къ роду *Campanula*. Нѣкоторые виды рода *Podanthum* представляютъ собою какъ бы переходныя формы отъ рода *Campanula* и раньше даже относились именно къ этому послѣднему роду. Таковы напр. *P. psilostachyum* Boiss., *P. persicum* Boiss. и *P. strigillosum* Boiss. Главное различіе между *Podanthum* и *Campanula* состоитъ лишь въ глубинѣ разрывовъ вѣнчика; у послѣдней вѣнчикъ раздѣляется на лопасти обыкновенно только до половины, а у *Podanthum* вѣнчикъ раздѣленъ еще глубже, обыкновенно почти до основанія, но у нѣкоторыхъ его видовъ, какъ *P. psilostachyum* онъ раздѣленъ до половины или нѣсколько ниже половины, а у *P. persicum* и *P. strigillosum* разрывы вѣнчика доходятъ до $\frac{3}{4}$ его. Нельзя придавать важнаго значенія и тѣмъ крайнимъ рѣдкимъ случаямъ, когда у *Podanthum* при началѣ цвѣтенія бываютъ слѣплены 2 лепестка, такъ какъ подобные случаи бываютъ и у видовъ рода *Campanula* и представляютъ собою или уродство, или вызываемые уколами насекомыхъ, при чемъ склеиваніе происходитъ вслѣдствіе засыханія выдѣлившагося млечнаго сока.

Родъ *Podanthum* преимущественно малоазіатскій и раздѣляется на двѣ секціи: *Eupodanthum* Boiss. и *Clinocarpium* Boiss. Первая характеризуется капсулой, направленной вверхъ и открывающейся отверстіями у верхушки или ея середины. Вторая секція имѣетъ поникающую капсулу съ отверстіями, открывающимися у ея основанія. На Кавказѣ

встрѣчаются представители только первой секціи, вторая же секція имѣетъ своихъ представителей частью въ Персіи и Малой Азіи, частью въ восточной части Средиземноморской области. Замѣчательно, что ареалы распространѣнія видовъ *Podanthum* какъ въ южной части Закавказья, такъ и въ Малой Азіи обыкновенно очень малы. Широкое распространѣніе въ Кавказѣ имѣетъ только *P. campanuloides* Boiss., являющийся представителемъ альпійской и субальпійской зоны всего Кавказа. Такую же высокогорную форму представляетъ собою *P. amplexicaule* Boiss. для юго-западной части южнаго Закавказья, гдѣ онъ замѣняетъ вышеупомянутый видъ. Что касается остальныхъ видовъ рода *Podanthum* на Кавказѣ, то всѣ они являются представителями горныхъ степей и распространены главнымъ образомъ въ южномъ Закавказьѣ въ мѣстахъ, пограничныхъ съ Персіей и Малой Азіей.

Sect. I. *Eupodanthum* Boiss.

Capsula erecta poris versus apicem vel ad medium dehiscens.
Boiss. III. p. 945.

1. *P. cichoriforme* Boiss. minute papillari-pubescens, caule *crasso anguloso elato subaphyllo* in paniculam longam strictam ramosissimam abeunti, foliis radicalibus margine *grosse undulatis* oblongis et late oblongo-lanceolatis *obtusissimis* in petiolum attenuatis, caulinis paucis parvis linearibus, floribus 3—5 sessilibus in fasciculos remotos ad bracteae *parvae ovatae acuminatae* axillam secus ramos paniculae elongatos spicatis, calycis laciniis *glabris linearibus* tubo oblongo punctis vel papillis albis saepius obsito subduplo longioribus corolla glabra duplo brevioribus. ☉. v. s. in h. P.

Boiss. Diagn. Ser. I., 4, p. 37. — Boiss. III. p. 947. — Липск. Фл. К. стр. 380.

Hab. in Transcaucasia australi. — X. A. Карсеская обл., Кагызманъ, по глинистымъ обрывамъ оврага Кагызманъ-дара-су, рѣдко. 13. VI. 86. Масальскій!

Ar. Geogr. Asia minor.

2. *P. pulchellum* Boiss. biene pubescens, caule *crasso elato* parte inferiori folioso paniculato ramis paniculae strictis longis laxissime spicatis, foliis radicalibus *oblongo-lanceolatis acuminatis* in petiolum brevem attenuatis margine *denticulatis* saepe *crispis*, caulinis sessilibus diminutis angustis, floribus *sessilibus* 2—5 in glomerulos *sessiles* remotos bractea *cutellata reniformi-orbiculata denticulata semiamplexicauli suffultos* dispositis, calycis glabriusculi vel pubescenti laciniis *late lanceolatis* tubo breviter turbinato duplo longioribus corolla dimidio brevioribus, capsula ovata basi rotundata poris latis sub apice sitis dehiscente, seminibus fuscis nitidis turgidis non marginatis. ☉. v. s. in h. P. Tm.

Boiss. Fl. Or. III. p. 947. — Липск. Фл. К. стр. 380. — Radde, Mus. Cauc. II. p. 122.

Syn. *Phyteuma pulchellum* C. A. Mey. Ind. I. H. Petrop. p. 35. — D. C. Prodr. VII. p. 455 — Ledeb. II. p. 873. — Trautv. in A. H. P. VI. p. 50. — *Podanthum limonifolium*? Hohenack. Enum. Talysch. 62. — C. A. Meyer, Verzeichn. d. Pflanz. des Cauc. p. 83.

Exsicc. Szovits! Radde! Persia borealis!

Hab. in dumosis montanis et subalpinis Transcaucasiae austro-orientalis, 4000—8000'. — S. L. Талышъ въ окрестности сел. Сивиръ и Свантъ.

К. А. Мейеръ! Пров. Суантъ. Гогенаккеръ! На безплодныхъ мѣстахъ бл. сел. Татуни. VI—VII. Гогенаккеръ! У персидской границы между Карабагъ-юртъ и Мара-юртъ. 7900'—8200'. 7. VIII. 97. Алексѣенко!

Ar. Geogr. Persia!

Примѣч. Видъ этотъ распространенъ главнымъ образомъ въ Персіи; въ Закавказьѣ встрѣчается въ юго-восточной его части, граничащей съ Персіей. Отъ близкихъ видовъ *P. leianthum* Trautv. и *P. cichori-forme* Boiss. отличается широкими почковидно-округлыми, выуклыми прицвѣтниками и формой прикорневыхъ листьевъ.

*3. *P. leianthum* Trautv. radice. . . , caule inferne retrorsum scabro ramos virgatos tota longitudine floriferis edente, foliis radicalibus margine ciliatulis elliptico-oblongis obtusis grosse et obtuse serratis in petiolium brevem angustatis, caulinis . . . , florum sessilium fasciculis trifloris remotis, bracteis glabris minutis ovatis acutis, calycis glabri laciniis ovato-lanceolatis obtusis corolla 5-plo capsula triplo brevioribus, capsula oblonga apice constricta poris prope apicem dehiscente. ☉ an ? v. s. in h. Tm.

Trautv. in Acta Hort. Petrop. III. p. 274. — Boiss. Fl. Orient. Suppl. p. 334. — Липск. Фл. К. стр. 380.

Hab. in Transcaucasia australi. — X. A. У р. Ольты-чай. 17. VII. 74. Раде!

Примѣч. Отъ *P. pulchellum* Boiss. помимо формы нижнихъ прикорневыхъ листьевъ и прицвѣтниковъ отличается тупыми овально-ланцетными чашелистиками. Ареалъ распространенія этого вида въ Закавказьѣ, повидимому, небольшой, подобно многимъ другимъ видамъ изъ Малой Азіи.

4. *P. amplexicaule* Boiss. glabrum vel ad paginae inferioris nervos parce hirtulum, caule elato folioso in spicam simplicem vel parce ramosum plus minus elongatum basi interruptam abeunti, foliis argute serratis vel biserratis inferioribus ovato oblongis breviter petiolatis, caeteris sessilibus cordato-amplexicaulibus acutis summis valde diminutis breviter lanceolatis, floribus pedicellis calycis tubo sublongioribus suffultis in fasciculos sessiles dispositis, calycis glabri laciniis breviter triangulari-lanceolatis obtusis saepius circinato-revolutis tubo ovato sublongioribus corolla glabra demum ad basin in laciniis lineares partita multoties brevioribus, capsula ovato-sphaerica poris paulo supra medium dehiscente. ☿ v. s. in h. P. Th.

Boiss. Fl. Or. III. p. 948.

Syn. *Phyteuma amplexicaule* Willd. Spec. I, p. 925. (non Flora Graeca sec. Boiss. l. cit.). — A. DC. Monogr. Campan. p. 207. (partim). — DC. Prodr. VII. p. 455. (partim).

Exsicc. Szovits. Persia!

Hab. in regione montana Transcaucasiae australis. — X. A. Карсская обл., Бешъ-килиса около рѣч. Дигоръ-чай. 1886. Масальскій! Кареск. обл., хребтъ Шахъ-юлы между Араксомъ и верховьями Ефрата. 7000'. 17. VII. 86. Масальскій! — S. S.-K. Карабагъ, у сел. Беченагъ. 10. VII. 95. Ломакинъ!

Ar. Geogr. Persia!, Asia minor.

Примѣч. Видъ этотъ весьма характеренъ по стеблевымъ, у основанія стеблеобъемлющимъ листьямъ, края которыхъ дважды- или неправильно-пильчатые и по короткимъ треугольно-ланцетнымъ, тупымъ чашелистикамъ, которые въ 5 разъ короче вѣнчика и послѣ цвѣтенія обыкновенно закручиваются кнаружи въ завитокъ. Эти признаки очень хорошо отличаютъ *P. amplexicaule* Boiss. отъ близкаго вида *P. campanuloides* Boiss. Въ фруктифицирующемъ состояніи первый видъ легко отличить отъ второго еще по отверстіямъ капсулы, открывающимся у ея середины сбоку.

var. Kotschyi Boiss. folia *hirtula canescentia* minora, superiora interdum minus manifeste cordata. 24. v. s. in h. Th.

Boiss. Fl. Orient. III. p. 949.

Syn. *Phyteuma Kotschyi* Boiss. Diagn. Ser. I. 11, p. 71 et *Campanula Cilicia* Boiss., ibid. p. 77.

Hab. in regione montana Transcaucasiae austro-occidentalis. — X. А. Карсеская обл., Ольтинскій окр., лѣсъ у Керъ-Оглы. 13. VII. 03. Кѣнигъ!

Аг. Geogr. Asia minor.

Примѣч. Отъ типичной формы отличается твердой консистенціей листьевъ и сѣрымъ опушеніемъ ихъ. Края листьевъ неправильно-зубчатые.

*5. **P. campanuloides** Boiss. pubescenti-scabrum vel glabratum, caule simplici elato inferne crebre foliato in spicam saepius brevem basi interruptam et subfoliatam abeunte, foliis crenatis inferioribus ovatis subpetiolatis obtusis, caeteris sessilibus a basi rotundata vel cordato-subamplexicauli oblongis acuminatis supremis lanceolatis, floribus subsessilibus fasciculatis, calycis glabri laciniis *erectis lanceolatis* acutis tubo *anguste et longe obconico sulcato sesqui vel duplo longioribus* corolla *glabra triplo brevioribus*, capsula oblonga valvis prope apicem sitis dehiscente. 24. v. v. et s. in h. A. P. J. M. Th. Tm. S.

Boiss. Fl. Orient. III. p. 949. — Rupr. Bull. de l'Acad. d. Sc. de St. Pétersb. XI. p. 172. отд. отт. — Ломак Фл. Карабах. стр. 58. — Albow, Prodr. Fl. Colch. p. 162. — Линск. Фл. К. стр. 380. — Somm. et Lev. in. A. H. P. XVI. p. 327. — Radde, Mus. Cauc. II. p. 122. — Бушъ. По горамъ и ущельямъ Хевсур. и Тумет. стр. 31, 38, 40, 48.

Syn. *Phyteuma campanuloides* MB. Fl. taur.-cauc. I. p. 156; III. p. 148. — A. D C. Monogr. Camp. p. 206. (partim) — D C Prodr. VII. p. 455. — C. A. Meyer, Verzeichn. d. Pflanz. d. Cauc. p. 83. — Eichw. Casp.-cauc. p. 32. — Hohenack. Enum. Elisabethopol. p. 221. — Ledeb. II. p. 874. — Trautv. in A. H. P. VI. p. 51; VII. 2. p. 477; X. p. 120. — Шмальг. II. стр. 172.

Hab. in regione subalpina et alpina ubique silvatica totius Caucasi. 2400—9000'. — S. K. Между Черноръчьемъ и горой Ахцархва. 14. VII. 88. Кзнц.! Гора Ахцархва Кубанск. обл., сосновый лѣсъ. 15. VII. 88. Кзнц.! Подъемъ въ верховья р. Уллу-Мурутчу, сосновый лѣсъ. 15. VII. 97. Бушъ! Ущелье р. Муху, притока р. Теберды, пихтово-еловый поясъ. 24. VII. 96. Бушъ! Умпырь, нижняя часть субальп. обл. 20. VII. 88. Кзнц.! Устье р. Закана, притока р. Лабы. 22. VII. 88. Кзнц.! Верховья р. Лабы, субальп. поясъ. 28. VII. 88. Кзнц.! Въ верховьяхъ р. Мары. 7. VII. 89. Кзнц.! На лугахъ аула Учкуланъ и Кардджюртъ. 24. V. 84. Спнягинъ! Учкуланъ, сосновый лѣсъ. 11. VII. 89. Кзнц.! — S. T. Вештау. VII. Гогенаккеръ! Тамъ-же. Беккеръ! (foliis margine serratis et crenato-serratis). К. А. Мейеръ! 2400'. 1867. Беккеръ! Рупрехтъ. 28. VI. 89. Кзнц.! 4500'. 2. VII. 89. Акинф.! 29. VI. 96. Литвиновъ! Пятигорекъ. Гѣффтъ! Горная степь близъ оз. Тамбукана близъ Пятигорска. 25. VI. 89. Кзнц.! Пятигорекъ, Машука. 3. VII. 96. Литвиновъ! Кисловодскъ. 1882. Акинф.! VII. 84. Акинф.! Окрестности Кисловодска на черноземъ между кустарниками. 20. VII. 01. Шираевскій! Гора Джиналъ. 4200'. 18. VII. 89. Акинф.! Долина р. Баксана, выше аула Урусбиева, луга. 18. VII. 89. Кзнц.! Ур. Баксана. 3000'. 15. VII. 96. Алексѣенко! Тамъ-же, близъ Терсколь. 7000'. 17. VII. 96. Алекс.! Осетія, Ходское ущелье. 29

VI. Левитскій! Ходскіе горныя луга. 21. VII. 95. Марковичъ! Южн. склонъ горы Карца, субальп. луга. 4. VI. 90. Кзнци! Билагское ущелье. 4. VIII. 95. Марков! Горныя луга около сел. Нхой, гора Дарчендукъ. 14. VII. 96. Гассіевъ! Чермой-ламъ. VI. 92. Марков! Осетія, горныя луга. VII. 93. Марков! Казбекъ. VIII. 81. Бротерусть! Между караулками Гвнлетской и Девдорацкой. 26. VI. 94. Б. Федченко! Чечня, Ведено. 26. VII. 94. Радде и Кёнигъ! Терск. обл., Хасавъ-юртскій окр., Салатау, выше сел. Гонзагой, на лугахъ. 5000'. 28. VI. 97. Алекс! Салатау, скалы. 24. V. 89. Кзнци. — **X. D.** Дагестанъ, Дай-Кири. 5000'. 20. VII. 94. Радде и Кёнигъ! Хунзахъ. 29. VII. 85. Радде! Близъ Гуниба. 5000—6500'. 5. VII. 97. Алекс! Казкумухскій окр., между сел. Шуть и Мукгаръ. 5500—6500'. 8. VIII. 97. Алекс! — **S. D.-K.** Дагестанъ, Даргинскій окр., между кустарниками *Rhododendron flavum* у дороги между Бускри и Мейсиша. 4400'. 11. VII. 98. Алекс! Въ основомъ лѣсу Гумра-дузъ между Акуша и Муги. 4800'. 14. VII. 98. Алекс! (с. fruct.). Бакинск. губ., Кубинск. уездъ, близъ сел. Кюцюпъ, на скалахъ между кустарниками. 4700'. 23. VII. 99. Алекс! — **A. W.** Гора Фиштъ, альп. луга. 1893. Альбовъ. (п. v.). Перемычка Хагъ-Кычырха, альп. луга. № 266. 17. VIII. 94. Альб! Субальп. луга хребта Псеашхо. 12. VII. 01. Гриневецкій! (*foliis serratis*). Абхазія, гора Чедымъ, около 7000'. 29. VII. 88. Ивановъ! Гора Чипшира, альп. луга. 24. VIII. 02. Вороновъ! Гора Санчара, альп. луга. Альбовъ! (*foliis serratis*). Бзыбек. хреб., альп. луга. 1850—1900 м. Альб! Клухорскій переваль, южн. склонъ. 2300 м. 27. VIII. 90. Соммье и Лев! Тамъ-же. VI. 91. Альб! Самурзаканъ, хреб. Речп, альп. луга. IX. 92. Альб! (с. flор.). Субальпійскіе луга по Ляхтинскому хребту. 29. VIII. 97. Бушъ! Большой Кутый, альп. пастб. 9. VIII. 99. Вороновъ! Кубанск. обл., субальп. луга на Ачешбокъ. 10. VIII. 99. Бушъ! (*foliis serratis*). Кунская поляна, близъ казеннаго дома для лѣсн. стражи. 15. VI. 99. Бушъ! Субальп. луга въ верховьяхъ р. Бугунча, между г. Маркониджемъ и хребтомъ Магишо. 3. VII. 99. Бушъ! Субальп. луга въ верховьяхъ р. Вьлой. 24. VII. 99. Бушъ! — **A. M.** Мингрелія, гора Мингарія. 1893. Альбовъ. (п. v.). Гора Джвари, альп. луга. 1893. Альбовъ. (п. v.). Хреб. Асхи, альп. луга. № 410. 1893. Альбовъ. (п. v.). Гора Квира, альп. луга. 1980 м. 25. VII. 94. Альб! Тамъ-же, у границы лѣса. 16. VIII. 88. Кзнци! Сванетія, на горѣ Тетенаръ, альп. луга. 2200 м. 1. VIII. 90. Соммье и Левье. (п. v.) На южн. склонѣ хребта Латнаръ. 1800—2000 м. 3 и 4. VIII. 90. Соммье и Левье. (п. v.). Гурхеви. Лойка. (п. v.). Бермамутъ. 8200. 22. VII. 89. Акниф! Осетія, альп. луга. 24. VI. 01. Марковичъ! 4. VII. 99. Марков! Истоки р. Ріона. 7000—9000'. 22. VIII. 64. Радде! Дигорія, субальп. луга по лѣв. берегу Харвеса. 1. VIII. 89. Кзнци! Балкарія по р. Ахсу. VII. 01. Куницкій! Осетія, близъ сел. Сурхъ. 31. VI. 95. Арнольди! (*f. purpurea, laxiflora*) Военно-Осетин. дор., Ходскій горный лугъ. 20. VI. 95. Арнольди! Военно-Осетинск. дор., горныя луга у Мамиссонскаго перевала. 7000—8000'. Десулави! Тамъ-же. 8000'. 9. VII. 97. В. Цингеръ! 10. VII. 97. Марков! Казбекъ. 12. VII. 77. Вдовьевъ! Казбекъ-Коби. 12. VII. 77. Вдовьевъ! Азау. Лойка. (п. v.). Гора Гуть. 6500'. 6. VIII. 44. Коленати! Гудауръ. 25. VII. Акниф! Тамъ-же. 10. VIII. 05. Өом!! Главн. Кавказск. хреб. Крестовый перев. Смирновъ! — **A. O.** Хевсурія, между сел. Шатилъ и уроч. Анатори. 12. VII. 03. Бушъ! Тушетія, субальп. луга

между сс. Парема и переваломъ къ г. Комитосъ-цверн. 16. VII. 03. Бушъ! Между с. Джваръ-босели и г. Самкурисъ-цверн, субальп. березникъ. 23. VII. 03. Бушъ! Дагестанъ, Гунибскій окр., субальп. поясъ между с. Бежита и переваломъ въ Кидеро. 12. VII. 04. Бушъ! Андійскій окр., между Сагада и Куайни, верхняя часть соснов. пояса. 21. VII. 04. Бушъ! Верховья р. Дюльги. 1480—1637. hex. Рупрехтъ. Тамъ-же близъ сел. Башъ-Мухахъ. 29. VII. 60. Оверинъ! Аварскій окр., между станц. Харахи и Матласы. 2. VIII. 04. Бушъ! Дагестанъ, Самурскій окр. въ ущельѣ выше сел. Гедымъ, на скалахъ. 7600'. 15. VIII. 00. Алексѣенко! Тамъ-же, близъ сел. Гедымъ, на подъѣмѣ горы Ерисси (Яруссувъ), на сухихъ лугахъ. 8400'. 18. VIII. 00. Алексѣенко! Самты. 7000'. 15. VII. 94. Пурингъ! Между Курушемъ и Кро. 1872. Беккеръ! Курушъ. 1872. Фаустъ! Самурскій окр., близъ сел. Курушъ, на лугахъ. 7600'. 1. VIII. 98. Алекс! Альп. луга отъ Куруша къ Кро. Беккеръ! — **S. P.** Вдоль р. Чхалты. 2100'. VII. 95. Лобза! Гориболо. 65. Радде! — **S. lb.** Тифлисская губ., верхнее теченіе р. Ляхвы. 8. VIII. 97. Пурингъ! Среднее теченіе р. Ляхвы. 6. VIII. 97. Пурингъ! Озеро Эрцо, субальп. лугъ. 19. VII. 90. Кзнц.! Тамъ-же, по южному склону холмовъ, сухіе луга. 20. VII. 90. Кзнц.! Верховья Черной Арагвы, полоса березы. 5. VII. 90. Кзнц.! Верховья Содеви, субальп. луга. 9. VII. 90. Кзнц.! Кахетія, Телавскій уѣздъ, отроги хребта Циви-тави, гора Самтеріо. 6. VII. 98. Өом.!! — **A. A.** Гурія. Нордманъ! Турецко-Аджарская граница. VIII. 67. Радде! — **X. A.** Гора Шамбобель близъ Ахалцыха. VII. 75. Радде! Эриванск. губ., Ново-Боязетск. у. Дарачичагъ. VI. 99. Мыловъ! Ново-Боязетск. у., Куртинская балка. VI. 99. Мыловъ! — **S. S.-K.** Близъ Манглиса. VIII. 80. Радде! Тамъ-же, верхн. часть восточн. склона Желтой горы. *Herb. Jurjew.*! Ст. Каракисъ Кареск. жел. дор., тѣсь. 3. VII. 00. Кзнц.! Ликани, близъ Боржома. 14. VII. 01. Мищенко! Бакуръяни. 5600'. 7. VII. 88. Акинф.! Тамъ-же. 6000'. 15. VII. 87. Акинф.! 6500'. 8—12. VII. 88. Акинф.! Бакуръяни, въ тѣсу. 14. VII. 01. Мищенко! Тамъ-же. 25. VII. 00. Өом.!! (*fol. serratis*). Боржомъ. VI. 65. Радде! Сомхетія, Гогенаккеръ! Чабанъ-гёль. 5. VII. 72. Ситовскій! Закавказье. Оверинъ! Карабахъ, сел. Герюсы. 26. VI. 95. Ломак.! Тамъ-же, на альп. лугахъ близъ ст. Герюсы. 11. VII. 03. Гриневецкій! Карабагъ. Гогенаккеръ! — Кавказъ. Адамъ!

Примѣч. Отъ *P. amplexicaule* Boiss. отличается главнымъ образомъ конической трубкой чашечки и длинными ланцетными чашелистиками, которые въ 2—3 раза короче вѣнчика и въ $1\frac{1}{2}$ —2 раза длиннѣе трубки чашечки. Стеблевые листья у основанія слегка сердцевидны или закруглены и полуобхватываютъ стебель, рѣже имѣютъ маленький черешекъ. Край листьевъ чаще городчатые, но случается также, что они бываютъ пильчатыми. Форма листьевъ сильно варьируетъ и колеблется между яйцевидной и продолговатой, или даже продолговато-ланцетной. Последняя форма чаще наблюдается у растеній съ очень сухихъ, каменистыхъ мѣсть.

6. *P. canescens* Boiss. canescenti-scabridum interdum glabrescens, caulibus elatis virgatis rigidis vel simplicibus longe spicatis vel stricte ramulosis paniculato-racemosis inferne crebre foliosis, foliis sessilibus crenulatis ab inferioribus cito emarcidis ovatis ad intermedia et superiora oblonga et lanceolata stricta sensim diminutis, floribus axillaribus breviter pedicellatis solitariis vel 2—3-nis, calycis pruinoso-scabri laciniis lanceolatis tubo angulato-sulcato vix longioribus, corolla scabrida pallide violacea ca-

lycis laciniis triplo longiore ad basin fere in laciniis lineares partita, capsula ovata sub apice poris tribus dehiscente. v. s. in herbariis Rossiae australis.

Boiss. Fl. Orient. III. p. 950. (partim).

Syn. *Phytneuma canescens* W. K. Pl. rar. Hungar. p. 12. tab. 14. — A. D. C. Monogr. Camp. p. 205. — D. C. Prodr. p. 455. — M. B. Fl. taur.-cauc. III. p. 149. — Ledeb. II. p. 873. — Шмалъг. II. стр. 172. — Trautv. in A. H. P. VI. p. 50. (partim)

Hab. in siccis Tauriae. — **S. T.-N.** Крымъ. Herb. Kunze (sec. Boiss. l. cit.). Герб. Траутф.

Ar. Geogr. Styria, regio Danubialis, Serbia, Rossia australis!

Примъч. На Кавказъ типичная форма, повидимому, совсѣмъ не встрѣчается и ее замѣняетъ тамъ var. *salicifolium* (A. D. C.) m. Видѣнные мною экземпляры *Pod. canescens* Boiss. изъ южной Россіи отличаются болѣе широкими листьями, угловато-бороздчатой трубкой чашечки и короткими цвѣтоножками. У var. *salicifolium* листья узко-линейно-ланцетные прямо вверхъ направленные и часто прижатые къ стеблю, цвѣты почти сидячіе, а стебли закапчиваются всегда только одной рѣдкой колосовидной цвѣточной кистью.

var. salicifolium (A. DC.) m. foliis crenato-serratis vel serratis *anguste linearilanceolatis confertis erectis*. **Æ.** v. s. in h. M. P. J. Th.

Boiss. Fl. Orient III. p. 950. (sub forma).

Syn. *Podanthum canescens* Ломак. Фл. Караб. стр. 58. — Линск. Фл. К. стр. 380. — *Podanthum salicifolium* Rupr. Bull. de l'Acad. d. Sc. de St. Pétersb. XI. p. 203. — *Phytneuma salicifolium* A. D. C. Monogr. Camp. p. 205. — D. C. Prodr. VII. p. 455. — *Phyt. salignum* Besser, Prim. Fl. Gall. I. p. 368. — Ledeb. II. p. 873.

Hab. in siccis totius Caucasi. — **S. D.-K.** Дагестанъ, Даргинскій окр., близъ Микин. 4400', у скалъ между кустарниками лѣса Берханы-када. 4. VII. 98. Алекеѣнко! — **X. A.** Берегъ оз. Гокчи, Еленовка. 8. VIII. 94. Б. Федченко! Окрестности оз. Гокчи, Дарачичагъ, лѣсъ на горѣ Алибекъ. 27. VII. Теръ-Казаровъ! Въ лѣсу близъ Дарачичага. 30. VII. и 2. VIII. 03. Гриневецкій! Съюкосъ на Алагезъ, Башабаранъ. 3. VIII. Хочиятовскій! Подножіе Алагеза. 23. VII. Хочиятовъ! Алагезъ, ущелье Каранлугъ. 5. VIII. Хочиятовъ! Гора Бугунлу. 10. IX. Хочиятовъ! Юго-восточн. склонъ Алагеза, между можжевельникомъ. 30. VIII. Хочиятовъ! Переваль у г. Кырмызы-дагъ Эриванск. губ. 20. VII. 05. Шелковниковъ! — **S. S.-K.** Караклисъ, ст. Карской жел. дор., лѣсъ 3. VII. 00. Кзыцъ! На поляхъ близъ сел. Бекандъ. VII. 45. Фриккъ! Карабахъ, Базаръ-чай. 7. VII. 95. Ломакъ! Тамъ-же. 18. VII. 03. Гриневецкій! (calyce et corolla pubescentibus). На альп. лугахъ недалеко отъ Базаръ-гечаръ. 22. VII. 03. Гриневъ!

Ar. Geogr. Styria, regio Danubialis, Serbia, Rossia australis?

Примъч. Разновидность эту я видѣлъ только съ Кавказа. Буа ссѣе приводитъ для нее общую область распространенія съ типичной формой.

7. P. lanceolatum Boiss. totum pubescenti-scabridum *pallide virens*, caulibus tenuiter virgatis erectis vel ascendentibus simplicibus parte inferiori striete foliosis in spicam longam laxam abeuntibus, foliis *ascendenti-cartilagineo-denticulatis* vel potius *cartilagineo-serratis acutis basi attenuatis* ab inferioribus subpetiolatis cito evanidis ad superiora sessilia linearia sensim diminutis, floribus 1—3-nis *sessilibus* in fasciculos sessiles vel subpedunculatos strictos ad bracteae breviter linearis axillam sitos dispositis,

calycis scabridi laciniis lanceolatis tubo longiuscule obconico sublongioribus corolla *scabrida triplo brevioribus*, capsula *elliptico-oblonga* valvis prope apicem sitis dehiscente. 2. v. s. in h. Th.

Boiss. Fl. Orient. III. p. 351.

Syn. *Phyteuma lanceolatum* Willd. Spec. I. p. 924. (non Desf. sec. Boiss. l. cit.). — A. D C. Monogr. Camp. p. 204. (partim). — D C. Prodr. VII. p. 454. (partim). — *Rapunculus Orientalis foliis angustis dentatis* Tourn. (Sec Boiss. l. cit.). — *Campanula tauricola* Boiss et Bal. Diagn. Ser. II. 3. p. 116.

Exslcc. Sintenis. Iter Orient. 1894. № 7074!

Hab. in Asia minore; e Caucaso non vidi.

Ar. Geogr. Asia minor!

Примъч. Типичная форма на Кавказъ пока не найдена, но встрѣчается по сосѣдству съ Кавказомъ въ Турецкой Арменіи.

var. rigidum Boiss. folia *glabriuscula anguste linearilanceolata*, spica ob fasciculos infimos longius pedunculatos subracemosa. 2. v. s. in h. P. Tm.

Boiss III. p. 952.

Syn. *Phyteuma rigidum* Willd. Sp. I. p. 925. et herb. fol. I. (sec. Boiss. l. cit.) — A. D C. Monogr. Camp. p. 204. (partim). — D C. Prodr. VII. p. 454. (partim). — *Campanula dracunculifolia* Boiss. in Ky. exs. 1859. (sec. Boiss. l. cit.) — *Phyt. canescens* Trautv. in A. H. P. II, 2. p. 561; VI. 51. (partim). — Radde, Mus. Cauc. II. p. 122.

Hab. in collibus aridis Transcaucasiae australis. — X. A. Карсеская обл., Мелли-бюрь. 31. VII. 86. Масальскій! Арменія, Казикипаранъ. 28. VII. 71. Радде!

Ar. Geogr. Asia minor.

Примъч. Отъ типичной формы отличается болѣе узкими почти голыми и твердыми листьями, усаженными по краю частыми хрищеватыми зубчиками и болѣе интенсивнымъ опушеніемъ чашечки и вѣяника. Найденные Г. И. Радде экземпляры изъ Казикипаранъ, Траутфеттеръ опредѣлилъ, какъ *Ph. canescens* W. K.

8. P. Otites Boiss. brevissime pubescens caulibus elatis tenuiter virgatis *simplicissimis* rarius ramulo auctis inferne parce foliosis in spicam *longissimam tenuem laxam* abeuntibus, foliis radicalibus anguste oblongo-lanceolatis in petiolum brevem attenuatis obtusiusculis subrepandis, caulibus angustissime linearilanceolatis, floribus 2—3 *brevissime pedicellatis* ad axillam bractaeae breviter subulatae fasciculatis, calycis glabri laciniis crassiusculis breviter *triangulari-lanceolatis obtusis* tubo oblongo apice restricto brevioribus corolla minuta glabra 2½-plo brevioribus, capsulis *parvis ovatis* valde sulcatis et costatis transverse rugulosis poris sub apice sitis dehiscens. 2. v. s. in h. P.

Boiss. Fl. Orient. III. p. 952. — Лисск. Фл. К. стр. 380.

Syn. *Phyteuma Otites* Trautv. in A. H. P. VI. p. 49. — *Phyt. limonifolium* Led II. p. 873. (non Sibth.).

Hab. in Transcaucasia austro-occidental. — X. A. Закавказье, у турецкой границы, близъ Ризи Нордманъ!

Ar. Geogr. Asia minor.

9. P. lobelioides Boiss. breviter pubescens vel glabrum, caulibus tenuibus virgatis inferne tantum et parce foliosis simplicibus vel ramosis in

racemos laxos tenues spiciformes abeuntibus, foliis radicalibus anguste lanceolatis rarius oblongis *utrinque attenuatis* petiolatis acutis *repando-dentatis*, dentibus glanduligeris, saepe undulatis, caulinis paucis *angustissime linearibus*, floribus ad bracteae subulatae brevis axillam solitariis vel 2—3-nis altero *saltem pedicellato*, calycis glabri vel asperuli laciniis tubo oblongo *inferne angustato* subbrevioribus corolla violacea subtriplo brevioribus, capsula *ovato-oblonga* poris prope apicem sitis dehiscente. 24. v. v. et s. in h. Th.

Boiss. Fl. Orient. III. p. 953. — Липск. Фл. К. стр. 380.

Syn. *Phyteuma lobelioides* Willd. Phyt. I. № 20, tab. 4, fig. 2. — D C. Prodr. VII. p. 454. — *Phyt. lanceolatum* Desf. Cor. Tourn. p. 34, tab. 24, non Willd. — *Phyt. styloides*, *Phyt. Pestalozzae* et *Phyt. gracile* Boiss. Diagn. Ser. I. 11, p. 73. et 74. — *Campanula Willdenowii* Boiss. Diagn. Ser. II; 3. p. 117.

Hab. in saxosis et graminosis aridis Transcaucasiae australis. — X. A.

Ольты, Каресской области. 23. V. 04. Кёниг! (с. flor.). Хребетъ Карадашъ, близъ Кагызмана на высотъ около 7000'. 5. VI. 04. Михайловскій!

Ar. Geogr. Asia minor.

Примѣч. Мнѣ, къ сожалѣнію, не удалось видѣть экземпляровъ, опредѣленныхъ самимъ Буассье, тѣмъ не менѣе экземпляры Кёнига и Михайловскаго весьма точно подходятъ подъ описаніе этого вида, помѣщеннаго во Flora Orientalis, такъ что я, не колеблясь, отнесъ ихъ къ типичной формѣ этого вида. Всѣ прочіе экземпляры, опредѣленные какъ *P. lobelioides* Boiss., которые мнѣ пришлось видѣть въ гербаріяхъ Импер. Ботан. Сада и Тифл. Ботан. Сада, я отношу къ var. *urceolatum* m., такъ какъ форма трубки чашечки ихъ слишкомъ разнится по описанію съ таковою-же *Pod. lobelioides* Boiss.; кромѣ того и общій habitus этихъ экземпляровъ, благодаря тонкости и укороченности стеблей ихъ, а равно и узкимъ листьямъ, скорѣе приближаетъ ихъ къ *Pod. linifolium* Boiss.

var. urceolatum m. caulibus tenuibus pumilis, foliis radicalibus *anguste lanceolatis* utrinque attenuatis margine denticulatis acutis, calycis glabriusculi vel pubescenti laciniis linearibus tubo calycino *urceolato* apice *constricto* sesquilogioribus. 24. v. s. in h. P. Th.

Syn. *Podanthum lobelioides* Haussknecht, in Herbar.

Exsicc. P. Sintenis Iter Orient. 1894. № 5777!

Hab. in rupestribus Transcaucasiae austro-occidentalis. — X. A. Карская обл., Ольтинскій окр., Косоръ. 9. VII. 03. Кёниг! Кагызманскій окр., верховья р. Ахъ-чай, по скаламъ, очень рѣдко. 6000'. 21. VI. 86. Масальскій! Постъ Промежуточный, на скалахъ по р. Бардусъ-чаю. 18. VI. 04. Михайловскій!

Ar. Geogr. Asia minor!

Примѣч. Трубка чашечки этого варьетета имѣетъ кувшинчатую форму, на верху сжатую и внизу закругленную, въ этомъ случаѣ напоминаетъ такой-же формы трубку чашечки у *Pod. Otites* Boiss. Отъ послѣдняго описываемый варьететъ отличается длинными цвѣтоножками и линейными чашелистиками. Съ другой стороны, судя по описанію, var. *urceolatum* является какъ бы промежуточной между *Pod. lobelioides* Boiss. и *Pod. linifolium* Boiss. Отъ обоихъ этихъ видовъ отличается лишь формой трубки чашечки, такъ какъ у перваго трубка чашечки продолговатая внизу суженная, а у втораго вида трубка чашечки овально-колокольчатая. У *P. lobelioides* трубка чашечки и на верху сужена, у *P. linifolium*, судя по описанію, этого не замѣчается.

Въ Турецко-Персидскомъ гербаріи Тифлискаго Ботан. Сада имѣется эта самая, описываемая мною, форма изъ Турецкой Арменіи; она найдена Синтенисомъ и опредѣлена проф. Гаускнехтомъ какъ *Pod. lobeli-*

oides Boiss. (см. P. Sinenis. Iter Orientale. 1894. № 5777. Armenia turcica. Szandschack Gümischkhane, in saxosis prope pagum Kursul. 6. VI. determ. Prof. C. Haussknecht). Къ этой же самой формѣ принадлежать и экземпляры изъ Карсской обл.: Масальскаго съ верховьевъ р. Ахъ-чай, Кёнига изъ Косора и Михайловскаго съ береговъ р. Бардусъ-чай.

Subord. I. 1. b. Campanuloideae - Campanuleae - Wahlenberginae.

Corolla campanulata rarius infundibuliformis vel profunde partita. Filamenta et antherae plerumque liberae. Stylus pilis collectoribus obsitus vel glandulifer. Ovarium inferum interdum superum, 3—5-, rarius 2-loculare, supra plerumque conico-elongatum, placentis centralibus vel interdum ab apice loculi pendulis vel a fundamento ascendentibus. Fructus capsularis plerumque *valvulis apicalibus intra calycis lobos loculicide dehiscens*, rarius baccatus. Herbae perennes interdum suffrutices.

Schönland, in Engl.-Pr. IV. 5. p. 55.

1. Пыльники свободные, тычиночныя нити внизу расширены, цвѣты средней величины или небольшие — одиночные или собраны въ рѣдкое головчатое соцвѣтіе. . . . *Hedraeanthus* Grisb. (1).
Пыльники внизу сросшіеся, тычиночныя нити внизу не расширены, цвѣты мелкіе многочисленные собраны въ густую верхушечную головку. *Jasione* L. (2).

Gen. 1. *Hedraeanthus* Grisb.

Calyx quinquefidus. Corolla semi- vel ad tertiam partem quinquefida, saepius tubulosa, rarius subcampanulata infundibuliformisve. Stamina quinque, libera, filamentis basi *expansis*. Stylus a basi cylindricus inclusus, stigmata bi-, rarius tripartita, lobis linearibus demum patentibus. Capsula bi- vel trilocularis, omnino infera, hemisphaerica vel ovoidea, *superne intra calycem ibique fragmentis seu valvis irregularibus caducis dehiscens, diu postea persistens, crateriformis* vacua. Semina multa, ovata, compressa, pro ordine majuscula. — Herbae perennes caespitosae, humiles ex parte austro-orientali Europae. Foliis alternis saepius linearibus angustis plerumque cum bracteis et laciniis calycinis margine ciliatis. Floribus sessilibus saepius capitatis, corolla caerulea vel violacea.

Grisb. Spicil. flor. Rumel. p. 292. — Wettst. Monogr. der Gattung *Hedraeanthus* p. 1. — Schönland in Engl.-Pr. Pflanzfam. IV. 5. p. 58. — Syn. *Campanula* Linné pr. p; — aut. pl. — *Wahlenbergiae* Sect. I. *Edrajantha* A. D. C. Monogr. Camp. p. 129. — Benth et Hook. Gen. plant II. 2. p. 556. — *Edrajanthus* D. C. Prodr. VII. p. 449. — Endlich. Gen. plant. p. 516. — Boiss. Fl. Orient. III. p. 886. — *Hedranthus* Rupr. Bull. de l'Acad. d. Sc. de St. Pétersb. XI, p. 203.

Species 11 Europae austro-orientalis incolae.

Примѣч. Изъ 11 видовъ рода *Hedraeanthus* на Кавказѣ имѣется всего одинъ только видъ, остальные 10 видовъ сосредоточены на югѣ Европы — на Балканскомъ и Аппенинскомъ полуостровахъ. Большинство видовъ этого рода является представителями высокогорной альпійской флоры. Кавказскій представитель этого рода является обитателемъ средней полосы горъ, такъ какъ распространенъ въ полосѣ отъ 2400—5000' надъ ур. моря.

Родъ *Hedraeanthus* стоитъ такъ близко къ троническому роду *Wahlenbergia*, что раньше разсматривался только какъ особая его секція. Вслѣдствіе близкаго родства двухъ этихъ родовъ представители рода *Wahlenbergia*, приспособившіеся къ условіямъ горнаго климата, могутъ считаться предками пынѣвшихъ видовъ рода *Hedraeanthus*. Этотъ послѣдній родъ въ третичную эпоху, повидимому, имѣлъ болѣе широкое географическое распространеніе и разрозненность его теперешнихъ ареаловъ распространенія можетъ быть объяснена только измѣнившейся въ тѣмъ конфигураціей материковъ.

Веттштейнъ въ своей монографіи рода *Hedraeanthus* (l. cit.) даетъ картину образованія его видовъ на Балканскомъ и Аппенинскомъ полуостровахъ подъ вліяніемъ наступившаго вслѣдъ за ледниковымъ періодомъ теплаго климата, заставившаго представителей рода *Hedraeanthus* отступать постепенно въ горы, причемъ при отодвиганіи видовъ *Hedraeanthus* на скаты и вершины горъ вскорѣ возникли опредѣленные, особые для разныхъ видовъ линіи высотъ, до которыхъ произошло отодвиганіе. Поэтому на всѣхъ горахъ, которыя оказались ниже низжайшей изъ этихъ зонъ, виды *Hedraeanthus* должны были совершенно вымирать и такимъ образомъ большинство видовъ оказалось альпійскими растеніями. Небольшое число видовъ оказываются, однако, обитателями мѣстностей холмистыхъ съ узкой вертикальной зоной распространенія. Виды, принадлежащіе къ этой категоріи, имѣютъ болѣе широкое географическое распространеніе. Давая такое весьма правдоподобное объясненіе происхожденію и распространенію видовъ на Балканскомъ и Аппенинскомъ полуостровахъ, Веттштейнъ ничего не говоритъ о томъ, почему Кавказъ такъ бѣденъ въ отношеніи представителей рода *Hedraeanthus*. Причина подобнаго явленія, на мой взглядъ, заключается въ томъ, что на Балканскомъ и Аппенинскомъ полуостровахъ развитіе ледниковаго покрова было незначительнымъ, что дало возможность уцѣлѣть большому количеству представителей рода *Hedraeanthus*, тогда какъ на Кавказѣ ледниковый покровъ былъ могущественнѣе и большая часть предковъ рода *Hedraeanthus* была уничтожена, да и не могла ужиться въ условіяхъ слишкомъ холоднаго климата; тѣ-же, вѣроятно, немногіе представители, которые пережили эту эпоху, уцѣлѣли въ мѣстности наименѣе подвергавшейся оледѣненію, т. е. въ данномъ случаѣ въ восточной части Главнаго хребта.

*1. *H. Owerinianus* Rupr. dense caespitosus e rhizomate indurato cauliculis brevibus inferne foliis vetustis vestitis rosula minuta foliorum vigentium terminatis, foliis *rigidis minimis* brevibus *linearibus obtusis nitidis* oculo armato parenchymatosis, supra planis subtus nervo prominente bisulcatis subrevolutis basi margine retrorsum ciliatulis, floribus *minutis solitariis* in apicibus rosularum sessilibus, calycis glabri laciniis demum patentibus lanceolato-linearibus acutiuseculis foliaceis tubo calycis (fructiferi) longinseculi obconico aequilongis, *sinibus* breviter et acute *appendiculatis* corolla *tubulosa* glabra laciniis calycis $2\frac{1}{2}$ -plo longiore, capsula prismatico-trigona, seminibus ellipticis turgidis fuscis apice utroque nigricantibus. 4. v. s. in h. P. Th.

Rupr. Bull. de l'Acad. de Sc. de St. Pétersb. XI. p. 203. — Trautv. in A. H. P. VI. p. 45. — Wettst Monogr. der Gattung *Hedraeanthus* p. 6.

Syn. *Edraianthus Owerinianus* Boiss. III. p. 886. — Липск. Фл. К. стр. 376.

Icon. v. in h. P.!

Hab. in fissuris rupium calcarearum Daghestaniae 2400—5000'. — **X. D.** Сѣверн. Дагестанъ, Койсеубу, ниже г. Эрнели. V. Оверинъ! По южному склону Салатау по дорогѣ на сѣрный заводъ изъ Чиркаты. 24. V. 89. Кзнц.! Дагестанъ, Аварскій окр., у лѣв. берега р. Койсеу ниже сел.

Гимры, на скалахъ сѣверо-восточнаго склона горы Мухита. 2400'. 25.V. 01. Алексѣенко!

Примѣч. Растеніе образуетъ на скалахъ густыя дерновинки, представляя собою сплоченныя подушечко-образныя образования, напоминающія собою по *habitus*'у какой-либо видъ *Draba* или *Dionysia*. Корневище утолщенное, по ни въ коемъ случаѣ не деревянистое, наверху развѣтвляется въ большое количество короткихъ стеблей, заканчивающихся маленькой розеткой листьевъ. Нижняя часть стеблей и развѣтвленія корневища густо покрыты бѣлыми отмершими листьями. Короткіе и линейные листочки блестящіе и кожистые загнуты внизъ и напоминаютъ по своей консистенціи листья *Campanula Dzaaku* Alb. Наружный эпидермальный покровъ ихъ состоитъ изъ прозрачныхъ вздутыхъ клѣточекъ такой-же точно конструкціи какъ и у листьевъ *C. Dzaaku* Alb. По одиночнымъ цвѣткамъ, заканчивающимъ стебель, видъ этотъ относится къ секціи *Uniflora* Ветштейна. *Habitus*'омъ напоминаетъ *H. pumilio* Port., но рѣзко отличается отъ него, какъ травянистой консистенціей своихъ стеблей и не деревянистымъ корневищемъ, такъ равно и формой листьевъ, отсутствіемъ на нихъ опушенія, присутствіемъ придатковъ чашечки и маленькими цвѣтками.

Gen. 2. Jasionе L.

Calyx quinquefidus. Corolla profunde quinquepartita laciniis linearilanceolatis. Stamina a corolla libera, filamentis brevibus *non dilatatis*; antherae basi breviter connatae superne liberae. Stylus a media parte superne pilosus, stigmata 2. Ovarium biloculare inferum, placentis stipitatis pauciovulatis. Capsula bilocularis sphaeroidea vel ovata intra calyceem foramine lato valvis brevissimis dehiscens. Herbae monocarpicae vel perennes graciles floribus capitatis.

L. Hort. Cliff. p. 426, gen. n. 1005. — A. D. C. Monogr. Camp. p. 101. — D. C. Prodr. VII. p. 415. — Endl. Gen. p. 512. — Benth. et Hook. II. 2. p. 554. — Ledeb. II. p. 869. — Boiss. III. p. 885. — Шмальг. II. стр. 171. — Schönland, in Engl.-Pr. IV. 5. p. 59.

Слн. *Ozilla* Adans. Fam. nat. 2. p. 134.

Species ad 6 Europae mediae et australis regionisque Mediterraneae incolae.

Примѣч. Описано около 11 видовъ, изъ которыхъ за самостоятельныя могутъ быть приняты только 6 видовъ. Изъ нихъ на Кавказѣ встрѣчается *J. montana* L. var. *dentata* D. C., имѣющая широкое распространеніе въ южной Европѣ, сѣверной Африкѣ и Малой Азіи. Формы рода *Jasionе* очень мало изучены и требуютъ общей критической переработки.

1. *J. montana* L. biennis pilis albis plus minus hispida, caulibus parte inferiori foliosis simplicibus vel parce ramosis, foliis sessilibus linearibus obtusis undulatis, pedunculis elongatis nudis, bracteis ovatis vel ovato-obciculatis acuminatis *crenatis* vel *integr*is capitulo *brevioribus*, pedicellis calyci *subaequilongis*, calycis laciniis subulatis acutis tubo sesquialongioribus corollam dimidiam subaequantibus. ☺. v. v. et s. in herbariis Rossiae.

L. Sp. 1317. — A. D. C. Monogr. Camp. p. 101. — D. C. Prodr. VII. p. 415. — Ledeb. II. p. 870. — Boiss. III. p. 885. — Trautv. in A. H. P. VI. p. 44. — Шмальг. II. стр. 171.

Ехsic. vidi in herbariis Rossiae.

Icon. Ic. Fl. Dan. 319. — Rehb. Icon. Fl. Germ. tab. 217!

Ar. Geogr. Europa omnis a Britannia et Scandinavia ad Rossiam mediam!

Примѣч. Типичная форма этого вида на Кавказѣ отсутствуетъ.

var. dentata A. DC. caulibus crebrius foliosis, bracteis utrinque lobis 1—4 *spinuloso-dentatis*, calycis laciniis *rigidis* aristatis tubo 2—3-plo longioribus ☉. v. s. in herbariis Europaeis.

D C. Prodr. VII. p. 415. — Boiss. III. p. 885. — Trautv. in A. H. P. VI. p. 44.

Syn. *J. Heldreichii* Boiss. Diagn. Ser. II. 6. p. 120. — *J. montana* Lipsky, Фл. К. стр. 376.

Exslcc. C. Baenitz. Herb. Europ. sub *J. Heldreichii* Boiss. Bulgaria, legit V. Střibný.

Hab. in siccis regionis montanae Transcaucasiae austro-occidentalis. — **X. A.** У турецкой границы, близъ Ризи. Нордманнъ (in herbario Ledebouri) (n. v.).

Ar Geogr. Europa australis, Graecia, Bulgaria, Africa borealis.

Примѣч. Буассье и Траутфеттеръ приводятъ эту разновидность для Кавказа, указывая на экземпляры, хранящіеся въ гербаріи Ледебуръ, принадлежащемъ Импер. Ботан. Саду. Мнѣ этихъ экземпляровъ видѣть не удалось. Въ гербаріяхъ Тифл. Ботан. Сада я видѣлъ экземпляры *J. Heldreichii* Boissier, который приравненъ Буассье къ *J. montana* L. var. *dentata* D C. На мой взглядъ эти экземпляры такъ сильно разнятся отъ *J. montana* L. длинными цвѣтоножками, продолговатыми игольчато-зубчатыми прицвѣтниками, что var. *dentata* D C. или *J. Heldreichii* Boiss. слѣдовало бы считать за самостоятельный видъ. Незначительный матеріалъ по роду *Jasione*, имѣвшійся въ моихъ рукахъ, не позволилъ мнѣ болѣе критически отнестись къ вышеупомянутымъ формамъ и прослѣдить ихъ родство съ другими формами.

Addenda et corrigenda.

Pag. 3. **Bryonia dioica**, adde: v. s. in h. M.

S. T. Терская обл., Садонское ущелье. 21.VII. Арнольди! — **X. A.** Окрестности оз. Гокчи, Ераносъ. 4. VII. Теръ-Казаровъ! Исти-су, верхній Арпа-чай въ Даралагезъ. 28. VII. 05. Шелковниковъ! — **S. D.-K.** Даргинскій окр., между сел. Ходжалъ-махи и Куппинскимъ переваломъ. 25. VI. 04. Бушъ!

Pag. 4. **Bryonia alba**, adde: v. s. in h. S. M.

S. T.-N. Крымъ, Севастополь. $\frac{2}{2}$. IX. 95. М. Федосѣевъ! Симферополь, бульваръ. 3. VI. 97. Андреевъ! — **S. K.** Кубанск. обл., Усть-Лаба. VII. Полторацкій! — **S. T.** У р. Ольховки близъ Кисловодска. 27. VIII. 66. Байернъ! — **S. S.-K.** Въ лѣсахъ близъ р. Ганджа-чай. 10. VI. 44. Коленати!

Pag. 5. **Ecballium elaterium**, adde: v. s. in h. S.

St. A. По обрывистымъ берегамъ Азовскаго моря на Таманскомъ полуостровѣ. 19.VIII. Полторацкій! — **S. Ib.** Тифлисъ, открытыя мѣста. 29. VI. 03. Сележинскій!

Pag. 6. Post gen. 2. *Ecballium* insere:

Gen. 3. Cucumis L.

Flores monoici, rarius dioici, saepius fasciculati, faemini solitarii. Calycis tubus campanulatus vel urceolatus fundo non squamatus, limbus 5-lobus. Corolla rotata vel campanulata ultra medium 5-partita segmentis oblongo-ovatis acutis. *Mascul.* Stamina 3 libera filamentis brevibus, antherae oblongae altera unilocularis caeterae biloculares oculis plus minus flexuosis, connectivo supra loculos in appendicem papillosam producto. *Fem.* Staminum rudimenta nulla. Ovarium ovatum placentis tribus, stylus brevis, stigmata 3 obtusa, ovula numerosa horizontalia. Fructus carnosus subindehiscens polyspermus seminibus compressis. — Herbae scandentes vel humifusae cirrhis simplicibus, floribus luteis.

Cucumis L. Gen. 1092. — DC. Prodr. III. p. 300 — Endlich. Gen. p. 938. — Benth. et Hook. Gen. pl. I p. 826. — Ledeb. II. p.

142. — Boiss. II. p. 758. — Cogniaux, in Monogr. phan. III. p. 480. — Syn. *Cucumis* et *Melo* Tourn. Inst. p. 104, tab. 31, 32. (1700); Adans. Fam. 2, p. 138. — *Rigocarpus* Neck Elem. 1. p. 238. (1790).

Species ad 26 Asiae australis et Africa tropicae incolae.

1. **C. Melo** L. gracilis setoso-hispidus cirriferus, cirrhis simplicibus, caulibus et petiolis foliorum setoso-hispidis, foliis longe petiolatis basi cordata 5—7 rotundato-angulatis supra setis minimis e tuberculo ortis obsitis, subtus *tuberculatis* ad nervos *setis hispidis obsitis*, floribus masculis fasciculatis, faemineis saepius solitariis, fructu parvo ovato-ellipsoideo ad 5 cm. longo ad 3 cm. lato tenuiter *pubescente* vel. interdum laevi longitudinaliter *vittato*. ☉. v. v. et s. in h. Th.

L. Sp. 1436. — DC. Prodr. III. p. 300. — Stev. in Mém. de la Soc. des Natur. de Mosc. VI. 70. — M. B. Fl. taur.-cauc. III. p. 624. — Hohenack. Enum. Elisabethpol. p. 249. — Ledeb. II, 142. — Шмалъг. I. стр. 377.

Hab. in Transcaucasia orientali in cultis ubique ad margines agrorum. — **St. Tr.** Елисаветпольская губ. Гогенаккеръ. У нижняго теченія р. Куры, Шеки. Стевень. Геокъ-тапа, на поляхъ и въ ихъ окрестностяхъ. 12. IX. 02. Шелковниковъ! (с. fruct.).

Примъч. *C. Melo* L. въ дикомъ состояннѣ, повидимому, часто встрѣчается въ степяхъ восточнаго Закавказья, избирая для своего произрастанія воздѣланныя поля и ближайшія окрестности ихъ. Форма эта некультурная, даетъ несъѣдобные плоды. Въ молодомъ состояннѣ плоды пушистые, въ зрѣломъ состояннѣ они почти голые. По свидѣтельству С. И. Михайловскаго дикая дыня встрѣчается и въ Муганской степи. Изъ сѣмянъ, доставленныхъ А. В. Шелковниковымъ, это растеніе выведено и въ Тифлисскомъ Ботанич. Саду.

Pag. 19. *Campanula crispa*, adde:

S. S.-K. Между Ликанами и Ацхуромъ. 25. V. 03. Өом.!!

Pag. 20. *C. longestyla*, adde: v. s. in h. M.

S. P. Сухумъ Прянишниковъ! — **A. O.** Дагестанъ, Андійскій окр. между Кодорскимъ переваломъ и с. Хупро, субальп. поясъ. 18. VII. 04. Бушъ!

Pag. 22—23. *C. sibirica*, adde: v. s. in h. M.

S. T. Терекая обл., Ходскій лугъ. 21. VI. Арнольди!

Pag. 23. f. *elatio*, adde: v. s. in h. M.

St. A. Кубанск. обл., по степямъ рѣдко, ст. Ахтари, известково-ракушечная порода. 20. VI. 84. Полторацкій! — **S. T.** Сѣверн. Кавказъ. 1877. Вдовьевъ! Стодеревка. 23. V. 77. Вдовьевъ! Алагиръ, каменноломка. 17. VII. 95. Арнольди!

Pag. 24—25. var. *divergens*, adde: v. s. in h. M.

S. T.-N. Крымъ, лѣсъ между Тама и Малбой. 19. V. 05. Бушъ! Между Демерджи и Анчарскимъ переваломъ. 27. V. 05. Бушъ! Между с. Мангушъ и Бахчисараемъ. 2. VI. 05. Бушъ! — **S. T.** Бештау, Гогенаккеръ! Кисловодскъ. 10. VI. 03. Бородинъ! Ходское ущелье. 20. VII. 95. Арнольди!

N. Kusnezow, N. Busch, A. Fomin.

Flora caucasica critica.

Fasc. 15.

Addenda et corrigenda.

Campanulatae: conclusion.

Index nominum et synonymorum
A. Fomin.

Vol. 4, pt. 6.

Sig. 10.

Jurjew.
1907.

Pag. 26. **var. Hohenackeri**, adde: v. s. in h. M.

X. D. Дагестанъ, Гунибскій окр., Верхній Гунибъ (путь изъ Гуниба къ вершинѣ Маяка) 5. VIII. 04. Бушъ! Андійскій окр. между сс. Аквари и Саситль. 3. VII. 04. Бушъ! — **S. D.-K.** Дагестанъ, Темиръ-Ханъ-Шуринскій окр., между Большимъ Дженгутаемъ и ст. Кизыль-яръ, скалы. 24. VI. 04. Бушъ! — **X. A.** Окрестн. оз. Гокчи, Азги-биръ, по холмамъ. 30. VI. Теръ-Казаровъ! Кареская обл., Ольты. 19. V. 04. Кёнигъ! Сел. Бардусъ, Ольтинскаго окр., Кареской обл. 17—19. VI. 04. Михайловскій! Постъ Промежуточный, недалеко отъ Бардуса, Ольтинск. окр., Кареск. обл. 18. VI. 04. Михайловскій! Хребетъ Карадашъ близъ Кагызмана, по скаламъ. 5. VI. 04. Михайловскій! Гора Куртлю у Кагызмана, на сухихъ, скалистыхъ мѣстахъ. 6000—6500'. 3. VI. 04. Михайловскій!

Pag. 27. **f. parviflora**, adde: v. s. in h. M.

S. T.-N. Крымъ, Успенскій монаст. близъ Бахчисарая. 6. VI. 05. Бушъ! Южный склонъ у Малбая. 19. V. 05. Бушъ! Сѣв. склонъ Тепе-Кермень, склоны известковые, обращенные на S.-W. 6. VI. 05. Бушъ! — **S. T.** Чечня, озеро Эзенъ-амъ, субальп. поясъ. 6500'. 29. VII. 04. Бушъ! — **X. D.** Дагестанъ, Андійскій окр., переваль къ озеру Эзенъ-амъ, альп. поясъ. 29. VII. 04. Бушъ! Андійск. окр., между Ботлихомъ и с. Исахли, ущелье Андійскаго Койсу. 2. VII. 04. Бушъ! Андійск. окр., между с. Куайни и Хваршинскимъ мостомъ. 21. VII. 04. Бушъ! — **S. D.-K.** Окрестности Темиръ-Ханъ-Шуры. 20. VI. 88. Анисимовъ!

Pag. 29. **C. daghestanica**, adde:

X. D. Гунибскій окр., между станціями Салты и Карадахъ. 26. VI. 04. Бушъ! Аварскій окр., между станціями Карадахъ и Тахада. 26. VI. 04. Бушъ!

Pag. 30. **C. imeretina**, adde:

S. Ib. Кахетія, бл. Лагодехъ, на каменникѣ. 20. V. 02. Ю. Млокосѣв!

Pag. 32. **C. propinqua**, adde:

X. A. Долина р. Бардусъ-чай, близъ поста Ахъ-Килиса, Ольтинск. окр., Кареской обл., 21. VI. 04. Михайловскій!

Pag. 33—34. **C. allariaefolia**, adde:

S. T. По р. Тереку, Военно-Грузинск. дор. VII. 77. Вдовъевъ! Чечня, озеро Эзенъ-амъ, субальп. поясъ. 6500'. 29. VII. 04. Бушъ! Ходское ущелье. 20. VII. 95. Арнольд! Военно-Осетинск. дор. 16. VI. 95. Арнольд! — **X. D.** Дагестанъ, Аварск. окр., гора между сел. Карадъ и Салта, по дорогѣ въ Хунзахъ. 3. VII. 88. Герб. Москов. Унив.! — **S. D.-K.** Темиръ-Ханъ-Шуринскій окр., между Большимъ Дженгутаемъ и ст. Кизыль-яръ, скалы. 24. VI. 04. Бушъ! — **S. P.** Новъый Афонъ на Сомато, по обрывамъ. VI. 88. Ивановъ! Артвинъ, Батумск. обл., скалы. 2—9. VII. 04. Михайловскій! — **S. Ib.** Ст. Млеты Военно-Груз. дор., на скалахъ. 2. VII. 03. Сележинскій! Монаст. Св. Антонія въ 20 верст. отъ Тифлиса. 29. VII. 03. Роопъ! Тифлисъ, ущ.

р. Веры. 25. VIII. 71. Ситовскій! — **S. S.-K.** Ст. Сананнъ, Карсск. жел. дор. 19. VI. 03. Роопъ! — Кавказъ. 1877. Віаль!

Pag. 35—37. **C. sarmatica**, adde:

S. T. Чечня, между ауломъ Хой и границей Андійскаго округа, субальп. луга. 29. VII. 04. Бушъ! — **X. D.** Гунибек. окр., Верхній Гунибъ, подъемъ на вершину Маякъ. 5. VIII. 04. Бушъ! Аварск. окр. между станціями Харахи и Матласы. 2. VIII. 04. Бушъ! Аварск. окр., гора между сел. Карадъ и Салта, по дорогѣ въ Хунзахъ. 3. VII. 88. Герб. Москов. Универ. Гунибек. окр., между станціями Карадагъ и Тахада. 26. VI. 04. Бушъ! — **A. M.** Военно-Груз. дор., между Коби и Гудауромъ. 1877. Вдовьевъ! — **A. O.** Дагестанъ, Андійскій окр., между Хуштада и Конада. 24. VII. 04. Бушъ!

Pag. 39. **C. collina**, adde:

X. D. Дагестанъ, Андійскій окр., переваль изъ Ботлиха къ озеру Эзенъ-амъ, альп. поясъ. 29. VII. 04. Бушъ! — **S. D.-K.** Даргинскій окр., между сс. Урма и Леваши. 25. VI. 04. Бушъ! — **A. O.** Андійскій окр., между г. Дигрелихъ и переваломъ Ниникось-цихе. 13. VII. 04. Бушъ! Андійск. окр., альп. ковры перевала между Китури и Кидеро. 10. VII. 04. Бушъ! Андійск. окр., скалы въ ущельѣ Иланъ-Хеви, выше сел. Шантль. 9. VII. 04. Бушъ! Андійск. окр., между сс. Саситль и Аквари, альп. ковры и осыпи. 3. VII. 04. Бушъ! Андійск. окр., между Тинды и Ангыда, переваль. 23. VII. 04. Бушъ!

Pag. 46. **C. ciliata**, adde:

S. T. Пятигорскъ. Жмакина! — **A. W.** Верховья Кубани, Учкунанъ, альп. луга до 10000'. VI. 00. Десулави! — **A. M.** Балкарія, Ахъ-су-баши, по сухимъ каменистымъ склонамъ до 10000'. VII. 01. Десул!

Pag. 48. **C. tridentata**, adde:

A. M. По дорогѣ на Бермамутъ. Жмакина! — **A. W.** Сѣв.-зап. склоны горы Оштенъ. 20—25. VII. 98. Шапошниковъ! Кубанск. обл., Мрзакау. 4. VI. 02. Шапошниковъ! — **A. O.** Андійск. окр., верховья р. Хваршники (Богосекскій хреб.), близъ ледника, альп. ковры. 7. VII. 04. Бушъ! Андійск. окр., альп. ковры перевала между Китури и Кидеро. 10. VII. 04. Бушъ!

Pag. 50. **var. barbata**, adde:

S. P. Гора Текма, Артинскаго окр., Батумской области, на высотѣ около 9000'. 26. VI. 04. Михайловскій! Гора Квахидъ, Артинскаго окр., Батумск. обл. 5—6. VII. 04. Михайловскій!

Pag. 51. **var. gracilis**, adde:

X. A. Гора Дикъ-Пиляканъ. 11400'. 23. VII. 05. Шелковн!

Pag. 55. **C. saxifraga**, adde:

S. T. Бештау, на самой вершинѣ, въ щеляхъ глинистаго известняка и кварцеваго порфира. 5400'. 3. VI. 97. Жмакина!

Pag. 57. **C. Aucheri**, adde:

A. O. Хевсурія, субальп. луга по р. Аргуну. 16. VI. 03. Сележнинскій! Дагестанъ, Андійскій окр., Кодорскій переваль, альп. поясъ 17. VII. 04. Бушъ! — **X. A.** Гора Дикъ-Пиляканъ. 11400'. 23. VII. 05. Шелковниковъ! — **S. S.-K.** Хреб. Дамуридагъ, Зангезурск. уѣзда, Елисаветпольск. губ. 2. VII. 03. **Herb. Jurjew.**! Зангезурск. у., Елисаветпольск. губ., Кіамайданлу. 18. VII. 03. **Herb. Jurjew.**!

Pag. 61. **C. argunensis**, adde:

A. M. Дигорія, с. Дзіннага. 15. VI. 03. Рискинъ! — **A. O.** Андійск. окр., альп. ковры верховьевъ р. Хваршинки (Богосскій хреб.), близъ ледниковъ. 7. VII. 04. Бушъ! Андійск. окр., альп. ковры перевала между Китури и Кидеро. 10. VII. 04. Бушъ! Андійск. окр., альп. ковры между сс. Шантль и переваломъ къ сел. Хонокъ. VII. 04. Бушъ! — **S. Ib.** Гора Бѣлуртъ, Горійск. у., Тифлисс. губ. 23. VII. 00. Гораниъ!

Pag. 65. **C. bellidifolia**, adde:

A. M. Близъ Мамиссона. Мечъ!

Pag. 67. **C. ardonensis**, adde:

A. M. По скаламъ около Дейкаукаго рудника въ ущельѣ Архона. 17. VI. 98. Мечъ! Садонъ. 10. V. 02. Рискинъ!

Pag. 68. **C. hypopolia**, adde:

A. M. На второй веретѣ отъ Гудаура къ Коби, около тоннеля, на скалахъ. 10. VIII. 05. Оом.!! (с. flor.)

Pag. 69. **C. petrophila**, adde:

A. O. Андійскій окр., скалы въ ущельѣ Планъ-хевн, выше сел. Шантль. 9. VII. 04. Бушъ! Андійск. окр., между г. Дижелиха и переваломъ Ниникось-цихе. 13. VII. 04. Бушъ! Альп. ковры и скалы на перевалѣ Ниникось-цихе. 13. VII. 04. Бушъ! Андійск. окр., субальп. поясъ между Кодорскимъ перев. и сел. Хупро. 18. VII. 04. Бушъ!

Pag. 76. Post **C. Raddeana** insere:

C. betulaefolia C. Koch nitida glabra vel sub lente minute et parce puberula, caulibus a collo plurimis cespitosis erectis vel horizontalibus fragilibus pumilis foliosis flexuosis superne divaricatim breviter et corymbose ramulosis, ramulis 1—3-floris, foliis *subcarnosulo-rigidis* radicalibus et inferioribus *ovatis cuneatis argute denticulatis* longe petiolatis superioribus subsessilibus rameis minutis oblongo-lanceolatis, pedicellis erectis calyce brevioribus, calycis puberuli tubo brevissimo laciniis et appendicibus *lanceolatis acutissimis* illis corolla *anguste campanulata*, puberula triplo brevioribus, hisce dimidio brevioribus sed tubum excedentibus. 24. v. s. in h. Th. J.

C. Koch, Linn. XXII. p. 635. — Boiss. III. p. 909.

Syn. *C. denticulata* Boiss. et Huet, Diagn. Ser. II. 3. p. 107.

Exslcc. P. Sintenis: Iter Orient. 1894. № 7080!

Hab. in fissuris rupium Transcaesiae austro-occidentalis. — **X. A.**

На полдорогѣ отъ Ардануча въ Артвинѣ, скалы около 2000—3000'. VI. 04. Михайловскій!

Ar. Geogr. Asia minor!

Pag. 82—83. **C. latifolia**, adde:

S. Т. Пятигорскъ. Жмакина! (tubo calyc. glabr.) Алагирь, дубнякъ. 23. VII. 02. Рискинъ! (tubo calyc. glabr.) — **А. О.** Дагестанъ, Андійск. окр., субальп. поясъ между Кодорскимъ переваломъ и Хупро. 18. VII. 04. Бушъ! — **Х. А.** Сатанакъ, сѣв. склопъ. 11. VII. 05. Шелковниковъ! — **S. lb.** Кахетія, Тохота. 29. VII. 93. Млокосѣвичъ! (tub. calyc. glabr.).

Pag. 86—91. **C. rapunculoides**, adde:

S. Т. Кисловодскъ. Алликъ! Бештау. Жмакина! — **А. М.** Дигорія, Урухское ущелье. 13. VIII. 02. Рискинъ! — **S. Р.** На холмахъ близъ сел. Юрьевское. 9. VI. 01. Вороновъ! Кутаисъ, по берегу р. Ріона. 27. VIII. 05. Роопъ! — **S. lb.** Гора Алхашендъ, Горійскаго уѣзда, Тифлисской губ. 22. VIII. 00. Горинъ! Бакинск. губ., Гёкчайскій уѣздъ, южный склонъ Главнаго хребта, верховья р. Гёкчая, уроч. Мишнечоу. 1700 м. 30. VIII. 03. Разевичъ! — **Х. А.** Окрестности сел. Кушибелякъ, Даралагезскаго участ. 29. VII. 05. Шелковниковъ! Сел. Зодъ, Эриванской губ. 17. VII. 05. Шелковниковъ! (∞ *trachelioides* D C.).

Pag. 92—93. **var. trachelioides**, adde:

S. Т. Бештау и Пятигорскъ. Жмакина! Кисловодскъ. Алликъ! Близъ Владикавказа. VIII. 00. Н. Зейдлицъ! — **Х. А.** Окрестн. оз. Гокчи, Калакентъ — Гёокъ-дара. 10. VII. 05. Шелковниковъ! Наюго-востокъ отъ оз. Гокчи, Каравансарай-дара. 12. VII. 05. Шелковниковъ!

Pag. 94. **var. cordifolia**, adde:

S. S.-K. Боржомъ, ущелье Минеральныхъ водъ. VII. 01. Мольденгауеръ!

Pag. 96—97. **C. bononiensis**, adde:

S. Т. Пятигорскъ. Жмакина! Бештау. Жмакина! (foliis subtus canescentibus). — **S. lb.** Кахетія, Лагодехи. 6. X. 93. Млокосѣвичъ! (foliis subtus canescentibus). — **Х. А.** Сел. Кушибелякъ, Даралагезскаго участка. 29. VII. 05. Шелковниковъ! (fol. subtus canescentibus).

Pag. 101—102. **C. glomerata**, adde:

S. Т. Алагирь, Терской обл., дубнякъ. 1. VII. 02. Рискинъ! — Ардонское ущелье. 1. VII. 03. Рискинъ! — **А. М.** Дигорія, окрестн. сел. Фасналь. VII. 03. Рискинъ! — **S. S.-K.** Въ горахъ бл. Елисаветполя, альп. луга. 1800 м. 8. VII. 02. Кроненбургъ!

Pag. 103. **var. oblongata**, adde: v. s. in h. J.

S. К. Въ лѣсистой мѣстности долины р. Теберды, Кубанск. обл., Баталпашин. отд., рѣдко. 4200'. 6. VII. Атманскихъ!

Pag. 105. **var. hispida**, adde:

S. Т. Кисловодскъ. 1894. Алликъ! Пятигорскъ и Бештау. Жмак.!

Pag. 106. **var. cervicarioides**, adde :

X. А. Каменистыя розсыпи у оз. Алагель, Елисаветпольск. губ. 24. VII. 05. Шелковниковъ! Сел. Кушибелякъ, Шаруро-Даралагезск. уч. 29. VII. 05. Шелковниковъ!

ibidem, **var. caucasica**, adde: v. s. in h. J.

А. М. Балкарія, горные луга. 8000'. VII. 01. Десулави!

Pag. 108. **C. Rapunculus**, adde :

Кавказъ. Нордманнъ! — **S. Т.-N.** Крымъ. Оедосѣевъ!

Pag. 110—111. **C. lactiflora**, adde :

S. Ib. Горійск. уѣздъ, Тифлисской губ., южные склоны горы Бѣлурта. 23. VII. 00. Горанинъ! Закатальскій окр., субальп. поясъ. 7. VII. 99. Сележинская!

Pag. 113. **C. persicifolia**, adde: v. s. in h. J.

S. Т. По дорогѣ изъ Кисловодска на Бермамутъ. Эшкаконекая балка. Жмакина!

Post **C. persicifolia** insere :

C. Beauverdiana Fomin glabra vel minute hirta, rhizomate tenui repente candiculos subterraneos edente, caulibus gracilibus erectis vel ascendentibus unifloris vel 2—3-floris, foliis membranaceo-marginatis, inferioribus late-ovatis vel oblongo-ovatis in petiolum tenuem attenuatis margine obtuse crenatis, caulibus sessilibus lanceolatis vel saepius linearilanceolatis acutis margine remote denticulatis, denticulis glanduligeris, summis linearibus acuminatis, basi subtus tuberculo spongioso adnatis, floribus longiuscule pedunculatis, calycis laciniis anguste lanceolatis acuminatis tubo anguste obconico cellulis inflatis spongiosis albis obsito $1\frac{1}{2}$ -plo vel subduplo longioribus corolla azurea glabra campanulata ad tertiam partem fissa laciniis calycinis duplo vel $2\frac{1}{2}$ -plo longiore, stylo coerulesco ad medium fisso incluso. 24. v. v. et s. in h. Th. J.

Fomin, in Moniteur du Jard. Bot. de Tiflis. Livr. 1, pag. 12.

Exslcc. P. Sinentis. Iter. Orient. 1894. № 5647 Armenia ture. Kirkpauli. 28. V. determ. Prof. C. Haussknecht sub **C. Steveni** M. B. (partim)!

Icon. Fom. l. cit. tab. I.

Наб. in montosis et in pratis siccis regionis montanae Transcaucasiae, 2500—10000'. — **S. Ib.** Мухеть. Липскій! Тамъ-же. 27. IV. 03. Родионовъ! — **X. А.** Еленовка. 8. VII. 94. Б. Федченко! Ольты, Карсск. обл. 19. V. 04. Кёнигъ! Станція Кетакъ по дорогѣ изъ Карса въ Кагызманъ, на скалахъ между кустарниками на высотѣ около 6000'. 29. V. 04. Михайловскій! Гора Куртлю близъ Кагызмана, Карсск. обл., между кустарниками на высотѣ 7000', обильно. 3. VI. 04. Михайловск.! Гора Кара-дашъ на высотѣ около 7500'. 5. VI. 04. Михайловскій! Сел. Бардусъ, Ольтинскаго окр., Карсск. обл., между камнями и на скалахъ. 16. VI. 04. Михайловскій! Большой Араратъ, луга близъ сел. Ахуры. 7000'. 19. V. 00. Оом.!! Малый Араратъ, около 10000'. 20. VIII. 03.

Гриневецкій! Эриванск. губ., Нахичеванск. уѣздъ, близъ сел. Беченагъ. 6000'. 22. V. 00. Thom.!!

Ar. Geogr. Asia minor!

Примѣч. Въ сухомъ состояніи этотъ видъ съ перваго взгляда легко смѣшать съ *C. Steveni* M. B., которая имѣетъ весьма схожіе листья и схожую чашечку, хотя и болѣе длинную. Въ Турецко-персидскомъ гербаріи Тифлискаго Ботан. Сада, равно какъ и въ общемъ гербаріи Юрьевск. Ботанич. Сада находятся экземпляры этого новаго вида, смѣшанные съ экземплярами *C. Steveni* подъ однимъ общимъ опредѣленіемъ — *C. Steveni* M. B. (См. P. Sintenis. Iter. Orient. 1894. № 5647. Armenia turcica. Szandschak Gümtischkhane. Kirkpauli in montosis. 28. V. Determ. Prof. C. Haussknecht). При болѣе внимательномъ осмотрѣ даже, когда оба вида смѣшаны вмѣстѣ въ гербаріи, сейчасъ можно замѣтить разницу въ длинѣ и формѣ трубки чашечки и ея характерномъ опушеніи. Смѣшать эти два вида въ живомъ состояніи совершенно невозможно, такъ какъ разница у нихъ другъ отъ друга чрезвычайно большая. *C. Beauverdiana* представляетъ собою форму среднюю между *C. persicifolia* L. и *C. phytidocalyx* Boiss., отличаясь отъ нихъ тонкостью стеблей и меньшими размѣрами всѣхъ частей растенія и формой листьевъ. Общее между ней и двумя послѣдними видами заключается въ формѣ вѣичника и цвѣтѣ его (небесно-голубомъ). По своимъ размѣрамъ, формѣ чашечки и листьевъ *C. Beauverdiana* приближается и къ *C. Steveni* M. B.; отъ этого послѣдняго вида отличается формой вѣичника, который раздѣленъ на доли только до $\frac{1}{2}$, его длины и даже немного меньше, цвѣтомъ вѣичника небесно-голубымъ (одного цвѣта съ вѣичкомъ *C. persicifolia* L.), оригинальнымъ опушеніемъ трубки чашечки, состоящимъ изъ бѣлыхъ сильно вздутыхъ губчатыхъ бугорковъ и наконецъ длиною рылецъ столбика, равныхъ его нераздѣленной части. У *C. Steveni* вѣичникъ розово-фіолетовый раздѣленъ на доли до половины, такъ что форма его получается средняя между широко-ворончатой и колесовидной, между тѣмъ какъ у *C. Beauverdiana* форма вѣичника правильно-колокольчатая. Опушеніемъ трубки чашечки *C. Beauverdiana* очень напоминаетъ *C. phytidocalyx* Boiss. и отличается отъ нея удлиненной трубкой чашечки и верхними стеблевыми листьями, которые узко-линейны, книзу оттянуты, тогда какъ у *C. phytidocalyx* трубка чашечки совсѣмъ короткая, а верхніе стеблевые листья широко-овальные и у основанія закруглены. (См. также примѣч. F o m i n i. l. cit.)

Pag. 114. *C. Steveni*, adde:

S. P. Сѣверн. склоны горы Текма, Артвинскаго окр., Батумской обл. 26. VI. 04. Михайловскій! — **A. O.** Дагестанъ, между перевалами Дижмха и Ниникось-Цихе, альп. поясъ. 13. VII. 04. Бушъ! — **X. A.** Переваль у г. Кырмызы-дагъ, Эриванск. губ. 20. VII. 05. Шелковниковъ! Г. Дикъ-Пиляканъ, Эриванск. губ. 23. VII. 05. Шелковн.! Каменитые осыни у оз. Алагель, Елисаветпольск. губ. 24. VII. 05. Шелковн.! Яйла Бардусъ Ольтинскаго окр., Карск. обл., около 4000'. 17. VI. 04. Михайловскій! — **S. S.-K.** Табичхури, альп. лугъ. VII. 01. Мищенко! Бакуріани. 20. VI. 03. Бородинъ! Зангезурск. уѣздъ, Елисаветпольск. губ., близъ сел. Микента. 14. VII. 03. Herb. Jurjew.!

Pag. 120. *Symphyandra pendula*, adde: v. s. in h. J.

S. T. Нарзанъ. К. А. Мейеръ! Бештау. Жмакина! Сѣв. склонъ Машука. Жмакина! Кисловодскъ, скалы. 10. VIII. 99. Жмакина! Алагиръ, у р. Ардона. Лаговскій! Тамъ-же на „Каменной ломкѣ“. 23. VII. 02. Рискина! — **A. M.** Дигорія, Урухское ущелье. 13. VIII. 02. Рискинъ!

Pag. 121. var. *transcaucasica*, adde :

С. Р. Долина р. Кодора, въ трещинахъ известковыхъ скалъ. 25. VII. 96. Десулави!

Pag. 121. **S. ossetica** ad gen. *Campanula* pertinet et in seriem *Symphylodraeiformes* m. post *Camp. betulaeifolia* collocanda est. Adde :

С. Т. Ардонское ушелье. 10.VI. 02. Риккинъ! Между Миссурцы и Алагиромъ, у р. Ардона. VIII. 81. Бротерусъ!

Pag. 121. Post **S. pendula** insere :

* **S. finitima** m. *crispule caescenti-pubescentis, caulibus e rhizomate subignoso crasso saepe ramoso tenuibus pumilis ascendentibus foliosis flexuosis superne divaricatis breviter et corymbose-ramulosis, ramulis 1-floris, foliis rigidis radicalibus late-ovatis basi cordatis vel subcordatis, caulinis inferioribus oblongo-oratis obtusis basi cuneatis margine serrato-crenatis longiuscule petiolatis, superioribus diminutis breviter petiolatis, summis subsessilibus, pedicellis erectis calyce multo brevioribus bracteolatis, bracteolis lineari-lanceolatis, calycis laciniis late-triangularibus acutiusculis vel acutis corolla pubescente campanulata alba extus saepius purpurascente imo basi constricta ore barbata 3-plo brevioribus, floribus virgineis semper purpurascentibus, appendicibus parvis angulatis tubo calycino multo brevioribus, antheris in floribus vel in tubum connatis vel liberis. 24. v. v. et s. in h. Th.*

Syn. *Campanula finitima* F o m i n, in Monit. du Jard. Botan. de Tiflis, livraïis. 1, pag. 15.

Hab. in fissuris rupium Transcaucasiae austro-occidentalis. — **X. А.** Карсская обл., Ольгинск. окр., близъ поста Тамрутъ. 13.VII.03. Кёнигъ!

Примѣч. Видъ этотъ habitus'омъ напоминаетъ *C. betulaeifolia* С. Косч., отъ которой отличается сърымъ опушеніемъ, болѣе широкимъ въичкомъ, широко-треугольными долями чашечки и ея маленькими придатками и накопецъ зубчато-городчатыми листьями. Форму эту съ такимъ же правомъ можно отнести къ роду *Campanula*, какъ и къ роду *Symphylodra*. Всѣ многочисленные гербарные экземпляры этого вида имѣли въ цвѣткахъ пыльники совершенно свободные, въ виду чего, описывая эту форму въ „Вѣстникъ Тифл. Ботан. Сада“ кн. I. стр. 15, я отнесъ ее къ роду *Campanula*. Одновременно въ 1903 году вмѣстѣ съ гербарными экземплярами г. Кёнигъ, нашедшій этотъ видъ около пограничнаго съ Турціей поста Тамрутъ Ольгинск. окр. Карсской обл., привезъ въ Тифлисскій Ботанич. Садъ и одинъ живой экземпляръ, который былъ посаженъ на искусственной скалѣ въ кавказскомъ отдѣлѣ Сада. Въ 1904 году растеніе не дало ни одного цвѣтка, но лѣтомъ 1905 года дало два цвѣтка, у которыхъ пыльники были совершенно свободные, какъ у видовъ *Campanula*. Въ выѣшнемъ 1906 году растеніе въ концѣ іюня обильно зацвѣло и у многочисленныхъ первыхъ цвѣтовъ пыльники также были совершенно свободные, но вслѣдъ затѣмъ въ началѣ іюля появились цвѣты, въ которыхъ пыльники были сросшіеся въ трубку или же трубка изъ сросшихся пыльниковъ была разорвана проходившимъ черезъ нее столбикомъ, какъ это бываетъ у видовъ рода *Symphylodra*. По отцвѣтаніи этихъ цвѣтковъ стали опять появляться цвѣты со свободными пыльниками, а вслѣдъ за ними опять нѣсколько цвѣтовъ со сросшимися въ трубку пыльниками, а въ нѣкоторыхъ цвѣткахъ даже не всѣ пыльники были сросшіеся. У извѣстныхъ до сихъ поръ видовъ рода *Symphylodra* ничего подобнаго не наблюдалось. Описываемая форма является переходной между родомъ *Campanula* и родомъ *Symphylodra*. Вслѣдствіе того является вопросъ, можетъ ли родъ *Symphylodra* считаться вполне обособленнымъ и не правильнѣ ли поэтому счи-

татъ его только подрономъ, тѣмъ болѣе, что единственнымъ отличіемъ его отъ рода *Campanula* служить только одинъ признакъ — сращеніе пыльниковъ, который всетаки подвергается колебаніямъ.

Pag. 123. Post *S. armena* insere :

***var. serratosepala** m. calycis laciniis latioribus denticulatis fere foliaceis. *2l. v. s. in h. Th.*

Hab. in fissuris rupium Transcaucasiae austro-occidentalis. — **X. A.** Переваль Сатанахачъ, сѣв. скл. 11. VII. 05. Шелковниковъ! (f. floribus pallide coeruleis, sepalis late triangularibus denticulatis). — **S. S.-K.** На затѣпненныхъ скалахъ въ лѣсу горы Кепесъ-дагъ, въ Елисаветпольскомъ уѣздѣ. 1800 м. 8. VII. 02. Кроненбургъ!

Примѣч. У этого варьетета изъ Южнаго Карабаха и Талыша наблюдается, что чашелистики бываютъ болѣе широкими и снабжены, зубчиками и въ этомъ случаѣ очень напоминаютъ уменьшенные самые верхніе листья.

Pag. 128. *Specularia hybrida*, adde : v. s. in h. J.

S. T.-N. Крымъ, Ялта, запущенные сады. 20. V. 90. Herb. Jurjew. На холмахъ близъ Ялты, Паликуръ. 15. IV. 00. Пурингъ! Судахъ. 15. V. 96. Каллѣ!

Index nominum et synonymorum¹⁾.

- Adenophora* Fisch. III. IV. 7. 9. 125.
A. liliifolia Led. VIII. XV. XVII. 8. 125.
A. communis Fisch. 125.
A. communis var. *denticulata* Trautv. 125.
Anotocalyx A. DC. 119.
Asyneuma Grisb. 129.
Bryonia L. III. 2.
B. alba L. XIII. XVII. 3. 4. 143.
B. alba baccis nigris Bauh. 4.
B. alba β. MB. 4.
B. aspera sive alba, baccis rubris Bauh. 3.
B. aspera Stev. 4.
B. dioica Jacq. XIII. XVII. 3. 4. 143.
B. dioica MB. 4.
B. lutea Bast. 3.
B. nigra Dmrt. 4.
B. nitida Link. 3.
B. ruderalis Salisb. 3.
B. sicula Guss. 3.
B. scarlatina Dmrt. 3.
Bryoniae Adans. 1.
Calyceraceae III.
Campanulaceae A. DC. III. VI. VIII. X. XII. XVIII. 6.
Campanulatae Engl. III. XII. 1.
Campanulinae Engl. 6.
Campanulineae Engl. 6.
Campanuloideae - *Campanuleae* - *Campanulinae* Schönland. 9.
Campanuloideae - *Campanuleae* - *Wahlenberginae* Schönland. 139.
Campanula L. III. IV. X. XI. 7. 8. 9. 10.
Campanula L. pr. p. 139.
C. Adami MB. 64.
C. Adami Meyer (in herb.). 69.
C. affinis Rupr. 54.
C. albiflora C. Koch. 35.
C. alliariaefolia W. VIII. XIII. XVII. 11. 17. 32. 145.
C. alliariaefolia varr. *cordata* et *macrophylla* Trautv. 32.
C. alpigena C. Koch. 57.
C. alpini L. 125.
C. andia Rupr. V. IX. XI. XIV. 12. 16. 17. 72.
C. andia var. *Alexeenkoi* Fom. V. IX. XIV. 73.
C. andina Rupr. 72.
C. anomala Fom. V. IX. XII. XIV. XVII. 13. 16. 17. 53.
C. ardonensis Rupr. V. IX. X. XI. XIV. XVII. 13. 16. 17. 67. 147.
C. ardonensis β. *kryophila* Boiss. 66.
C. ardonensis var. *latifolia* Fom. V. IX. XIV. 67.
C. argunensis Rupr. V. IX. X. XI. XIV. 13. 16. 17. 61. 64. 147.
C. armena Stev. 122.
C. Aucheri DC. IX. X. XI. XIV. 13. 16. 17. 55. 56. 59. 64. 147.
C. Aucheri Alb. (partim) 52.
C. Aucheri Boiss. (partim) 61.
C. Aucheri var. *compacta* Fom. V. VI. XIV. 61.
C. Autraniana Alb. V. VI. VIII. XII. XIV. XVII. 12. 15. 17. 73. 74.
C. Bayerniana Rupr. VII. XI. XIV. 12. 16. 17. 76.
C. Bayerniana var. *andina* Trautv. 77.
C. Bayerniana Radde (partim) 72.
C. Bayerniana var. *Trautvetteri* Fom. V. VII. XIV. 16. 77.
C. Beauverdiana Fom. VII. XI. XV. 149.

¹⁾ Синонимы обозначены курсивомъ; жирнымъ шрифтомъ напечатаны названія сем., родовъ, секцій и тл.; простымъ шрифтомъ напечатаны виды, подвиды, разновидности и тл., принятые въ этомъ сочинении.

- C. bellidifolia* Adam. V. IX. X. XI. XIV. 13. 16. 17. **64**. 65. 147.
C. bellidifolia Radde (partim) 52. 61.
C. bellidifolia var. *longisepala* Fom. V. IX. XIV. **65**.
C. besenginica Fom. V. IX. XI. XIV. XVII. 13. 16. 17. **66**.
C. betonicaefolia Biehl. 35.
C. betulacfolia C. Koch. XIV. **147**.
C. Biebersteiniana Röm. et Schult. 48.
C. Biebersteiniana C. A. Mey. (partim) 53.
C. biserrata C. Koch. 109.
C. bononiensis L. VII. XV. XVII. 8. 14. 18. **94**. 98. 148.
C. brassicaefolia Somm. et Lev. 30.
C. Brothororum Feer. 35. 38.
C. calcarata Somm. et Lev. V. XIV. XVII. 12. 17. **45**.
C. capsulis trilocularibus tectis Gmel. 22.
C. caucasica M. B. V. IX. X. XI. XIII. 11. 16. 18. **30**.
C. caucasica C. Koch. 30.
C. caucasica Ledeb. 31.
C. celtidifolia Boiss. 109.
C. cernua Hort. 25.
C. Choziatowskyi Fom. V. VII. XIV. XVII. 12. 16. 17. **78**.
C. ciliata Stev. V. IX. X. XI. XII. XIV. 13. 16. 17. **45**. 47. 146.
C. ciliata var. *pontica* Alb. V. VI. IX. XII. XIV. **46**.
C. cilicia Boiss. 133.
C. circassica Fom. V. IX. XII. XIV. XVII. 13. 16. 17. **52**. 53.
C. commutata Roem. et Sch. 35.
C. collina MB. IX. XI. XII. XIII. XVII. 11. 17. **38**. 44. 146.
C. collina var. *abchasica* Alb. V. VI. IX. XII. XIII. **44**.
C. collina var. *eriocalyx* et *leiocalyx* Trautv. 39.
C. cordifolia C. Koch. 94.
C. crispa Lam. VII. XIII. 8. 10. 16. **19**. 144.
C. daghestanica Fom. V. VII. XIII. 11. 16. 18. **29**. 145.
C. decurrens Güldst. 115.
C. denticulata Boiss. et Huert. 147.
C. divergens Willd. 25.
C. dracunculifolia Boiss. 137.
C. dumetorum Boiss. 86.
C. Dzaaku Alb. V. VI. IX. XII. XIV. 13. 15. **47**.
C. eriocarpa MB. 81.
C. fallax Rupr. 57. 60.
C. fastigiata Dufour. XV. XVIII. 14. 18. **107**.
C. fastigiata Gmel. 108.
C. fastigiatae affinis Hohenack. 107.
C. finitima Fom. 151.
C. foliis Lamii etc. Buxb. 32.
C. glomerata L. VII. XII. XV. XVII. 8. 13. 18. **100**. 103. 148.
C. glomerata var. *artwinensis* O. Kntze. **107**.
C. glomerata var. *caucasica* Trautv. V. IX. XV. **106**. 149.
C. glomerata var. *cervicarioides* A. DC. VII. XV. **105**. 149.
C. glomerata var. *coriacea* Fom. VIII. XV. **104**.
C. glomerata var. *elliptica* Trautv. 101.
C. glomerata var. *farinosa* A. DC. XV. **106**.
C. glomerata f. *grandiflora* Fom. IX. XI. XII.
C. glomerata var. *hispida* Fom. V. VIII. XV. **104**. 148.
C. glomerata var. *oblongata* Trautv. XV. **103**. 148.
C. glomerata var. *speciosa* Trautv. 101.
C. glomerata var. *symphytifolia* Alb. V. IX. XV. **105**.
C. Gumbetica Boiss. 72.
C. gunnifera Willd. 35.
C. Gumbelii C. Koch. 22.
C. hemschinica C. Koch. XV. 15. 49. **116**. 117.
C. hispidissima Hochst. 31.
C. Hohenackeri Fisch. et Mey. 26.
C. hybrida L. 128.
C. hygrophila Rupr. 57. 60.
C. hypopolia Trautv. V. IX. X. XI. XIV. XVII. 12. 16. 17. **68**. 147.
C. Iberica maxima subhirsuta flore maximo coerulco Tourn. 81.
C. imeretina Rupr. V. VIII. XIII. XVII. 11. 18. **29**. 145.
C. Kolenatiana C. A. Mey. V. VIII. XIV. 12. 15. 17. 45. **74**. 75.
C. kryophila Rupr. V. IX. XI. XIV. XVII. 13. 16. 17. **66**.
C. lactiflora MB. VIII. IX. XV. XVII. 14. 19. **109**. 149.
C. Lambertiana A. DC. 108.
C. lamiifolia Adam. 32.
C. latifolia L. VIII. IX. XV. XVII. 8. 14. 18. **81**. 84. 148.
C. latifolia var. *canescens*, *eriocarpa*, *intermedia* et *leiocarpa* Trautv. 81.
C. Ledebouriana Trautv. V. IX. XI. XIV. XVII. 12. 16. 17. **71**.
C. lilifolia L. 125.
C. longestyla Fom. IV. V. VIII. XIII. 11. 16. **20**. 144.
C. lyrata Lam. XIII. XVIII. 8. 10. 19.

- C. macrantha* Fisch. 81.
C. macrochlamys Boiss. et Huet. VIII. XV. 10. 17. 100.
C. macrophylla Sims. 32.
C. Massalskyi Fom. V. VIII. XV. XVII. 11. 16. 17. 78.
C. medium Pall. 22.
C. Meyeriana Rupr. 53.
C. mirabilis Alb. IV. V. VI. VIII. XIII. XVII. 10. 15. 18. 22.
C. mutans Vahl. 25.
C. odontosepala Boiss. VIII. XV. XVII. 14. 18. 84.
C. ossetica M. B. V. VIII. XV. 121. 151.
C. patula L. XV. 8. 15. 18. 115. 116.
C. patula var. *confertiflora* Trautv. 116.
C. pendula M. B. 120.
C. persicifolia L. VII. XV. XVII. 8. 14. 19. 112. 113. 149.
C. persicifolia Radde. 116.
C. Pestalozzae Boiss. 31.
C. petrophila Rupr. V. IX. X. XI. XIV. 12. 17. 68. 70. 71. 147.
C. petrophila var. *angustiflora* Fom. V. IX. XIV. 16. 71.
C. petrophila var. *borbalensis* Rupr. 69.
C. petrophila var. *exappendiculata* Somm. et Lev. XIV. 71.
C. petrophila var. *linoides* Rupr. 69.
C. petrophila var. *longiflora* Rupr. V. IX. XIV. 70.
C. pilosa var. *pontica* C. Koch. 57.
C. pontica Alb. IV. V. VIII. XV. XVII. 14. 15. 112.
C. propinqua Fisch. et Mey. VIII. XIII. 15. 18. 31. 145.
C. pubiflora Rupr. 57. 60.
C. pubiflora var. *Szovitsiana* Rupr. in herb. 57. 60.
C. racemosa S. G. Gmel. 22.
C. Raddeana Trautv. V. VII. XIV. 12. 15. 17. 45. 75. 76. 147.
C. rapunculoides L. VII. VIII. XV. XVII. 8. 14. 18. 85. 91. 148.
C. rapunculoides Pall. 95.
C. rapunculoides var. *cordifolia* (C. Koch) Fom. V. VII. VIII. XV. 94. 148.
C. rapunculoides var. *glabrata* Trautv. 86.
C. rapunculoides var. *trachelioides* DC. VII. VIII. IX. XV. 92. 93. 148.
C. rapunculoides var. *trachelioides* Trautv. 86.
C. Rapunculus L. VII. XV. XVII. 8. 15. 19. 107. 108. 109. 149.
C. Rapunculus var. *Lambertiana* Boiss. 108.
C. Rapunculus var. *spiciformis* Boiss. IV. V. VII. XV. 109.
C. Rapunculus Somm. et Lev. 116.
C. rotundifolia L. XV. XVIII. 8. 14. 18. 79. 80.
C. rotundifolia var. *hirta* Trautv. XV. XVII. 80.
C. rupestris Rupr. 53. 54.
C. rupestris M. B. 48.
C. ruthenica M. B. 95.
C. sarmatica Ker. V. VIII. XIII. 11. 17. 35. 38. 146.
C. sarmatica var. *calcarea* Alb. V. VI. VIII. XII. XIII. 37. 38.
C. sarmatica f. *glabra* DC. VIII. XIII. 37.
C. sarmatica var. *gracilis* Fom. V. VIII. XIII. 37. 38.
C. sarmatica f. *ramosissima* (Somm. et Lev.) Fom. XIII. 37. 38.
C. sarmatica var. *subtomentosa* Trautv. 35. 38.
C. saxifraga M. B. V. IX. X. XI. XIV. 13. 17. 54. 55. 56. 57. 60. 61. 146.
C. saxifraga Alb. 52.
C. saxifraga var. *leptorhiza* Somm. et Lev. XIV. 56.
C. saxifraga var. *leptorhiza* Somm. et Lev. (partim) 66.
C. saxifraga f. *stenophylla* Fom. XIV. 55.
C. saxifraga var. *transcaucasica* Rupr. 57. 60.
C. saxifraga var. *tridentata* Rupr. 52.
C. scotosa Fisch. 92.
C. sibirica Alb. 25.
C. sibirica Becker. 28.
C. sibirica L. VII. XIII. XVII. 8. 11. 18. 22. 144.
C. sibirica Lomak. 28.
C. sibirica f. *elatioides* Fom. VII. XIII. 23.
C. sibirica var. *caucasica* Trautv. 28. 31.
C. sibirica var. *divergens* Trautv. VII. XIII. 24. 25.
C. sibirica var. *divergens* f. *corymbosa* Fom. XIII. 26.
C. sibirica var. *parviflora* Trautv. 28.
C. sibirica var. *Hohenackeri* (Trautv.) Fom. V. VII. XIII. 18. 26. 145.
C. sibirica var. *Hohenackeri* f. *nana* Fom. XIII. 27.
C. sibirica var. *Hohenackeri* f. *parviflora* Fom. VII. XIII. 27. 145.
C. sibirica var. *meretina* Trautv. 26. 30.
C. sibirica var. *luxurians* Lindem. 25.
C. sibirica β . *major* Alb. 20.
C. sibirica β . *major* Boiss. 25.
C. sibirica var. *major* Auct. 20.

- C. sibirica* var. *major* Somm. et Lev. 25. 28.
C. sibirica var. *taurica* Trautv. 25.
C. sibirica var. *typica* Trautv. 26.
C. simplex Lam. 95.
C. simplex Stev. 113.
C. spathulata W. K. 25.
C. Steveni M. B. VII. X. XI. XV. XVII. 8. 14. 19. 113. 115. 150.
C. Steveniana R. et Sch. 113.
C. stricta L. 10. 18. 98.
C. stricta var. *libanotica* Boiss. 99.
C. stricta var. *muricata* Trautv. IV. VIII. XV. XVII. 99.
C. suanetica Rupr. V. VIII. XIV. XVII. 12. 15. 17. 73. 74.
C. suanetica f. *appendiculata* Somm. et Lev. XIV. 74.
C. Szovitsiana Rupr. 57. 60.
C. tauricola Boiss. et Bal. 137.
C. thyrsoides L. XV. 8. 18. 99.
C. trachelioides M. B. 92.
C. Trachelium L. VIII. XV. XVII. 8. 14. 84. 85.
C. Trachelium C. A. Mey. 81.
C. tridens Rupr. 48.
C. tridens var. *z. ciliata* Rupr. 51.
C. tridentata Schreb. V. IX. X. XI. XIV. XVII. 13. 16. 17. 47. 50. 146.
C. tridentata L. Watke. 48.
C. tridentata var. *ardonensis* Trautv. 67.
C. tridentata var. *argumensis* Trautv. 61.
C. tridentata var. *barbata* Fom. V. IX. XII. XIV. 50. 146.
C. tridentata var. *bellidifolia* Trautv. 64.
C. tridentata var. *ciliata* Trautv. 46.
C. tridentata var. *gracilis* Fom. IX. XI. XIV. 17. 51. 146.
C. tridentata var. *petrophila* Trautv. 61. 69.
C. tridentata var. *pubiflora* Trautv. 57. 61.
C. tridentata var. *rupestris* Trautv. 48. 51.
C. tridentata var. *saxifraga* Trautv. 51. 54. 66.
C. tridentata var. *stenophylla* Boiss. 52.
C. undulata Moench. 22.
C. urticifolia M. B. 81.
C. verruculosa Lk. 108.
C. virgata A. DC. 109.
Camphylocera Nutt. 126.
Cervicariae spec. Cord. Dod. 10.
Clinocarpium Boiss. 130.
Cordifoliae Fom. IV. 17. 32.
Cucumis L. III. 2. 143.
- Cucumis*** Tourn. 144.
C. Melo L. III. XIII. 144.
Cucurbitaceae Juss. III. 1.
Cucurbitaeae-Cucumerinae Müller et Pax. 2.
Cucurbitineae Engl. 1.
Dysmicodon Nutt. 126.
Echallium Rich. III. 2. 5.
E. agreste Rehb. 5.
E. elaterium A. Rich. XIII. XVII. XVIII. 5. 6. 143.
E. officinale Nees. 5.
E. officinarum L. C. Rich. 5.
E. purgans Schrad. 5.
Edrajanthus D. C. 139.
Edrajanthus Owerinianus Boiss. 140.
Elaterium Riv. 5.
El. cordifolium Moench. 5.
Erineon Plin. 10.
Encodon A. DC. 107.
Eupodanthum Boiss. 130. 131.
Floerkea Spreng. 125.
Gerontogaeae A. DC. 126.
Hedraeanthus Griseb. III. VI. 139.
Hedraeanthus Owerinianus Rupr. VI. VII. XVI. 140.
Hedranthus Rupr. 139.
Heterophylla Nym. 18. 79.
Intermediae Fom. IV. 16. 20.
Involucratae Fom. IV. 17. 100.
Jasione L. III. VI. 7. 139. 141.
J. Heldreichii Boiss. 142.
J. montana L. 8. 141.
J. montana var. *dentata* A. DC. VI. VII. XVI. 141. 142.
Legousia Durand. 126.
Medium A. DC. 16. 19.
Melanocalyx Endl. 119.
Melo Tourn. 144.
Michauxia L'Her. III. VI. 7. 9. 128.
M. laevigata Vent. VIII. XVI. 128.
Mindium Juss. 128.
Momordica aspera Lam. 5.
M. Elaterium L. 5.
Nandhirobae A. St. Hil. 1.
Nhandirobae A. St. Hil. 1.
Otocalyx A. DC. 119.
Ovella Adans. 141.
Phyteuma sect. 3. A. DC. 129.
Phyteuma sect. ***Podanthum*** Don. 129.
Phyteuma amplexicaule Willd. 132.
Ph. campanuloides M. B. 133.
Ph. canescens Trautv. 137.
Ph. canescens W. K. 136. 137.
Ph. gracile Boiss. 138.
Ph. Kotschyi Boiss. 133.
Ph. lanceolatum Willd. 137.
Ph. lanceolatum Desf. 138.

- Ph. limonifolium* Led. 137.
Ph. lobelioides Willd. 138.
Ph. Otites Trautv. 137.
Ph. Pestalozzac Boiss. 138.
Ph. pulchellum C. A. Mey. 131.
Ph. rigidum Willd. 137.
Ph. salicifolium A. D C. 136.
Ph. sulignum Besser. 136.
Ph. styloides Boiss. 138.
Podanthum Boiss. III. VI. XI. 7. 8. 9. **129.**
 130. 131.
P. amplexicaule Boiss. X. XVI. 130.
132. 135.
P. amplexicaule var. *Kotschy* Boiss.
 VI. XVI. **133.**
P. campanuloides Boiss. VI. X. XVI.
 XVII. 130. **133.**
P. canescens Boiss. XVI. 130. **135.**
P. canescens Lomak. 136.
P. canescens var. *salicifolium* (A. D C.)
 Fom. VII. XVI. **136.**
P. cichoriforme Boiss. VI. VIII. XVI.
 XVII. 130. **131.**
P. lanceolatum Boiss. 130. **136.**
P. lanceolatum var. *rigidum* Boiss.
 VI. VIII. XVI. XVII. **137.**
P. leianthum Trautv. VI. VIII. XVI.
 129. **132.**
P. lobelioides Boiss. VI. VII. VIII.
 XVI. XVII. 130. **137.** 138. 139.
P. lobelioides Hausskn. in herb. 138.
P. lobelioides var. *urceolatum* Fom.
 VI. VIII. XVI. **138.**
P. Otites Boiss. VI. XVI. XVII. 130.
137. 138.
P. persicum Boiss. 130.
P. psilostachyum Boiss. 130.
P. pulchellum Boiss. VI. VIII. XVI.
 XVII. 130. **131.** 132.
P. salicifolium Rupr. 136.
P. strigillosum Boiss. 130.
Prismatocarpus hybridus L'Her. 128.
Quinqueloculares Boiss. 16. **19.**
- Quinquelocularia crispa* C. Koch. 19.
Rapunceoli Brunnf. 10.
Rapunculus Boiss. IV. 16. 18. **107.**
Rigocarpus Neck. 144.
Rupestres Boiss. IV. 16. **68.**
Scapiflorae Boiss. IV. 16. **45.**
Sericodon Endl. 119.
Sibiricae Fom. IV. 18. **22.**
Specularia Heist. III. VI. 7. 9. **126.**
Sp. falcata A. D C. XV. XVIII. 126. **127.**
Sp. hybrida A. D C. VII. XV. XVIII.
 126. **128.** 152.
Sp. pentagonia A. D C. VII. XV. XVIII.
 126. **127.**
Sp. Speculum A. D C. VII. XV. XVIII.
 126. **127.**
Spicatae Boiss. IV. 18. **98.**
Spinulosae Fom. IV. 18. **21.**
Symphandraeiformes Fom. IV. XI. 16. **73.**
Symphandra A. D C. III. IV. VI. 7. 8.
 9. **117.**
S. armena A. D C. IV. VI. VIII. XV.
 117. 119. **122.** 123. 152.
S. armena var. *serratosepala* Fom.
 XV. **152.**
S. finitima Fom. VI. VII. XV. XVII. **151.**
S. lazica Boiss. et Bal. 117. **119.**
S. lezgina Alexeenko. VI. VIII.
 XV. XVII. 118. 119. **124.**
S. ossetica A. D C. 118. 121. 151.
S. pendula A. D C. VI. VIII. XV. 117.
 118. **119.** 120. 150.
S. pendula var. *transcaucasica* Somm.
 et Lev. VI. VIII. XV. **121.** 151.
S. zangezura Lipsky. IV. VI. VII.
 XV. XVII. 118. 119. **123.**
Trachelioideae Boiss. IV. 18. **81.**
Trachelium Lob. 10.
Triloculares Boiss. 16. **21.**
Uniflori Wettst. **141.**
Wahlenberginae Schönl. 6.
Wahlenbergiae sect. I. *Edrajantha*
 A. D C. 139.

New Flora Botanical Garden Library
QK 322.K8 ch.4 vyp.6 gen
Kuznetsov, N. I./Flora Caucasica critica



3 5185 00170 1992

